



DƏRSLİK

10

BİOLOGİYA





HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

LAYIHƏ

LAYIHƏ

Nüşabə Məmmədova
Brilyant Həsənova
Könül Mahmudova
Leyla Fətiyeva

Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün

BİOLOGİYA

fənni üzrə

DƏRSLİK

© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi



**Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)**

Bu nəşr Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International lisenziyası (CC BY-NC-SA 4.0) ilə www.trims.edu.az
saytında yerləşdirilmişdir. Bu nəşrdən istifadə edərkən
lisenziyanın şərtləri qəbul edilmiş sayılır.

İstinad zamanı nəşrin müəllif(lər)inin adı göstərilməlidir.

Nəşrdən kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır.

Törəmə nəşrlər orijinal nəşrin lisenziya şərtləri ilə yayılmalıdır.

Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi
info@eastwest.az və derslik@edu.gov.az
elektron ünvanlarına göndərməyiniz xahiş olunur.
Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!



ŞƏRQ-QƏRB

LAYIHƏ

MÜNDƏRİCAT

I. Biosferdə istehsal və istehlak

1. Canlılarda qidalanma.....	7
2. Canlılarda tənəffüs	12
3. Canlılarda ifrazat.....	19
4. Canlılarda çoxalma.....	24
5. Canlılarda qıcıqlanma	28
6. Üzvi maddə istehsalçıları	31
7. Zülal biosintezinin mexanizmi	36
8. Hüceyrənin enerji mənbəyi – ATF	40
9. Energetik mübadilənin mexanizmi.....	43
10. Fotosintezin mexanizmi	47
11. Xemosintez.....	51
12. Təqdimat mövzuları	53

II. Canlılarda baş verən dəyişkənliklər

Bölmə 1. Dəyişkənlik

1. Canlılarda baş verən mövsüm dəyişkənlikləri. Fotoperiodizm.....	54
2. Modifikasiya dəyişkənliyi	57
3. Mutasiya irsi dəyişkənlikdir	61
4. Kombinativ və korelyativ dəyişkənlik	65

Bölmə 2. Sağlam həyat

1. Maddələr mübadiləsi.....	67
2. Maddələr mübadiləsinə təsir edən amillər	70
3. Maddələr mübadiləsində baş verən dəyişikliklər	74
4. Canlılara təsir edən abiotik amillər	78

LAYIHƏ

5. Ali sinir fəaliyyətinin pozulması və onun qarşısının alınması.....	81
6. Hərəkət sağlamlıqdır	84
7. Düzgün istirahət	87

Bölmə 3. Epidemiologiya

1. Epidemiologiya və epidemioloji üsullar	90
2. Infeksiya mənbələri və yoluxma mexanizmi	93
3. Virus xəstəlikləri	95
4. Bakterial xəstəliklər.....	97
5. Göbələklərin törətdiyi xəstəliklər.....	99
6. Parazit qurdlarla yoluxma	101
7. Birlüceyrəli (ibtidai) heyvanların törətdiyi xəstəliklər	104
8. Buğumayaqlıların törətdiyi və yaydığı xəstəliklər	107
9. Yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə.....	112
10. Təqdimat və referat mövzuları	115

III. Üzvi aləmin təkamülü

Bölmə 1. Makrotəkamül

1. Makrotəkamülü isbat edən paleontoloji dəlillər.....	116
2. Makrotəkamülü isbat edən embrioloji dəlillər	120
3. Makrotəkamül – müqayisəli anatomiya dəlilləri.....	124
4. Müasir sistematika və təkamül.....	128
5. Təkamülün istiqamətləri və yolları.....	131
6. Yer üzərində canlıların inkişaf tarixi	136

Bölmə 2. İnsanın tarixi inkişafı

1. İnsanın təkamülü	140
2. İnsan təkamülü. Embrioloji və müqayisəli anatomiya dəlilləri.....	143
3. İnsan təkamülü. Paleontoloji dəlillər.....	147
4. Ən qədim insanlar	150
5. Qədim və ilk müasir insanlar	153
6. Təqdimat və referat mövzuları.....	157

LAYIHƏ

IV. Genetika

1. Genetika irsiyyət və dəyişkənlik haqqında elmdir.	
Monohibrid çarpazlaşma	158
2. Dihibrid və polihibrid çarpazlaşma	164
3. İlişikli irsiyyət	167
4. Cinsiyyətin genetikası	171
5. İnsan genetikası və tibb elmi	175
6. Genotip tam bir sistem kimi	180
7. Genetika və təkamül nəzəriyyəsi	184
8. Təqdimat mövzuları	185

V. Ətraf mühitin qorunması və bərpası

1. Orqanizmlərin qarşılıqlı təsiri	186
2. Biomüxtəliflik və onun qorunması yolları	190
3. Qida zənciri və ekoloji piramida	194
4. Havanın çirklənməsi global ekoloji problem kimi	200
5. Maddələr dövrəsi	204
6. Təqdimat mövzuları	207
İstifadə edilmiş ədəbiyyat	208



Motivasiya



Fəaliyyət



Tapşırıq

LAYIHƏ

Canlılarda qidalanma

M Siz qarışqa, hörümçək, milçək, böcəklər, ilan, kərtənkələ və digər canlıların bir qisminin torpaq üzərində sürətli hərəkətini, ağac gövdəsinə, divara necə dırmaşmasını müşahidə etmişiniz. Kərtənkələnin divardan qopub düşməməsinə səbəb caynaqların altında barmaqların yumşaq yastıqcıqlarında saça bənzəyən sərt və güclü törəmələrin olmasıdır. Müşahidələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, ətrafların yapışdığı yerlə bu törəmələr arasında möhkəm elektrostatik qüvvə meydana gəlir.

Kərtənkələnin divarda hərəkətinin mümkün olması uyğunlaşmadır. Heyvanın bədəninin quruluşu və orqanlar sistemlərinin nizamlı işi bununla uzlaşır. Hərəkətə xidmət edən əzələlərin, dayaq rolunu oynayan sümüklərin, onların işinə nəzarət edən sinir sisteminin əlaqəli işləməsi üçün enerji sərf olunur.

- Bütün bu orqanların fəaliyyəti üçün lazım olan enerji haradan alınır?
- Hansı proses enerji ilə zəngin maddələrin orqanizmə daxil olmasına imkan verir?




S Sualları cavablandırın və fikirlərinizi müzakirə edin.


- Qidalanma nədir? Onun canlılar üçün nə kimi əhəmiyyəti var?
- Qidalanma tipinə görə canlılar necə qruplaşdırılır?
- Fotosintez və xemosintez yolu ilə qidalanmanın həyata keçirilməsində nə kimi oxşar və fərqli xüsusiyyətlər olur?
- Heterotrof yolla qidalanan canlılarda qidalanma prosesi necə baş verir?
- Həzm prosesi necə həyata keçirilir? Bunun üçün canlılarda nə kimi uyğunlaşmalar var?

Bilirsiniz ki, orqanizmlərdə gedən bioloji proseslərin hər biri üçün müəyyən enerji lazımdır. Enerji isə qidalanma ilə ödənilir. Bütün canlılar yaşamaq üçün qidalanmalıdır. Qida maddələri orqanizmin qurulmasına sərf olunur, onu böyümə və inkişaf üçün gərəkli enerji ehtiyatı ilə təchiz edir, bütövlükdə orqanizmin həyat fəaliyyətini davam etdirməsinə təminat yaradır.

Qidalanma formalarına görə canlıları, əsasən, 2 qrupa ayırırlar. Bu qruplar da hər biri özlüyündə iki qrupa bölünür.




Təbiətdə bəzi canlılar həm avtotrof, həm heterotrof yolla qidalana bilir. Belə qidalanma forması *miksotrof* adlanır (*yaşıl evqlena, nepentes, milçəktutan* və s.).




Fotosintezedici xlorofilə malik olan canlılardır. Onların əksəriyyəti karbon qazı və sudan istifadə edərək işığın təsiri ilə üzvi maddə hazırlayır. Bu yolla qidalanan canlılara bəzi bakteriyalar, yaşıl evqlena, volvoks kimi heyvanlar və bitkilərin əksəriyyəti aiddir.

Xemosintezedici bakteriyalardır. Bunlar kimyəvi reaksiyalar zamanı ayrılan enerjiden istifadə edərək qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edir.



Saprofitlər hazır üzvi maddələrlə qidalanır, ancaq canlılara ziyan vermir. Bu cür qidalanmaya bakteriya və göbələklərdə daha çox rast gəlinir.


Parazitlər canlı orqanizmlərdə yaşayır. Onlar sahib orqanizmdə qidalanır, ifrazat məhsullarını oraya xaric edir və xəstəlik törədir. Belə qidalanma üsuluna bakteriyalarda, göbələklərdə, bitki və heyvanlarda rast gəlinir. Viruslar da canlı orqanizmlərdə parazitlik edir.




Əksər çoxhüceyrəli heyvanlarda qida maddələrini mənimsəmək üçün həzm orqanları birləşib həzm sistemini əmələ gətirir. Qida maddələri bu sistemə kənardan daxil olur, burada həzm olunur, sorulur və qalıqları xaricə atılır.

Həzm zamanı qida maddələri fiziki və kimyəvi cəhətdən dəyişikliyə uğrayır və onların əksəriyyəti kiçik hissəciklərə parçalanır ki, hüceyrə membranasından keçə bilsin. Bu cür dəyişikliklər mexaniki və kimyəvi həzm prosesi vasitəsilə baş verir.

Mexaniki həzm qida maddələrinin fiziki cəhətdən dəyişikliyə uğraması – isladılması və xırda lananmasıdır. Xərçəngin mədəsinin böyük hissəsi, məməlilərdə dişlər, quşlarda mədənin əzələli şöbəsi və s. orqanlar buna xidmət edir. Bu prosesdə fermentlərin, demək olar ki, heç bir fəaliyyəti olmur.



Kimyəvi həzm molekulları iri olan maddələrin fermentlərin təsiri ilə kimyəvi çevrilməyə uğramasıdır. Kimyəvi həzmin üç forması mövcuddur.




Çoxhüceyrəli heyvanların təkamülündə qidalanma və həzm üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən uyğunlaşma – *qastral (bağırsağ)* boşluğun olmasıdır. Bunun nəticəsində qida maddələri daha əlverişli surətdə həzm olunub istifadə edilir.

Qida tipindən asılı olaraq, heyvanların bəzi orqanlarında bir sıra uyğunlaşmalara rast gəlinir.

Heyvanlarda qidalanma üçün yaranan uyğunlaşmalar çoxdur. Cücülərdə ağız aparatının müxtəlif formaları, qaba yemlə qidalanan əksər məməli heyvanlarda azı dişlərin səthinin qırıqlı, bağırsağın uzun, mədənin bir neçə şöbədən ibarət olması buna misal ola bilər. Gövşəyən cütdırnaqlı heyvanlarda mədə 4 kameradan: *işgənbə, tor, qat-qat və qursaqdan* ibarətdir. Bu heyvanlar qidanı iki dəfə çeynəyir. Qəbul olunmuş qida əvvəlcə işgənbə və tora toplanır. Heyvan dincələrkən qida oradan hissə-hissə ağıza qaydır. Yenidən çeynənilib udulan qida mədənin qat-qat və qursaq hissələrində təkrar həzmə uğrayıb bağırsağa ötürülür. Bağırsaqlarda həzm prosesi davam edir və sorulma baş verir. Qida qalıqları anusdan xaricə atılır.

İnsanın həzm sisteminin quruluşu əksər onurğalı heyvanlarda olduğu kimidir.


f Şəkil əsasında həzm orqanlarının adlarını və funksiyalarını deyin.






Canlıların həyatında mühüm rol oynayan qidalanma onların yaşaması üçün əsas şərtlərdən biridir.

6

1. Verilmiş variantlara uyğun gələn orqanları şəkil üzərində müəyyənə bilərsiniz.
- a. Mexaniki həzmin getməsinə təmin edən əsas orqan;
- b. Öd hazırlayan orqan;
- c. Su, duz və vitaminlərin sorulduğu orqanlar;
- d. Yumurtanın ilk kimyəvi həzmində iştirak edən orqanlar;
- e. Həzmə xidmət edən, eyni zamanda hormon hazırlayan orqan;
- f. Əksər maddələrin sorulduğu orqan.



2. Şəkildəki canlıların həzm orqanları haqqında araşdırma apararaq həzm prosesinin başvermə mexanizmi haqqında təqdimat hazırlayın.



3. Xordalılarda qidanın asan həzm olunması üçün yaranmış uyğunlaşmaları araşdırın və nəticəni yazılı şəkildə təqdim edin.

M Əksər canlıların yaşaması üçün qida maddələri ilə yanaşı, oksigen də mühüm amildir. Qəbul olunan oksigen qida maddələrinin tərkibində olan üzvi birləşmələri oksidləşdirir. Bu zaman ayrılan enerji, əsasən, canlılarda müxtəlif fizioloji proseslərin həyata keçirilməsinə sərf olunur.

İsti bölgələrdə yaşayan böcəklər soyuq bölgələrdə yaşayanlara nisbətən daha böyük ölçüdə olur. Sizcə, bunun səbəbi nədir?




7 Araşdırma apararaq tapşırıqları icra edin.

1. Oksigen hüceyrələrə necə çatdırılır? Bu hansı orqanların köməyi ilə həyata keçirilir?

2. Birinci sxemə əsasən ağ ciyər tənəffüsü olan canlılarda qaz mübadiləsinin necə baş verdiyini izah edin.

3. İkinci şəklə əsasən canlıların tənəffüslərinin baş verməsində oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirib təqdim edin.




f


4. Şekildəki canlıları tənəffüs prosesinin başvermə mexanizminə görə fərqləndirin. Bu prosesin onlarda necə baş verdiyini araşdırıb təqdim edin.




5. Bu iki canlının tənəffüsündə nə kimi oxşar və fərqli cəhətlər var?



6. Balinaların suyun altında daha çox qalmalarının səbəbi nədir? Fikrinizi əsaslandırın və təqdim edin.



Birhüceyrəli heyvanlar və ibtidai çoxhüceyrəlilərin əksəriyyətinin bir qism hüceyrələri xarici mühitlə bilavasitə qazlar mübadiləsi aparır. Belə canlılar bədən səthi ilə tənəffüs edir.




Orqanizmlər mürəkkəbləşdikcə hüceyrələrin hamısı ətraf mühitlə bilavasitə qazlar mübadiləsi apara bilməmişdir. Onlarda tənəffüs prosesinin getməsi üçün xüsusi orqanlar formalaşmışdır. Bilirsiniz ki, heyvanların bir qismində tənəffüs dəri vasitəsilə gedir. Ancaq zaman keçdikcə canlılarda ətraf mühitdən qorunmaq üçün bədənini örtən və tənəffüsə mane olan bəzi törəmələr yaranmışdır. Bu da onlarda oksigen tələbatını ödəyən orqanların – tənəffüs orqanlarının (qəlsəmələr, traxeyalar, ağ ciyərlər) formalaşmasına təkan vermişdir. Bu orqanlar bədənini bütün hüceyrələrini oksigenlə təmin edir.

Hüceyrə tənəffüsü eukariot hüceyrələrin mitoxondrilərində oksigenin iştirakı ilə üzvi maddələrin oksidləşməsidir. Hüceyrə tənəffüsü zamanı ayrılan karbon qazı tənəffüs orqanları vasitəsilə orqanizmdən xaric edilir.

Ağ ciyər və qəlsəmə vasitəsilə tənəffüs edən canlılarda oksigenin hüceyrələrə çatdırılması və karbon qazının xaric olunması qan vasitəsilə həyata keçirilir. Cücülərdə isə bu prosesi birbaşa traxeyalar yerinə yetirir. Çünki cücülərdə qan yalnız qida maddələri və ifrazat məhsullarını daşıyır. Onlarda qan qaz mübadiləsində iştirak etmir. Ağ ciyər və qəlsəmələrdəki qanla ətraf mühit arasında gedən qazlar mübadiləsi *xarici tənəffüs*, toxuma hüceyrələri ilə qan arasındakı qazlar mübadiləsi isə *daxili tənəffüs* adlanır.

Dəri tənəffüsü nəm dəri vasitəsilə həyata keçirilir. Əsasən, bəzi qurdlarda, amfibilərdə təsadüf olunur. Belə heyvanların əksəriyyəti, əsasən, rütubətli yerlərdə və suda yaşayır. Dərinin nəm qalması selik ifraz edən vəzilərin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Nəm dəridə oksigenin kapilyar qan damarlarına keçməsi və karbon qazının damarlardan xaricə çıxması asanlaşır.




Soxulcanın dəri tənəffüsünün sxemi

Qəlsəmə tənəffüsü qəlsəmələr vasitəsilə heyvanların suda həll olmuş oksigendən istifadə etməsidir. Bəzi həlqəvi qurdlarda, əksər molyusklarda, xərçənglərdə, neştərçələrdə, balıqlarda qəlsəmələr tənəffüs orqanları hesab edilir. Suda-quruda yaşayanların sürfələri də qəlsəmə tənəffüsünə malikdir.

Qəlsəmələr nazik epiteli çıxıntılarından əmələ gəlmiş və qan damarları ilə sıx əhatə olunmuş orqandır. Onlar kapilyar qan damarları ilə zəngindir. Qəlsəmələr xarici və daxili olmaqla iki yerə ayrılır. Xarici qəlsəmələr saçaqlı və tük şəklində olub orqanizmdən ətraf mühitə uzanır. Balıq sürfələrinə, iki cür tənəffüslü balıqlarda və qurbağa çömçəquyruğunun ilk inkişaf dövründə tənəffüs xarici qəlsəmələrlə olur.

Daxili qəlsəmələrdə isə qaz mübadiləsi qəlsəmə yarpaqlarında baş verir. Dəyirmiəgzirlilərdə və qığırdaqlı balıqlarda qəlsəmə yarıqları birbaşa ətraf mühitə açıldığı halda, sümüklü balıqlarda onların üzəri qəlsəmə qapağı ilə örtülür.


7 Sxemə əsasən balıqlarda tənəffüsün başvermə mexanizmini izah edin.



Qəlsəmə tənəffüsünün mexanizmi


Tənəffüsün başlanğıcında qəlsəmə qapağı qapanır, ağız açılır və su ağıza daxil olur. Sonra ağız yumulur, qəlsəmə qapağı açılır. Beləliklə, su qəlsəmə yarpaqlarını yuyur. Bu zaman suda həll olmuş oksigen qəlsəmə yarpaqlarını bürüyən kapilyar damarlarına, karbon qazı isə qandan diffuziya yolu ilə suya keçir. “Çırkələnmiş” su qəlsəmə qapağının altından xaricə çıxır. Beləliklə, xarici tənəffüs tamamlanır.

Traxeya tənəffüsü. Quruda yaşayan buğumayaqlılarda (cücülər və hörümçəkkimilər) traxeyaların olduğunu bilirsiniz. Cücülərin əksər döş və qarıncıq buğumlarında yerləşən (hər buğumda 2 ədəd) və *stigma* adlanan nəfəsgahlarla hava orqanizmə daxil olur və çıxır. Nəfəsgahlardan hava traxeyalara daxil olur.




Traxeyalar şaxələnir və bütün orqanizmdə nazik borucuqlara ayrılır. Borucuqların içi maye ilə doludur. Qazlar mübadiləsi bu maye vasitəsilə həyata keçirilir.

Buğumayaqlıların bəzilərinə: hörümçək və əqrəblərdə kitabşəkilli ağ ciyərlər və traxeyalar olur. Hörümçəklərdə traxeyalar bir cüt, əqrəblərdə isə dörd cütdür və hər traxeya bir tənəffüs dəliyi ilə xaricə açılır.




Kitabşəkilli ağ ciyər

- 7 Verilmiş şəkllə əsasən canlıların ağ ciyərlərinin quruluşunda baş verən dəyişikliklərin səbəblərini araşdırın. Bu dəyişikliklərin tənəffüs prosesinə necə təsir göstərdiyini müəyyənəldirən və fikrinizi əsaslandırın.



Bəzi onurğalılarda ağ ciyərlər

Ağ ciyər tənəffüsünə onurğalılardan iki cür tənəffüslü balıqlarda, yetkin qurbağalarda, sürünənlərdə, quşlarda və məməlilərdə rast gəlinir. Orqanizmlərin enerjiyə tələbatı artdıqca ağ ciyərlərin quruluşu dəyişir. Hətta eyni sinifdən olan orqanizmlərdə belə bəzi dəyişikliklər müşahidə olunur. Quşlarda tənəffüs prosesində hava kisələri də iştirak edir. Hava kisələrinin həcmi uçan quşlarda uça bilməyənlərə nisbətən daha böyük olur.



Quşlarda tənəffüs prosesi

Quşların ikiqat tənəffüsü nəticəsində udulan havadakı oksigendən daha çox istifadə olunur. Əgər məməlilər havadakı oksigenin təqribən 20–25%-dən istifadə edərsə, quşlarda bu, 80–90%-ə çatır.

Tənəffüs zamanı orqanizmə lazım olan oksigen qana daxil olur və hüceyrələrə daşınır.

Bitkilərdə tənəffüs

Bitkilər də tənəffüs edir. Onlarda qaz mübadiləsində iştirak edən strukturlar aşağıdakılardır:

- Yarpaqlarda rast gəlinən *ağızcıqların* açılıb-bağlanması nəticəsində qazlar mübadiləsi baş verir. Yosunlarda ağızcıqlara rast gəlinmir.

- Qaz mübadiləsində iştirak edən *mərciməklər* çoxillik ağac və kol bitkilərinin gövdəsində olur. Mərciməkləri təşkil edən mantar hüceyrələri cansızdır. Açılıb-bağlanmaları ağızcıq hüceyrələrində olduğu kimi baş vermir. Yaz-yay aylarında açıq, qışda isə qapalı olur.

- Bitki kökləri, əsasən, torpaqda olan havanın tərkibindəki oksigen ilə tənəffüs edir. Bataqlıq bitkilərində qaz mübadiləsini həyata keçirən tənəffüs kökləri əmələ gəlir. Torpaqda lazımınca hava olmadığından bu köklər oksigeni havadan alır.

- Əsas fizioloji proseslərdən biri olan tənəffüs canlıların həyatında mühüm rol oynayır. Tənəffüsdə baş verən dəyişikliklər orqanizm üçün təhlükəli ola bilər.

6

1. Üzəri şüşə qapaqla örtülmüş otaq bitkilərindən biri işıqda, digəri qaranlıqda saxlanıldıqdan sonra qablara yanar çöp daxil edilərsə, nə baş verər? Səbəbini izah edin.



2. Uyğunluğu müəyyən edin.

• Mayböcəyi

• Pələng


ağ ciyər

traxeyalar

alveol

stiqma

3. Göstərilmiş sxemi dəftərinizə çəkin və oxların üzərində müvafiq qazların adlarını yazın.



4. Uçma qabiliyyəti olan heyvanlarda uçmaqla əlaqədar tənəffüs sistemində əmələ gələn uyğunlaşmalara aid təqdimat hazırlayın.

3

Canlılarda ifrazat

M Canlıların qəbul etdiyi iri molekullu üzvi qida maddələri mərhələlərlə parçalanır. Alınan maddələrin bir qismi orqanizmin hüceyrələrinin qurulmasında iştirak edir. Digər qismi isə energetik mübadilə nəticəsində tam parçalanır və bu zaman enerji ayrılır. Parçalanma məhsullarının bəziləri orqanizmə lazım olmur, hətta onların bir qismi zərərli məhsullara çevrilir. Orqanizm belə məhsulları necə xaric edir? Bu məhsullar hansı maddələrdir?

? Şəkillərə baxın və sualları cavablandırın.



- Bitkilərdə son parçalanma məhsulları necə xaric olunur?
- Birlüceyruşlilərdə və qurdlarda ifrazat necə həyata keçirilir?
- Buğumayaqlılarda ifrazat məhsulları necə xaric olunur?
- Onurğalı heyvanlarda ifrazat necə baş verir?
- Məməlilərin ifrazat sistemini təşkil edən orqanlar hansılardır?


Maddələr mübadiləsinin son məhsullarının orqanizmdən xaric edilməsi *ifrazat* adlanır. Canlılarda ifrazat orqanları fərqlidir.

Bitkilərdə ifrazat. Bitkilərdə xüsusi ifrazat orqanları yoxdur. Əksər bitkilər ifrazat məhsullarını buxar şəklində ağzıciqlardan xaric edir. Bildiyiniz kimi, bu, *transpirasiya* prosesi adlanır. Çiyələk və buğda kimi bitkilərdə damcılar şəklində ayrılan su özü ilə duz və digər maddələri də çıxarır. Bu, *quttasiya* adlanır. Bitkilərin sintez etdiyi nektar və efir maddələri də ifrazat məhsullarıdır. Bəzi ifrazat məhsulları vakuollarda toplanır və xəzan vaxtı yarpaqlar töküldükcə bitkilərdən uzaqlaşır. Bitkilərin bir qismi kökləri vasitəsilə lazımsız məhsulları xaric edir.



Yarpaqda ifrazat


Birhüceyrəli heyvanlarda ifrazat. Şirin sularda yaşayan adi amöb, yaşıl evqlena və infuzor-tərlik kimi birhüceyrəli heyvanlarda *ifrazat vakuolu* adlanan orqanoid var. Ifrazat vakuollarında ifrazat məhsulları toplanır. Bu orqanoid vaxtaşırı partlayır və suda həll olmuş lazımsız maddələr hüceyrə membranı vasitəsilə xaricə atılır. İbtidailərdə ifrazat *diffuziya* və *osmotik tənzimləmə* ilə həyata keçirilir.




İnfuzor-tərlikdə ifrazat

Çoxhüceyrəli onurğasızlarda ifrazat. Süngərlərdə və bağırsaqboşluqlarda xüsusi ifrazat orqanları yoxdur. Onlar ifrazat məhsullarını diffuziya nəticəsində bədən səthi ilə xaric edir.

Yastı qurdlardan olan ağ planaridə *protonefridial* tipli ifrazat sistemi mövcuddur. Belə heyvanlarda parenxima daxilində ulduzabənzər hüceyrələr var. Bu hüceyrələr ifrazat məhsullarını toplayaraq xırda borucuqlara, oradan isə iri ifrazat borucuqlarına axıdır. Toplanmış ifrazat məhsulları bədən səthi ilə orqanizmdən kənarlaşdırılır.




Soxulcanlarda ifrazat məhsulları orta buğumlarda yerləşən (*hər buğumda bir cüt*) ifrazat orqanları (*metanefridi*) vasitəsilə xaric olunur. Metanefridilərin genişlənmiş qıfşəkilli hissəsi maddələr mübadiləsinin son məhsullarını toplayır, nazıqlaşmış hissəsi isə bu məhsulları xaric edir.



Soxulcanda ifrazat

Molyusklarda həlqəvi qurdların metanefridilərinə oxşar böyrəklər vardır. Böyrəklərin kirpikli hüceyrələrində toplanan ifrazat məhsulları bir kanalla mantı boşluğuna açılır, oradan da kənarlaşır. Buğumayaqların ən geniş yayılmış nümayəndələri olan cücülərin ifrazat məhsulları *Malpigi boruları* vasitəsilə xaric olunur. Bir ucları qapalı olan bu borular bədənə əmələ gələn lazımsız məhsulları qandan toplayaraq bağırsaqlara ötürür. Cücülərin qarıncığının divarında və daxili orqanları üzərində olan *piy cisimcikləri* də ifrazata xidmət edir. İfrazat prosesi çay xərcəngində baş hissədə yerləşən *cüt yaşıl vəzilər*, hörümçəkkimilərdə isə *Malpigi boruları* və *xüsusi vəzilərlə* həyata keçirilir.




Qarışqanın ifrazat sistemi

Onurğalılarda ifrazat. Bütün onurğalı heyvanlarda ifrazat orqanları böyrəklərdir.

7

Şəkilləri nəzərdən keçirin, müxtəlif onurğalıların ifrazat sistemlərini müqayisə edin.



Qədimdən böyrəklərin ifrazat məhsullarını xaric etdiyi məlum olsa da, onların iş mexanizmi çox sonralar öyrənilmişdir.

Yaşadıqları mühitdən asılı olaraq, onurğalıların ifrazat orqanlarının quruluşunda fərqliliklər yaranmışdır. Hətta şirin su və duzlu suda yaşayan balıqların belə ifrazat orqanlarının quruluşunda fərqli xüsusiyyətlərə rast gəlinir. Bunun nəticəsində orqanizmlər öz daxili maye mühitlərini sabit saxlayır.

Şirin su balıqlarının əksəriyyətinin bədəninin üzəri pulcuqlarla örtülüdür. Onların yaşadığı mühitdə təzyiq aşağıdır. Balıqların bədənindəki osmotik təzyiq bədən səthindən və qəlsəmələrdən daxil olan su nəticəsində tənzimlənir. Onlar heç vaxt su içmirlər və çoxlu sidik ifraz edirlər. Bədənəndən itirilən duzların yeri qəlsəmələr vasitəsilə sudan alınan duzlarla bərpa edilir.

Duzlu su balıqlarının bədənindəki təzyiq sudakı təzyiqdən aşağıdır. Ona görə də onların bədənində su itkisinin baş verməsi mümkündür. Bu səbəbdən belə balıqlar daima dəniz suyu içir, nəticədə çoxlu duz qəbul edir. Duzun artığı qəlsəmələrdən xüsusi hüceyrələr vasitəsilə xaricə atılır. Duzlu su balıqları çox az miqdarda sidik ifraz edir. Onlar bədənələrində olan ammonyakın çox hissəsini qəlsəmələri vasitəsilə xaricə çıxarırlar.



Duzlu su balığı



Şirin su balığı

Quruda yaşayan canlıların orqanizmində su itkisinin qarşısını alan uyğunlaşmalar vardır. Bir çox heyvanlar bunun nəticəsində uzun müddət su içmədən yaşaya bilər. Məsələn, dəvələrdə güvənlərdəki piyin oksidləşməsi metabolik suyun ya-

ranmasına səbəb olur. Onların digər bir uyğunlaşması isə böyrəklərdə suyun geri sorulmasını təmin edən kanalların daha uzun olmasıdır. Bunun nəticəsində geriye daha çox su sorulur.

Ərəbistanda yaşayan səhra heyvanlarından biri olan Ərəbistan antilopu suya olan tələbatının 80%-ni yediyi qida, 14%-ni isə metabolik su ilə ödəyir. O heç zaman tərləmir, çox isti olanda bədəninin temperaturu 37°C-dən 40°C-dək qalxır. Hava soyuduqda isə yenə də 37°C-yə enir. Artıq su itkisinin olmaması üçün heyvanın ifrazatı çox qatı olur.



Canlıların həyat fəaliyyətini davam etdirməsi üçün ifrazat çox vacibdir.



- Yaşadıqları mühitdən asılı olaraq, müxtəlif canlıların ifrazatlarının fərqli olduğunu əsaslandırın.
- Verilmiş cədvəli nəzərdən keçirin.

Canlı	Azotlu qalıq	Su itkisi
Çay xanısı	ammonyak	?
Çölşiçanı	sidik cövhəri	az
Dəvəquşu	?	ən az

- Sualların yerinə uyğun gələnləri yazın.
- İfrazatın müxtəlif tərkibdə olmasının əhəmiyyəti nədir?
- Cədvələ əsasən yaşayış tərzinin müxtəlifliyi ilə ifrazatın arasında hansı əlaqənin olduğunu müəyyənəldirin.

- Ərəbdovşanında suyun qəbulu və ifrazı ilə əlaqədar uyğunlaşmaları izah edin.




Ərəbdovşanı

qida ilə alınan su




həzm ifrazat





M Canlılar müxtəlif səbəblərdən: qida, sığınacaq, dişi və s. uğrunda mübarizədən, qocalıqdan, xəstəliklərdən və digər səbəblərdən məhv olur. Bəs, görəsən, onların sayı nə üçün tükənmir?


- f**
1. Çoxalma nədir və onun hansı formaları vardır?
 2. Hansı canlılarda vegetativ çoxalmaya rast gəlinir?
 3. Şəkildəki hidranın hansı çoxalma üsuludur? Bu cür çoxalmaya daha hansı canlılarda rast gəlinir?



4. Şəkildəki canlıları çoxalma formalarına görə fərqləndirin. Onlarda çoxalma prosesinin necə getdiyini araşdırın. Araşdırmanızın nəticəsini təqdim edin.




5. Erkək qijıda nəsil növbələşməsinin mexanizmini şərh edin.



Bilirsiniz ki, canlıları cansızlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri çoxalmadır. Çoxalma bütün canlılara xas olan xüsusiyyətdir və onların sayının artmasına səbəb olur.

Çoxalmada orqanizmin əsas əlamətlərinin yeni nəslə ötürülməsi və nəslin davam etdirilməsi prosesi baş verir.



Qeyri-cinsi çoxalma cinsiyyət hüceyrələri iştirak etməyən çoxalmadır. Qeyri-cinsi çoxalmada yeni orqanizmin əmələ gəlməsində bir fərd iştirak edir (calaqla çoxalmadan başqa). Bu çoxalma zamanı alınan yeni orqanizmlər ana orqanizmin xüsusiyyətlərini daşıyır və hüceyrələr mitoz bölünmə yolu ilə alınır. Bu səbəbdən də əmələ gələn fərd başlanğıc fərdlə eyni genetik xüsusiyyətlərə malik olur. Qeyri-cinsi çoxalma canlıların dəyişməyən mühit şəraitinə uyğunlaşmaq qabiliyyətini saxlayır, stabilləşdirici təbii seçmənin rolunu möhkəmləndirir. Belə çoxalma üsulu ilə bir çox qiymətli bitki sortlarını çoxaldırlar. Ancaq qeyri-cinsi yolla çoxalan canlıların əksəriyyəti cinsi yolla çoxalmağa da qadirdir.

Qeyri-cinsi çoxalma:

- ▶ sürətli çoxalma üsuludur;
- ▶ dişi və erkək cinsiyyət hüceyrələri yaranmır;
- ▶ mayalanma getmir;
- ▶ əksər yeni nəsildə müxtəliflik nəzərə çarpmır;
- ▶ təkamüldə əhəmiyyəti azdır;
- ▶ fərdlər dəyişkən ətraf mühit amillərinə davamsızdır.

Cinsi çoxalma cinsiyyət hüceyrələrinin (qamətlərin) iştirakı ilə gedən çoxalmadır. Belə çoxalma zamanı, əsasən, qamətlərin biri ana, digəri isə ata orqanizmə məxsus olur. Yaranan qamətləri oxşar və fərqli cəhətlərinə görə müqayisə etdikdə bir neçə tip qamətəmələgəlmə ayırd edilir.

1. *İzoqamiya* – qametlər qamçılı, eyni ölçülüdür.
2. *Anizoqamiya* – qametlər oxşar quruluşlu, müxtəlif ölçülüdür.
3. *Ooqamiya* – erkək qametlər kiçik, qamçılı, dişi qametlər isə iri, qamçısızdır.

Mayalanmadan sonra yaranan ziqot hər iki valideynin əlamətlərini daşıyır. Bir çox orqanizmlər həm cinsi, həm qeyri-cinsi yolla çoxaldığı halda, onurğalılara yalnız cinsi yolla çoxalma xarakterikdir.

Cinsi çoxalma:


- ▶ erkək və dişi qametlərin iştirakı ilə gedir;
- ▶ qametlər heyvanlarda meyoza bölünmə yolu ilə, bitkilərdə isə həm meyoza, həm də mitoz bölünmə yolu ilə əmələ gəlir;
- ▶ ziqot yaranır;
- ▶ təkamülə səbəb olur;
- ▶ alınan fərdlər ətraf mühit amillərinə davamlı olur;
- ▶ yavaş gedən prosesdir.

Cinsi çoxalmada olan müxtəliflik bunlardır:

- **Konyuqasiya** cinsi prosesdir. Bu prosesdə iştirak edən fərdlər çoxalır. Ancaq onların orqanizmi nüvələrin yerdəyişməsi nəticəsində yeni xüsusiyyətlər qazanır və yeniləşir.

- **Nəsil növbələşməsi ilə gedən çoxalma** bəzi birhüceyrəliyərdə və sporlu bitkilərdə olur.

- **Partenogenez** canlılarda az rast gəlinən cinsi çoxalma üsuludur. Bu zaman mayalanmamış yumurtahüceyrədən orqanizm inkişaf edir. Bal arısı ailəsində gedən prosesdə həm mayalanmış, həm də mayalanmamış yumurtadan nəsil alınır. Mayalanmış yumurtalardan işçi və ana arılar, mayalanmamış yumurtalardan isə erkək arılar əmələ gəlir.



- **Çılpaqtoxumlularda cinsi çoxalma.** Erkək və dişi qozalarda cinsi hüceyrələr inkişaf edir, tozlanma və mayalanma nəticəsində toxum əmələ gəlir.

- **Çiçəkli bitkilərdə ikiqat mayalanma.** Örtülütəxumlu bitkilərin xarakterik əlamətlərindən biri də çiçəklərin əmələ gəlməsidir. Çiçəklərin erkək-ciklərində yaranan qametlərlə (spermələr) dişiciklərində yaranan qamet (yumurtahüceyrə) və mərkəzi hüceyrənin birləşməsi nəticəsində mayalanma baş verir, meyvə və toxum yaranır.

Toxumun rüşeymi mayalanmış yumurtahüceyrədən ($2n$), endospermi isə diploid mərkəzi hüceyrənin ($2n$) haploid (n) erkək qamətlə (sperm) birləşməsindən əmələ gələn triploid ($3n$) hüceyrədən əmələ gəlir.

Onurğalı heyvanlarda cinsi çoxalma. Cinsiyyət orqanlarında erkək və diş qamətlər inkişaf edir. Onların birləşməsindən ziqot yaranır. Ziqotun bölünməsi nəticəsində çoxhüceyrəli rüşeym inkişaf edir və nəhayət, orqanizmə çevrilir. Heyvanların cinsiyyət orqanlarının mənşəyi eyni olsa da, onların çoxalmasında bir sıra fərqli xüsusiyyətlər də var. Buna görə də heyvanlarda mayalanmanın iki formasına – xarici və daxili mayalanmaya rast gəlinir. Xarici mayalanma, əsasən, su heyvanlarına aiddir.

Quruda yaşayan heyvanlarda daxili mayalanma gedir. Quru heyvanlarının da çoxalmasında fərqli xüsusiyyətlər özünü göstərir. Buna aşağıdakıları misal göstərmək olar:

- ▶ Embrional inkişaf mayalandıqdan sonra xaricə qoyulan yumurta içərisində gedir (*quşlar, əksər sürünənlər, yumurtaqoyan məməlilər*).
- ▶ Embrional inkişaf ana orqanizmində başlayır, xaricdə tamamlanır (kişililər).
- ▶ Embrional inkişaf bütövlükdə ana orqanizmində tamamlanır (plasentalı məməlilər).

Mayalanma müxtəlif formalarda getsə də, yaranan ziqot yeni orqanizmə başlanğıc verir və bununla da canlıların yaşayıb öz nəsillərini davam etdirməsinə imkan yaranır.

Çoxalma canlıların nəslini davam etdirməsi üçün çox əhəmiyyətli bioloji prosesdir.

7. 1. Aşağıda verilənlərdən düzgün olmayanları seçin.
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a) çiçək tozcuğu – qatırquyuğu | b) bal arısı – partenogenez |
| c) qurbağa – daxili mayalanma | d) pələng – placent |
| e) amöb – ikiyə bölünmə | |
- 1) ac 2) be 3) de 4) ab 5) bc
2. Bir ana, iki işçi və beş erkək bal arısının əmələ gəlməsi zamanı mayalanmada bilavasitə cəmi neçə qamət iştirak edər?
3. Qruplaşaraq aşağıda verilmiş mövzular əsasında təqdimatlar hazırlayın. Təqdimatları müzakirə edin və nəticələri ümumiləşdirin.
- Qeyri-cinsi çoxalma və formaları;
 - Cinsi yolla çoxalan bitkilərdə uyğunlaşmalar;
 - Nəsil növbələşməsi ilə çoxalma;
 - Xarici mayalanma ilə çoxalan onurğalı orqanizmlərdə uyğunlaşmalar;
 - Daxili mayalanma və onun əhəmiyyəti.

M KÜSDÜM bitkisinde şiddətli külək, zədələnmə, yüksək temperatur, işıq intensivliyinin dəyişməsi, yarpaqlara edilən mexaniki təsir yarpaqların ani olaraq bükülməsinə səbəb olur. Bitkinin gövdəsinə təsir etdikdə isə bu proses əksinə gedir.

Yem axtaran heyvan düşməninin yaxınlaşdığını görəndə bir anlıq dayanır və sonra sürətlə qaçmağa başlayır.

Qeyd olunanlar arasında oxşarlıq varmı? Bu prosesləri necə adlandırmaq olar?



- 7**
- KÜSDÜMOTU bitkisinin yarpaqlarının xarici qıcıqlara cavab verməsi, anti-lopun düşməindən uzaqlaşması hansı mexanizm hesabına baş verir?
 - Reflekslə qıcıqlanmanı müqayisə edin, oxşarlıq və fərqlərini əsaslandıraraq təqdim edin.
 - Canlıların quruluşu mürəkkəbləşdikcə qıcıqlanmaların gedişində nə kimi dəyişikliklər müşahidə olunur? Araşdırmanın nəticələrini təqdim edin.

Canlılar yaşamaq üçün mühit amillərinə müəyyən reaksiyalar verir və qarşılarına çıxan maneələri dəf etməyə çalışırlar. Maneələri dəf etmək qabiliyyətləri olmadıqda onlar məhv olurlar. Məsələn, üzməyi bacarmayan insan dərin su hövzəsinə düşərsə, onun boğulma ehtimalı daha çoxdur.

Müasir dövrdə mövcud olan bütün canlılar mühitə uyğunlaşaraq bu günə qədər yaşaya bilmişlər. Canlılar aləminin bütün nümayəndələrinin hər hansı bir təsirə qarşı verdiyi cavab reaksiyası *qıcıqlanma* adlanır. Qıcıqlanmanın daxili və xarici forması vardır. Qanda tiroksin hormonunun miqdarı artanda ürək döyüntülərinin sayı artır. Bu, *daxili qıcıqlanmadır*. İnsanı əsəbiləşdirən zaman qanda adrenalinin miqdarı artır. Bu *xarici qıcıqlanmanın* təsiri ilə baş verir.


Bitkilərdə qıcıqlanma. Bitkilərdə qıcıqlanmanı müşahidə etmək çox asandır. Pəncərə qarşısına qoyulmuş dibçəklərdəki bitkilərin yarpaq və gövdələrinin işığa doğru çevrilməsi, günəbaxanın çiçək səbətinin sanki günəşin arxasınca gəzməsi, küsdümotu bitkisinin yarpaqlarına toxunan kimi bükülməsi *tropizm* adlanır. Tropizm xarici amillərin təsirinə qarşı bitki hissələrinin istiqamətli yerdəyişməsidir. Bitkilərdə tropizmi nəinki işığa, həm torpağa, həm də bəzi kimyəvi maddələrə qarşı da müşahidə etmək mümkündür. Zirinc bitkisiində həşərat erkəciyə toxunarsa, bitki dərhal sürətlə əyilir və həşərat tozcuğa bulaşmış olur.



Həşəratyeyən bitkilərdə həşəratların tutulması da qıcıqlanma və hərəkətin nəticəsidir. Mamır və qijinin spermatozoidləri yumurtahüceyrənin ifraz etdiyi maddələrə doğru üzür. Bu isə çoxhüceyrəli bitkilərdə *taksisə* misaldır.

İşıq və temperaturun gün ərzində dəyişməsi ilə əlaqədar bitkilərin çiçəklərinin açılıb-bağlanması sutkanın müxtəlif vaxtlarında baş verir. Bu, kasa yarpaqları və ləçəklərin hərəkətləri ilə əlaqədardır. Bitkilərin hərəkətinin digər səbəbi hüceyrələrdə olan suyun miqdarının dəyişməsidir.

Birhüceyrəliyərdə qıcıqlanma. Bakteriyalar üzərində aparılan müşahidələr nəticəsində aydın olmuşdur ki, onlar qidalı mühiti hiss edən kimi həmin istiqamətə doğru hərəkət edir. Amöblər olan suya duz kristalları qoyularsa, onlar yalançı ayaqlarını yığır, ovlarını hiss edən kimi yalançı ayaqlarını uzadıb onu tutur. Yaşıl evqlenalar qamçıları ilə hərəkət edir. Əgər onlar hər hansı bir maneəyə rast gələrsə, əvvəl dayanır, sonra geriye dönür və uzaqlaşır. Birhüceyrəliyərdə, eyni zamanda əksər çoxhüceyrəliyərdə bu cür cavab reaksiyası *taksisdir*. Taksis xarici qıcığa cavab olaraq hüceyrənin və bütöv orqanizmin istiqamətlənmiş yerdəyişməsidir.



**Çoxhüceyrəli heyvanlarda qı-
cıqlanma.** Heyvanların əksəriyyəti
çox hərəkətlidir. Ən mürəkkəb
hərəkətləri, əsasən, onurğalılarda
müşahidə etmək olur. Onlar qı-
cıqlara qarşı müxtəlif cür reaksiya-
lar verir. Məsələn, bəzi balıq sü-
rülərinə alt tərəfdən işıq saldıqda
onlar belə üstə üzməyə başlayır.



İbtidai heyvanlarda qıcıqlanma
hadisəsinin çoxhüceyrəlilərdə refleks adlandığı və onun sinir sistemi ilə
idarə olunduğu sizə bəllidir. Müxtəlif heyvanlarda sinir sisteminin inkişafı
fərqli olduğuna görə onlarda yaranan reflekslər də fərqli olur.

Sinir sistemi inkişaf edib mürəkkəbləşdikcə reflekslər də mürəkkəbləşir.
Düşməni gördükdə antilopun davranışı mürəkkəb şərti refleksdir.

Qıcıqlanma və reflekslər vasitəsilə orqanizm ona göstərilən təsirlərə ca-
vab reaksiyaları verərək fəaliyyət göstərir. Bu zaman onlar dəyişmiş ətraf
mühit şəraitinə uyğunlaşır.

7

1. Bitkilərin işığa doğru boy atmasının, köklərin torpaqda uzanmasının
səbəblərini izah edin.
2. Birinci şəkildə göstərildiyi kimi, it qıdanı götürə bilmir. O, geriye
gedib ikinci dəfə cəhd edərək qıdanı əldə edir. Sizcə, bu necə baş
verir?




3. Onurğalı heyvanlarda reflekslərin müxtəlifliyi haqqında araşdırmalar
aparın və təqdimatlar hazırlayın.

M Təbiətdə mövcud olan canlı orqanizmlər təklikdə deyil, qrup halında yaşayır, müxtəlif təbii birliklər yaradır. Bu birliklərdə canlılar və onların əhatəsində olan amillər arasında bir çox qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur. Bunlardan ən əhəmiyyətli qida əlaqələridir.

1. Qida əlaqələri necə yaranır?
2. Maddələrin cansız təbiətdən canlı təbiətə “axın”ını həyata keçirən hansı canlılardır?
3. Onlar bu “axın”ı necə reallaşdırırlar?
4. Bu canlıları necə qruplaşdırmaq olar?


J İki canlı arasında qida mübadiləsi sxemini nəzərdən keçirin. Verilənləri X və Y-ə uyğun olaraq qruplaşdırın. Qruplaşdırmanın səbəbini şərh edin.



- (A) palıd ağacı (B) xlorella (C) çürümə bakteriyası (Ç) istehsalçı
 (D) fil (E) ardıc (F) şampinyon (K) istehlakçı

Canlıların orqanizmini təşkil edən üzvi molekulların (*zülal, lipid, karbohidrat, nuklein turşuları, ATF*) tərkibində olan əsas kimyəvi elementlərdən biri karbondur. Onun mənbəyi havadakı karbon qazıdır. Normal halda atmosfer havasının tərkibində həcmcə 0,03% karbon qazı mövcuddur. Təbiətdə canlıların tənəffüsü, məhv olmuş canlıların çürüməsi, üzvi maddələrin minerallaşması nəticəsində karbon qazının miqdarı çoxalır.


Bəs necə olur ki, havada karbon qazının miqdarı nisbi sabit qalır?



Sxemi tamamlayın.


Avtotrof canlılar		
bəzi heyvanlar	?	bəzi bakteriyalar
?	?	?

Üzvi maddə istehsalçıları olan əksər canlılar fotosintez nəticəsində atmosferdə olan karbon qazının miqdarını azaldır, oksigen qazını isə artırır.



Avtotrof bakteriyalar lazım olan üzvi maddələri qeyri-üzvi maddələrdən sintez edir. Bu bakteriyalar fototrof (fotosintezedici) və xemotrof (xemosintezedici) olmaqla iki qrupa bölünür. Fotosintezedici bakteriyalar yaşıl bitkilərdə olduğu kimi, fotosintez edərək üzvi maddələr sintez edir. Fotosintez edən bakteriyalar üçün də enerji mənbəyi günəşdir. Lakin bunların malik olduqları xlorofil nə xromatoforda, nə də xloroplastda yerləşir. O, sərbəst surətdə sitoplazmada (qırmızı və yaşıl bakteriyalar) və fotosintezedici membran üzərində (sianobakteriyalar) yerləşir. Fotosintetik bakteriyaların işıq enerjisindən istifadə edərək üzvi maddə sintez etmə reaksiyaları:


LAYIHƏ




Reaksiyalardan görüldüyü kimi, bakteriyaların istifadə etdiyi hidrogen mənbəyi fərqlidir. Bu səbəbdən də onlar fotosintez edərkən hər zaman havaya sərbəst oksigen xaric etmir. Göy-yaşıl yosun adlandırılan sianobakteriyalar hüceyrələrində olan xlorofilin iştirakı ilə fotosintez prosesini həyata keçirir və sərbəst oksigen xaric edir. Ona görə də bunların əksəriyyəti canlıların yaşaya bilmədikləri üzvi maddələrlə çirklənmiş su hövzələrində yaşayır.

Xemosintezedici bakteriyalar qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez etmək üçün günəş enerjisindən deyil, bəzi kimyəvi reaksiyalar zamanı ayrılan enerjiden istifadə edir. Xemosintezedici bakteriyalar (kükürd, dəmir, nitrifikasiya) qeyri-üzvi maddələrin oksidləşməsi zamanı ayrılan kimyəvi enerji hesabına üzvi maddə sintez edir.

Avtotrof heyvanlar: Bihüceyrəli heyvan olan yaşıl evqlenanın sitoplazmasında 20-dən çox xromatofor olur. Evqlenalar gündüzlər işıqlı yerlərə toplaşır. Bu zaman onların hüceyrələrində fotosintez prosesi baş verir. Bu proses koloniya halında yaşayan volvoks hüceyrələrində də həyata keçirilir.



Yaşıl evqlena



Volvoks hüceyrələri

Bitkilər: Bu aləmdə növlərin əksəriyyəti xlorofilə malik olduğu üçün üzvi maddə istehsalçısı hesab olunur. Bitkilər tərəfindən sintez olunmuş üzvi maddələr bütün canlıların qida mənbəyinin təməlini təşkil edir.

ibtidai

xromotofor



yosunlar

ali

xloroplast



mamırlar



qıjıkimilər



çılpaqtoxumlular



örtülütoxumlular

Bildiyiniz kimi, üzvi maddələrin sintezi, əsasən, gündüz həyata keçirilir. Gecələr isə bu proses dayanır. Yalnız xemosintezedici canlılar onu bütün gün ərzində həyata keçirir. Üzvi maddə istehsalçıların ayırdıqları oksigen canlıların tənəffüsü üçün vacibdir.

Biosferdə üzvi maddə istehsalçıların əksəriyyətini təşkil edən bitkilər həyatın davamı üçün əvəzsizdir. İnsanlar bitkiləri qorumaqla, əslində, öz gələcəklərinə təminat vermiş olurlar.


6

1. Məsələləri həll edin:

- Normal şəraitdə fotosintezə 44,8 l karbon qazı sərf olursa, neçə qram qlükoza sintez olunar?
- Normal şəraitdə fotosintezdə 3 mol su istifadə olursa, bu zaman neçə litr karbon qazı sərf olunar?

2. Yataq otağına gül dibçəklərinin qoyulması məsləhətdirmi? Bunun səbəbini əsaslandıraraq şərh edin.

3. Verilən sxemdə hansı doğrudur?



- L üzvi maddə istehsalçısı, M istehlakçıdır.
- K fotosintezedici ola bilər.
- N özünə lazım olan üzvi maddəni sintez etmir.

- yalnız II
- yalnız III
- yalnız I
- I və III
- I və II

4. Xloroplastı olan hüceyrələr:

- atmosferdə oksigenin miqdarını artırır.
- qida maddələrindən enerji ayırır.
- atmosferdə karbon qazının miqdarını azaldır.

Verilənlərdən hansının həyata keçirilməsində işığa ehtiyac olur?


- yalnız I
- I və III
- I və II
- II və III
- yalnız III

5. Aşağıdakı canlıların məxsus olduğu aləmlərdə qidalanma üsullarını qeyd edin və ilkin üzvi maddə istehsalçıları müəyyənləşdirin.



M Bilirsiniz ki, canlıların qidalandığı maddələr təbiətdən alınır və əksəriyyəti orqanizmdə parçalanır. Parçalanma məhsullarının bir qismi yenidən orqanizmə məxsus maddələrin sintezinə sərf olunur. Digər qismi isə enerjiyə olan tələbatı ödəyir.

X və Y-in yerinə müvafiq terminləri yazın. Həmin proseslərin gedişi haqqında bildiklərinizi şərh edin.



- 7**
1. Hüceyrənin əsas maddələrindən biri olan zülallar necə sintez olunur?
 2. Bu proses hüceyrənin hansı strukturlarında reallaşdırılır?
 3. Zülalın ilkin quruluşu haqqında olan məlumat harada yerləşir?
 4. Məlumat DNT üzərində necə kodlaşdırılır?
 5. Məlumat ribosomlara necə çatdırılır?
 6. Ribosomda polipeptid zəncirin sintezi necə həyata keçirilir?

Zülal biosintezi çoxlu sayda fermentlərin iştirakı ilə gedən və yüksək enerji tələb edən prosesdir. Prosesin gedişində DNT, məlumat və nəqliyyat RNT-ləri, ribosom və amin turşuları iştirak edir. DNT molekulunda nukleotidlər müəyyən ardıcılıqla düzülür və irsi məlumatları öz üzərində saxlayır. İrsi məlumatlar *genetik kod* və ya *tripletlər* şəklində DNT üzərində kodlaşdırılır. Tripletlərin sayı dörd nukleotidin üç-üç qruplaşması nəticəsində $4^3 = 64$ olur.

Amin turşusu	Qısaldılmış adı	Amin turşusu	Qısaldılmış adı
Alanin	Ala	Leysin	Ley
Arginin	Arg	Lizin	Liz
Asparagin	Asn	Metionin	Met
Asparagin turşusu	Asp	Prolin	Pro
Valin	Val	Serin	Ser
Histidin	His	Tirozin	Tir
Qlisin	Qli	Treonin	Tre
Qlütamin	Qln	Triptofan	Tri
Qlütamin turşusu	Qlu	Fenilalanin	Fen
İzoleysin	İle	Sistein	Sis


Zülallarda monomer rolunu oynayan amin turşuları

I əsas	II əsas				III əsas
	U (A)	S (Q)	A (T)	Q (S)	
U (A)	Fen	Ser	Tir	Sis	U (A)
	Fen	Ser	Tir	Sis	S (Q)
	Ley	Ser	-	-	A (T)
	Ley	Ser	-	Tri	Q (S)
S (Q)	Ley	Pro	His	Arg	U (A)
	Ley	Pro	His	Arg	S (Q)
	Ley	Pro	Qln	Arg	A (T)
	Ley	Pro	Qln	Arg	Q (S)
A (T)	İle	Tre	Asn	Ser	U (A)
	İle	Tre	Asn	Ser	S (Q)
	İle	Tre	Liz	Arg	A (T)
	Met	Tre	Liz	Arg	Q (S)
Q (S)	Val	Ala	Asp	Qli	U (A)
	Val	Ala	Asp	Qli	S (Q)
	Val	Ala	Qlu	Qli	A (T)
	Val	Ala	Qlu	Qli	Q (S)

Eukariot orqanizmlərdə genetik koda uyğun amin turşuları

Cədvəldə mötərizədə olmayanlar m-RNT-nin nukleotidləri, mötərizədə olanlar isə DNT-nin nukleotidləridir.

Cədvəldə müvafiq genetik koda uyğun gələn amin turşusu ardıcıl olaraq üç nukleotidin kəsişmə nöqtəsinə düşür. Məsələn, m-RNT nukleotidlərindən SAU histidin amin turşusunun genetik kodudur.




20 amin turşusunu kodlaşdırmaq üçün 64 tripletdən 61-i iştirak edir. Tripletlərin sayı amin turşularının sayından çox olduğu üçün hər bir amin turşusu bir və ya bir neçə tripletlə kodlaşa bilər.

Amin turşu kodlaşdırmayan tripletlər zülal biosintezinin başa çatdığını bildirir və stop kodlar adlandırılır.

m-RNT-də	UAA	UAQ	UQA
DNT-də	ATT	ATS	AST

stop kodlar

m-RNT-nin *AUQ* kodu ribosomdakı fermentlər tərəfindən tanındıqdan sonra əksər zülalların sintezi başlayır. Metioninin kod tripleti olan bu triplet *start triplet* adlanır. Zülalın biosintezi nüvədə xromosom DNT-sinin bir zəncirindən matris əsasında həyata keçirilən transkripsiya ilə başlayır. Bu zaman ikizəncirli DNT-nin bir zəncirindən müəyyən zülal haqqında məlumat m-RNT-yə köçürülür.



DNT-dən RNT-nin sintezi


DNT { AAA TSS QTA QSA
TTT AQQ SAT SQT

m-RNT { AAA USS QUA QSA

m-RNT nüvə membranının məsamələrindən keçərək sitoplazmaya daxil olur. Əvvəl ribosomun kiçik hissəsinə bağlanır. Bundan sonra ribosomun böyük hissəsi kiçik hissəyə birləşir.

Translyasiya nüvədə m-RNT-nin ilk sintez olunan ucuna ribosom hissəciklərinin birləşməsi ilə başlayır. Ribosomun m-RNT-yə birləşən hissəsində (*funksional mərkəzində*) iki triplet yerləşə bilər. Birinci triplet m-RNT-nin kodunun tanınmasını, ikincisi isə onun zəncirə birləşməsini təmin edir. Zülalın monomerləri olan amin turşuları n-RNT vasitəsilə ribosomlara daşınır. n-RNT ilə m-RNT-nin kod tripletləri komplementar olduqda onlar arasında birləşmə baş verir. n-RNT-nin gətirdiyi amin turşusu zəncirə birləşdikdən sonra ribosom bir triplet irəliyə gedir. Bu proses 1/5, 1/6 saniyə çəkir. Prosesdə eyni vaxtda bir neçə ribosom iştirak edir və amin turşularını zəncirə birləşdirə bilər.

Zülalın biosintezi zamanı hüceyrədə suyun miqdarı artır, sərbəst amin turşularının miqdarı isə azalır.



n – sintez olunan nukleotidlərin (1) və amin turşularının (2) sayıdır. Endotermik olan bu proses ATF enerjisi hesabına gedir.



1. Məsələləri həll edin:

- a) Zülal molekulunun translyasiyası zamanı 50 molekul su ayrılmışdır. Bu zülalı kodlaşdıran hissənin transkripsiyasında neçə qram su ayrıldığını hesablayın.
- b) Zülal molekulunu kodlaşdıran m-RNT-nin kütləsi 180000 a.k.v.-dir. Bu zülal molekulunu neçə amin turşusu qalığından ibarətdir? (Bir nukleotidin orta a.k.v.-i 300-ə bərabərdir.)

2. Zülal biosintezi zamanı aşağıda göstərilənlərin zamandan asılılıq qrafikini tərtib edin:

- a) sitoplazmada amin turşularının sayını;
- b) zülalın tərkibinə daxil olan amin turşusu qalıqlarının sayını;
- c) suyun miqdarını;
- d) peptid rabitələrin sayını;
- e) biosintezdə iştirak edən fermentlərin miqdarının zamandan asılılığını.

3. Orqanizmə daxil olan zülalın parçalanma sxemini tərtib edin və kiçik təqdimat hazırlayın.

M Canlılar müxtəlif funksiyaları yerinə yetirmək üçün lazım olan maddələrlə qidalanır. Qida maddələri təkcə canlıların böyüyüb inkişaf etməsi üçün enerji mənbəyi deyil, digər proseslərdə də enerjiyə olan tələbatın ödənilməsi üçün lazımdır. Bu maddələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

A. mənşəyinə görə


- 1) bitki mənşəli
- 2) heyvan mənşəli

B. kimyəvi tərkibinə görə

- 1) üzvi (zülal, yağ, karbohidrat, vitaminlər və s.)
- 2) qeyri-üzvi (su və mineral duzlar)


C. funksiyalarına görə

- 1) energetik
- 2) inşaat
- 3) tənzimləyici



Bu maddələrdən hansı canlıların əsas enerji tələbatını ödəyir?

7 Aşağıdakı sxemi nəzərdən keçirərək sualları cavablandırın. Cavablarınızı ümumiləşdirib təqdim edin.





1. Hüceyrədə olan üzvi maddələrin parçalanmasından ayrılan enerji nəyə sərf olunur?

2. ATF-in hüceyrədə funksiyası nədir?
3. ATF-də olan makroergik rabitə qırıldıqdan sonra hansı proses baş verər?
4. ATF-in hidrolizi zamanı ayrılan enerji nəyə sərf olunur?


Maddələr mübadiləsinin gedışində canlılar hər hansı bir funksiya yerinə yetirərkən hüceyrələri qida maddələrinin kimyəvi rabitələr enerjisiindən istifadə edir. Qəbul olunmuş iri molekullu maddələr həzmə uğradıqdan sonra membrandan hüceyrə daxilinə keçir. Bu maddələr kimyəvi rabitələr enerjisi ilə zəngindir (1 q zülal – 17,6 kC, 1 q yağ – 38,9 kC, 1 q karbohidrat – 17,6 kC). Hüceyrələrin qida maddələrində olan enerjidən istifadə etməsi üçün bu enerjinin istifadəyə yararlı hala gətirilməsi lazımdır. Belə enerjinin daşıyıcısı ATF-dir.

ATF molekulları hüceyrələrin daxilində enerji mənbəyidir. Belə ki hüceyrə ayrılan enerjinin hamısından istifadə etmir. Onun bir hissəsi istənilən vaxt sərf olunmağa yararlı ATF molekulunda makroergik rabitələrdə saxlanılır. Bütün canlılar maddələr mübadiləsinə lazım olan enerjini hüceyrələrinə sintez olunan ATF-dən alır. ATF hüceyrələrdə sərf olunur və yenidən əmələ gəlir.



ATF-in parçalanması zamanı ayrılan ortofosfat turşusu orqanizmdə toplanmır. O ayrılan kimi yeni enerji daşıyıcısının sintezinə sərf olunur. Orqanizmdə ATF ehtiyatı əzələnin 20-30 dəfə yığılmasına kifayət edir. Ona görə də hüceyrədə ATF-in fasiləsiz sintezi gedir.


Müxtəlif canlılarda ATF-in sintezi özünəməxsus xüsusiyyətə malik olsa da, ümumi sxemi eynidir.



Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər bir hüceyrə özünə lazım olan ATF-i özü sintez edir. Çünki ATF molekulu hüceyrədən hüceyrəyə və ya canlıdan canlıya keçə bilmir.




1. Sxemdə göstərilən reaksiyalarda II fermentin quruluşunda dəyişiklik baş vermişdir.



• Dəyişikliklə əlaqədar hansı maddələrin sintezi pozular?

- A) E və F B) K və F C) yalnız E D) yalnız F E) D və E

2. Sxemdə hansı ox istiqamətində gedən reaksiyalarda ATF sintez olunur? Cavablarınızı əsaslandıraraq təqdim edin.



3. Məsələləri həll edin:


- ATF molekullarının AMF-ə parçalanması zamanı 160 kC enerji ayrılıbmışsa, neçə mol ortofosfat turşusu alınar?
- ATF molekullarında 4 makroergik rabitə olarsa, onlarda neçə ribozə olar?

M Əksər canlıların ən kiçik struktur və quruluş vahidi olan hüceyrə su, mineral duzlar və üzvi maddələrdən ibarətdir. Canlıların hüceyrələrində üzvi maddələr sintez oluna bilər. Bildiyiniz kimi, hüceyrənin əsasını təşkil edən üzvi maddələr karbohidrat, yağ, zülal, nuklein turşuları və vitaminlərdir. Bu maddələrin sintez olunub maddələr dövrəsinə qoşulması, əsasən, xlorofili olan canlılar tərəfindən həyata keçirilir. Bunlar üzvi maddə istehsalçılarıdır. Hazır üzvi maddələrlə qidalanan heterotrof orqanizmlər isə bu maddələrin istehlakçıları olur.

Bəs istehlakçıların orqanizmində üzvi maddələrin kimyəvi rabitə enerjisi nə kimi çevrilmələrə məruz qalır? Bu proses hansı mexanizm əsasında həyata keçirilir?


f Sxemi nəzərdən keçirin. Sualları cavablandırın.

- Qlükozanın parçalanması hansı mərhələlərdən ibarətdir?
- Bu zaman ayrılan enerji nəyə sərf olunur?
- Qlikoliz zamanı ATF-in sintezinə nə qədər enerji sərf olunur?
- Oksigenli prosesdə ATF-in sintezinə nə qədər enerji sərf olunur?
- ATF molekulunda makroergik rabitələrdə saxlanılan enerjini canlılar nəyə sərf edir?



Energetik və plastik mübadilə


Üzvi maddələrin fermentlərin iştirakı ilə parçalanaraq enerji əmələ gətirməsi *hüceyrə tənəffüsü* adlanır. Canlıların hüceyrələrində oksigenli (anaerob) və oksigenli (aerob) tənəffüs nəticəsində üzvi maddələrdən enerji alınır.



Qidanın tərkibində üzvi maddələr parçalanarkən oksigendən istifadə olunmursa, bu proses *oksigenli tənəffüs* adlanır. Bu proseslərdə fermentlər iştirak edir və parçalanma baş verir.




Qida maddələrinin oksigen və fermentlərin iştirakı ilə parçalanaraq enerji əmələ gətirməsi *oksigenli tənəffüs* adlanır.



7 Heterotrof orqanizmlərin yeganə enerji mənbəyi olan üzvi maddələrin oksidləşməsi prosesi necə həyata keçirilir?

Sizə bəllidir ki, prosesin başlanğıc mərhələsində zülallar amin turşularına, yağlar qliserin və yağ turşularına, karbohidratlar qlükozaya, etil spirtinə, nukleinin turşuları nukleotidlərə qədər parçalanır. Az miqdarda ayrılan enerji isə istilik şəklində ətrafa yayılır.


Qlükoza hüceyrə üçün əsas enerji mənbəyidir. Onun energetik mübadiləsinin mexanizmini nəzərdən keçirək. Qlükozanın oksigenli parçalanması mürəkkəb fermentativ prosesdir. Reaksiyada qlükoza iki molekul piroüzüm turşusuna ($C_3H_4O_3$) parçalanır. Sonra piroüzüm turşusundan süd turşusu ($C_3H_6O_3$) əmələ gəlir. Yekun tənlik aşağıdakı kimidir:




Qlükoza molekulu ($C_6H_{12}O_6$) tam parçalanmadığından bu proses *natamam parçalanma* adlanır. Alınan 200 kC enerji ardıcıl gedən fermentativ proseslərdə hissə-hissə ayrılır. Bu da hüceyrəni qızma nəticəsində məhv olmaqdan qoruyur. Qlükolizin gedişində ayrılan enerjinin hamısı istilik enerjisinə çevrilir. Onun bir hissəsi makroergik rəbitələrin yaranmasına sərf olunur. Nəticədə ADF-dən ATF sintez olunur. Oksigensiz mühitdə yaşayan canlıların enerji təminatı yalnız bu yolla olur.

Oksigenli tənəffüs zamanı prosesin davam etməsi üçün zədələnməmiş mitoxondri membranı, su, membran fermentləri, molekul halında oksigen (O_2), elektron daşıyıcıları, oksidləşdiricilər olmalıdır.

Mitoxondri daxilində süd turşusu hidrolizə uğrayır:




Əmələ gələn hidrogen atomu fermentlərin iştirakı ilə mitoxondrinin daxili membranının xaricinə çıxır və burada elektronunu itirir:




Hidrogendən ayrılmış elektron ətraf mühitdən daxil olmuş və mitoxondrinin kristlərinin daxili səthində toplanmış oksigenlə (*oksidaza fermentinin iştirakı ilə*) birləşir.





Əks yüklü hissəciklərin membranın müxtəlif tərəflərində toplanması nəticəsində potensiallar fərqi yaranır. Potensiallar fərqi 200 mV-a çatdıqda ATF sintetaza fermentinin proton kanalı vasitəsilə H^+ protonu mitoxondrinin daxilində keçir. Bu zaman ayrılan enerji ADF və ortofosfat turşusundan ATF sintezinə sərf olunur. Proton isə oksigenlə birləşir:



Oksigenli mərhələnin yekun tənliyi:



Enerji mübadiləsinin yekun tənliyi:



Enerji çevrilməsi

* Bioluminisensiya – canlı orqanizmlərin özlərindən işıq saçması

Alınan ATF hüceyrənin enerji tələbatını ödəyir. Əmələ gələn ADF və ortofosfat turşusu yenidən mitoxondriyə qayıdaraq növbəti prosesə qoşulur. Hüceyrədə ATF sintezinin pozulması onun məhvinə səbəb olur. Lakin normal halda qış yuxusuna getmiş heyvanların piy toxumasından energetik mübadilə zamanı ayrılan enerjinin çox hissəsi istilik enerjisinə çevrilir. Onlarda ATF sintezi, demək olar ki, getmir.

	ayrılan enerji	ATF sintezinə sərf olunan enerji	istilik şəklində ayrılan enerji
oksigeniz təbəffüs	200 kC	80 kC	120 kC
oksigenli təbəffüs	2600 kC	1440 kC	1160 kC
tam parçalanma	2800 kC	1520 kC	1280 kC


7

1. Cədvəli tamamlayın.

	oksigeniz təbəffüs	oksigenli təbəffüs	fotosintez
Proses harada gedir?			
Günün hansı vaxtında baş verir?			
Prosesdə istifadə olunur:			
Proses nəticəsində alınır:			
Hansı canlılarda gedir?			

2. Sxemdə verilmiş X, Y və Z-in yerinə aşağıdakılardan hansını yazmaq olar?

X	Y	Z
A) CO_2	qlükoza	CO_2
B) qlükoza	CO_2	H_2O
C) H_2O	CO_2	O_2
D) işıq	qlükoza	O_2



3. Məsələləri həll edin:

- ATF sintetaza fermentinin kanalından 16 hidrogen protonu keçərsə, nə qədər enerji istilik şəklində ayrılır?
- Yetkin insan askaridi əzələ fəaliyyətinə 160 kC enerji sərf etmişdir. Bunun üçün neçə qram qlükoza parçalandığını hesablayın.

M Planetimizdə yaşayan bütün canlıların enerji mənbəyinin günəş olduğunu və enerjisinin avtotrof canlılar tərəfindən üzvi maddələrin kimyəvi rabitələr enerjisinə çevrildiyini bilirsiniz. Günəş enerjisinin intensivliyinin dəyişməsi fotosintezə təsir göstərir. Bəs fotosintezin sürətinə daha hansı amillər təsir göstərir?






T Araşdırma aparın, aşağıdakı amillərin fotosintezin gedişinə təsirinin qrafik təsvirlərini verin və seçiminizi əsaslandırın.

► **Daxili amillər:**

- fotosintez gedən səthin sahəsi;
- xlorofilin miqdarı;
- bitki yarpağında ağzıqların sayı;
- fermentlərin miqdarı.

► **Xarici amillər:**


- karbon qazının miqdarı;
- istilik;
- su və mineral maddələr;
- işıq şiddəti;
- işığın dalğa uzunluğu.




Karbon qazının miqdarı və işıq şiddəti artdıqca fotosintez sürətlə gedir. Bir qədər sonra isə prosesin sürəti sabitləşir. Temperatur isə 25-35°C-yə çatana qədər proses sürətlənir. Temperaturun sonrakı yüksəlməsi ilə fotosintez zəifləyir və dayanır. Bitkilərdə görünən işığın iştirakı ilə gedən fotosintezin sürəti işığın qırmızı və göy spektrlərində yüksək, yaşıl və sarı spektrlərində isə zəif olur.

Fotosintez prosesinin mexanizmini nəzərdən keçirək. Əsasən, xloroplastlarda gedən bu proses qranların tilakoidlərinin membranlarında başlayır. Üzərinə işıq şüasının düşməsi ilə xlorofilin elektronlarının bəziləri həyəcanlanmış vəziyyətə keçir. Onların bir qismi öz orbitlərini tərk edir və elektron daşıyıcıları vasitəsilə qranların membranının xaricinə aparılır. Burada elektronlar mənfi yüklü elektrik sahəsi yaradır.


İşıq fazasında işığın təsiri ilə su fotolizə uğrayır:



Sudan ayrılan proton tilakoidlərin membranının daxilində müsbət elektrik sahəsi yaradır. Hidroksil ionu isə elektronunu verir və radikala çevrilir:



Radikallar sərbəst qala bilmir, birləşərək su və fotosintezin əlavə məhsulu olan oksigeni əmələ gətirir. Oksigenin bir hissəsi hüceyrə tənəffüsünə sərf olunur, bir hissəsi isə ətraf mühitə çıxır:



Xlorofilin elektronları ilə su molekulunun protonlarının yaratdığı əks yüklü elektrik sahəsinin təsiri ilə potensiallar fərqi yaranır. Potensial fərqi 200 mV (millivolt) olduqda tilakoidlərin membranı boyunca düzülmüş ATF-sintetaza fermentinin molekulları arasından proton kanalı açılır. H^+ protonlar kanalından keçərək yüksək enerji səviyyəsi yaradır. Bunun sayəsində ADF (adenozindifosfat) və ortofosfat (H_3PO_4) turşuları birləşərək ATF əmələ gətirir.

Beləliklə, işıq mərhələsində:

- molekulyar oksigen əmələ gəlir;
- ATF sintez olunur;
- hidrogen atomları alınır.


Əmələ gəlmiş ATF və hidrogen atomu qaranlıq fazada qlükozanın sintezində iştirak edir. Hidrogen stromada olan NADF^+ (nikotinamiddinukleotid-fosfat) vasitəsilə daşınır:



Stromada beşkarbonlu karbohidrat pentoza olur. Fotosintez zamanı sxemdəki çevrilmə həyata keçirilir:




Araşdırma apararaq sxemi izah edin.





Qaranlıq fazada işıq fazasının əksinə olaraq, karbonun fiksə olunması zamanı ADF və NADF^+ azad olur və yenidən prosesin gedişində iştirak edir.

Gecələr oksigen ayrılır. Günəşin çıxması ilə yenidən ATF və $\text{NADF} \cdot \text{H}$ -in sintezi başlayır. Sonra karbon fiksasiyası yenilənir.

Qaranlıq fazada gedən reaksiyanın tənliyi:



Fotosintezin ümumi tənliyi:



Fotosintez prosesinin sxemi

- Əksər bitkilər fotosintez prosesində günəş enerjisinin 1%-dən istifadə edir. Birlüceyrelili yosun olan xlorella isə günəş enerjisinin 12%-dən istifadə edərək daha sürətli fotosintez keçirir. Buna görə də kosmonavtlar kosmik gəmilərdə olarkən gəmilərə xlorella yerləşdirilir.

- Fotosintez zamanı əmələ gələn qlükoza ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) bitkilər üçün lazım olan üzvi maddələrin əmələ gəlməsində monomer rolunu oynayır. Bitkilər kökləri vasitəsilə torpaqdan suda həll olmuş mineral maddələri alır. Bu maddələrin bir qismi fermentləri fəallaşdırır. Digərləri isə fotosintez zamanı əmələ gələn karbohidratdan zülalların, hormonların sintezinə sərf olunur. Bu prosesdə nitratlar və sulfatlar əsas rol oynayır. Bitki yağları da karbohidratlardan sintez olunur.

- Fotosintez nəticəsində xlorofilli canlılar günəş enerjisini kimyəvi rabitələr enerjisinə çevirir. Canlılar sintez olunan maddələrin və ayrılan oksigenin hesabına həyatlarını davam etdirir.

Fotosintezin məhsuldarlığı:

1 m² yarpaq sahəsində 1 saatda 1 q üzvi maddə sintez olunur.

$$m = s \cdot t$$

m – sintez olunmuş üzvi maddənin kütləsi (qramla);
 s – fotosintezdə iştirak edən yarpaq sahəsi (kvadrat metrə);
 t – fotosintezin davametmə müddəti (saatla).


1

1. Qapalı şüşə qabda siçanın yaşaması üçün aşağıda verilənlərdən ən çox əhəmiyyətli olanları seçin.

- günəşin işıq şüaları;
- bitkinin fotosintezlə oksigen ayırması;
- bitkinin karbon qazının miqdarını azaltması;
- siçanın tənəffüs zamanı karbon qazını xaric etməsi;
- bitkinin fotosintez zamanı az üzvi maddə əmələ gətirməsi.




2. Sual işarələrinin yerinə müvafiq qeyri-üzvi birləşmələr əlavə edin. Sxemdə əks olunan proseslərin mexanizmini müvafiq reaksiyaların köməyi ilə şərh edin.



3. Aşağıda fotosintezin sürətinin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikə əsasən aşağıdakılardan hansını söyləmək olmaz?

- I torpaqda su miqdarı azalmış olar.
- II karbon qazının miqdarı dəyişməz ola bilər.
- III günəş enerjisi azala bilər.
- I atmosferə az oksigen xaric ola bilər.




4. Məsələləri həll edin.

- Fotosintezin qaranlıq fəzasında 48 mol hidrogen karbon qazı ilə birləşmişdir. Neçə mol qlükoza alınacağını hesablayın.
- Normal şəraitdə fotosintez nəticəsində 22,4 l oksigen əmələ gəlmişdir. Bu zaman neçə litr karbon qazı sərf olunmuşdur?

M Avtotrof canlılar qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edir.

Xatırlayın:

- Avtotrof canlılar necə qruplaşdırılır?
- Sxemdən işıq və xlorofili kənarlaşdırsaq, orada daha nə kimi dəyişiklik edilməlidir?




- Müvafiq dəyişikliklər edildikdən sonra bu sxem hansı prosesi əks etdirəcək?


Üzvi maddələrin əmələgəlmə intensivliyi gündüzlər daha yüksək olur. Çünki fotosintez prosesi işıqda həyata keçirilir. Lakin gecələr də üzvi maddə sintezi dayanmır. Siz kimyəvi rabitə enerjisindən istifadə edərək üzvi maddə əmələ gətirən bakteriyaların mövcudluğu haqqında məlumata maliksiniz. Xemosintezedici bakteriyalar öz fəaliyyətlərini həm gündüz, həm də gecələr həyata keçirir.

- f**
1. Xemosintezedici bakteriyalar hansılardır?
 2. Xemosintez fotosintezdən nə ilə fərqlənir?
 3. Bu bakteriyaların istifadə etdiyi enerji hansı reaksiyalardan alınır?

Xemosintez (yunan sözü olub “xema” – *kimya*, “sintez” – *birləşmə* deməkdir) prosesi rus mikrobioloqu Sergey Nikolayeviç Vinqradski tərəfindən 1889–1890-cı illərdə kəşf edilmişdir. Kükürd, nitrifikasiya, dəmir və hidrogen bakteriyaları bəzi ekzotermik reaksiyalar zamanı ayrılan enerjiden istifadə etməklə üzvi maddə sintez edir. Bu enerji hidrogen, hidrogen-sulfid, ammoniyak, dəmir 2-oksidi və s. kimi maddələrin oksidləşməsi nəticəsində ayrılır. Bəzi su hövzələri hidrogen-sulfidlə zəngin olur. Belə hövzələrdə kükürd bakteriyaları hidrogen-sulfidi oksidləşdirir:




Kükürd bakteriyaları tərəfindən sərbəst kükürd sulfat turşusuna qədər oksidləşə bilir. Bu reaksiya ekzotermikdir (istiliyin ayrılması ilə gedən):



Hər iki reaksiya nəticəsində ayrılan enerjiden (Q) karbon qazından üzvi maddə sintez etmək üçün istifadə olunur.

Torpağın məhsuldarlığı bakteriyaların həyat fəaliyyətindən çox asılıdır. Belə bakteriyalara hidrogen və nitrifikasiya bakteriyalarını misal göstərmək olar.


Oksigensiz parçalanmanı həyata keçirən bəzi bakteriyalar torpaqda hidrogen toplanmasına səbəb olur. Hidrogen bakteriyaları isə hidrogeni oksidləşdirir. Bu zaman ayrılan enerji isə üzvi maddə sintezinə sərf olunur:




Buna oxşar proses nitrifikasiya bakteriyaları tərəfindən də həyata keçirilir. Təbiətdə azot dövrənini təmin edən canlılardan ən mühümü bu bakteriyalardır. Zülalların çürüməsi nəticəsində əmələ gələn ammonyaka su hövzələrində və torpaqda rast gəlinir. Ammonyak nitrifikasiya bakteriyaları vasitəsilə nitrit turşusuna qədər oksidləşir:



Nitrit turşusunun nitrat turşusuna qədər oksidləşməsi digər bakteriyalar tərəfindən həyata keçirilir:



Bu bakteriyalar torpaqda nitratların miqdarının artmasında çox vacib rol oynamaqla bərabər, həm də xemosintez nəticəsində üzvi maddə sintez edir.



Xemosintezedici bakteriyalar qeyri-üzvi birləşmələrin enerjisinin üzvi birləşmələrin rabitə enerjisinə çevrilməsini fermentlər qrupunun köməyi ilə həyata keçirir. Bu canlıların qida əlaqələrində özünəməxsus yeri var. Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə sintez edən canlılar *produsent* adlanır. Xemosintezedici bakteriyalar produsentlərə aid edilir.



1. Fotosintez və xemosintezi cədvəldə verilmiş meyarlara əsasən müqayisə edin.

	Fotosintez	Xemosintez
Nə vaxt gedir?		
İstifadə olunan maddələr:		
Alınan maddələr:		
Hansı canlılar həyata keçirir?		

2. “Xemotrof bakteriyaların qida zəncirində rolu” mövzusunda məruzə hazırlayın.
3. Nitrifikasiya və denitrifikasiya bakteriyalarının fərqli xüsusiyyətləri haqqında cədvəl qurun.

Təqdimat mövzuları

1. Avtotrof orqanizmlərdə plastik və energetik mübadilənin mexanizmi.
2. Canlılarda gedən bioloji proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi.
3. Hüceyrədə baş verən plastik və energetik mübadilələrin müqayisəli xarakteristikası.
4. Üzvi maddələrin istehsalçı və istehlakçıları.

II. Canlılarda baş verən dəyişkənliklər

1

Canlılarda baş verən mövsüm dəyişkənlikləri. Fotoperiodizm

M İlin dörd fəslinin əlamətləri müxtəlifdir. Planetimizin coğrafi ərazilərində fəsil dəyişmələri bir-birindən fərqlənir. Ölkəmizdə də aran və dağ rayonlarında bu sahədə fərqlər olduğunu müşahidə etmək mümkündür. Hər bir coğrafi ərazidə yaşayan canlılar yaşadıkları ərazilərdə mövsümlərə məxsus uyğunlaşmalar qazanmışdır.

- Təbiətdə nə üçün fəsil dəyişkənlikləri baş verir?
- Hansı fəsil canlılar üçün daha əlverişlidir?

f Şəkillər üzrə canlıların mövsüm uyğunlaşmalarını fərqləndirin və səbəbini izah edin.



Kəskin mövsüm dəyişkənliyi zamanı canlıların davranışlarında və fizioloji proseslərində müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. Temperatur və günün uzunluğu artdıqca canlılarda fizioloji proseslər sürətlənir, temperatur azalıb günün uzunluğu qısaldıqca fizioloji proseslər zəifləyir.

FƏSİLLƏR			
yazda	yayda	payızda	qışda
• bitkilərdə şirə hərəkəti başlayır; • bitkilər yarpaq və çiçək açır; • bəzi bitkilər (fındıq, qızılağac, söyüd) yarpaqlamamış çiçək açır; • köçəri quşlar gəlir; • həşəratlar görünür; • quşlar yuva qurmağa başlayır.	• bitkilərdə böyümə prosesi zəifləyir; • quşlarda balavermə dayanır; • yayın ikinci yarısında əksər bitkilərin meyvə və toxumlarında ehtiyat qida maddələri toplanır.	• meyvələr yetişir; • xəzan baş verir; • cücülərin sayı azalır; • qış tumurcuqları yaranır; • meyvə və toxumlar yetişir; • köçəri quşlar uçub gedir.	• əksər canlılarda maddələr mübadiləsi zəifləyir; • qış sükunət halı başlayır; • fizioloji sakitlik yaranır.

f Araşdırma apararaq canlılarda: müxtəlif bitkilərdə, soyuqqanlı heyvanlarda, quşlarda, məməlilərdə qışa hazırlığı və qışlamaya uyğunlaşmaları müəyyənəldir.

Bitkilərdə qışa hazırlıq və qışlama. Bu dövrdə bitkilərin hüceyrələrində suyun miqdarı azalır, şəkərin miqdarı çoxalır. Bu onların donmasının qarşısını alır. Maddələr mübadiləsi çox aşağı düşür. Bu zaman bitkilər ehtiyat halında toplanmış yağlardan və karbohidratlardan istifadə edir. Ehtiyat qida maddələri birillik bitkilərdə – meyvə və toxumlarda, ikiillik və çoxillik ot bitkilərində isə həm də kökümsov, gövdə yumrusu, soğanaqlarda və s. toplanır. Bu səbəbdən də birillik ot bitkiləri – toxum; ikiillik ot bitkiləri birinci il, əsasən, meyvəköklər; çoxillik ot, kol və ağaclar isə, demək olar ki, özünəməxsus vegetativ və generativ orqanlarla qışlayır.

Soyuqqanlı heyvanlarda qışa hazırlıq və qışlama.

Həşəratlar sinfinin nümayəndələri inkişaflarının müxtəlif mərhələlərində qışlayır.

Bu canlıların hüceyrələrində qliserinin qatılığı artır və onlar donmur.


Suda-quruda yaşayanlar və sürünənlər soyuqqanlı olduqları üçün fəaliyyətlərini dayandırır və qışı anabioz (*həyatın geriə dönmə biləcəyi*) vəziyyətdə keçirir.

İstiqanlı heyvanlarda qışa hazırlıq və qışlama.

Quşlarda qışı keçirmək üçün lələk örtüyü qalınlaşır, bəzən rəngləri dəyişir. Onların bir çoxu qışlama miqrasiyası keçirir.

Məməlilərdə də qışa hazırlıq zamanı tük örtüyü qalınlaşır. Bəzi məməlilərin rəngi dəyişir. Bəzi məməlilər (*ayılar; porsuqlar; yarasalar; bir qism gəmiricilər və s.*) qış yuxusuna gedir. Yuxuda olduqları müddətdə onlarda maddələr mübadiləsi zəifləyir. Suyu olan tələbatlarını isə piy toxumasının parçalanması nəticəsində ayrılan su ödəyir. Bir qram piy parçalandıqda 1,1 q su alınır. Aktiv həyat tərzini keçirən məməlilərin bir qisminə miqrasiyalar həyata keçirilir.

f Bir çox hallarda yazda və payızda temperatur eyni olsa da, canlılarda gedən proseslər fərqli olur. Bunun səbəbini izah edin.



Kəpənəyin inkişaf mərhələləri

Fotoperiodizm. Təbiətdə canlı orqanizmlərin əksəriyyətində mövsüm dəyişikliyi temperatur dəyişmələri zamanı müşahidə edirik. Ancaq mövsüm hadisələrinin əsas tənzimləyicisi günün uzunluğudur.

Orqanizmlərin günün uzunluğuna qarşı olan reaksiyası *fotoperiodizm* adlanır.

Bitkilərin bir qismi uzun yaz və yay günlərində çiçəkləyir. Bunlar uzun-günlü bitkilər, payızda çiçəkləyən bitkilər isə qısgünlü bitkilər adlanır.

Uzun-günlü bitkilər	Qısgünlü bitkilər
fındıq, vələs, palıd, ağ akasiya, söyüd, buğda, çovdar, darı, arpa, kənaf və s.	payızgülü, zəfəran, soğangülü və s.

Mövsüm hadisələrinin tənzim edilməsində günün uzunluğunun əsas rol oynadığını bilməklə insanlar bir çox canlıların inkişafını idarə edə bilirlər. Mülayim iqlim qurşağında süni işıqlanma şəraitində bitkilər yarpaqlarını tökmür, həşəratlar inkişaflarını davam etdirir. Toyuqlarda yumurtavermə çoxalır.

7

1. Bitkinin bu cür inkişafının səbəbini izah edin.



15 saat işıqlanma



12 saat işıqlanma

2. Soyuqqanlı heyvanlar qışda fəal olmasalar da, donmurlar. Onların soyuqda donmamasının səbəbi nədir? İzah edin.

3. Qartalların və cücüyeyən quşların çoxalmasının müxtəlif xüsusiyyətlərini araşdırın və bunun səbəbini müqayisə edin.

4. Yaşadığınız bölgədə müşahidələr aparın və fəsil dəyişmələrinə canlıların necə uyğunlaşdıqları haqqında məlumat toplayıb təqdim edin.


Bitkilər	Cücülər	Quşlar	Məməlilər

M Çarlz Darvin hələ çox gənc yaşlarından canlılarda çoxlu fərqli xüsusiyyətlərin olmasını müşahidə etmişdir. İstər mədəni bitki və ev heyvanlarının, istərsə də təbiətdəki vəhşi heyvan və yabanı bitki növlərinin bu qədər müxtəlif olması onu maraqlandırmışdır. O apardığı tədqiqatlar nəticəsində bu qənaətə gəlmişdir ki, canlılar, əsasən, ətraf mühitin təsiri nəticəsində dəyişir. Alim öz fikirlərini çox sayla sübut etməyə çalışmışdır.



Şəkildəki heyvanların hamısı vəhşi turdan yaranmışdır. Nə üçün bu heyvanlarda fərqli xüsusiyyətlər meydana çıxmışdır?

- T** • Bitkilərdəki fərqli xüsusiyyətlərin səbəblərini aydınlaşdırın və təqdim edin.



Şam ağacları



Nərgizlər


Darvin apardığı müşahidə və araşdırmalar nəticəsində belə qənaətə gəlmişdir ki, orqanizmlər irsən malik olduqları fərdi xüsusiyyətlərlə və yaşadıkları şəraitdəki mühit amillərinin təsiri ilə əlaqədar inkişaf edir. Bu isə onlarda müxtəlif dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur.

Orqanizmlərin yeni əlamətlər qazanmaq kimi ümumi xassəsi və ya növ daxilindəki fərdlər arasındakı fərqlər *dəyişkənlik* adlanır.

Darvin dəyişkənliyin səbəblərini araşdırıb formalarını da göstərmişdir.



Qeyri-irsi və ya modifikasiya dəyişkənliyi. Növün müxtəlif şəraitdə yaşayan fərdlərində bəzi fərqli cəhətlərin meydana çıxması məlumdur. Məsələn, meşədə bitən adi şam ağacının çətiri yuxarıda yerləşir, açıqlıqda, meşə kənarında bitən şam ağacı isə daha qollu-budaqlı olur. Mühit şəraiti əlverişli olan yerlərdə bitən bitkilərlə əlverişsiz mühitdə yaşayan bitkilər eyni növdən olsalar da, fərqlənir. Ağbaş kələm isti ölkələrdə əkiləndə baş əmələ gətirmir. Ağ rəngli adadovşanlarının tükünü qırxdıqda yerinə buz bağlayanda onun yerindən qara tükər çıxır.



Mühit şəraitinin təsiri altında eyni genotipli* fərdlərdə müxtəlif fenotiplərin** yaranması *modifikasiya dəyişkənliyi* adlanır. İnsanın əkib-becərdiyi bitkilərdə də modifikasiya dəyişkənliyini asanlıqla müşahidə etmək mümkündür. Bir bitkinin qələmlərindən alınan nəsilərdə tam eynilik müşahidə olunmur. Bunun səbəbi bitkilərin işıqlanma səviyyəsi, torpağın strukturu, su və qida maddələri ilə təminatı, əlaqə otlarının olması və s. ola bilər. Belə dəyişmələr genotipə təsir etmir və nəsilədən nəslə ötürülmür. Modifikasiya dəyişkənliyinin həddləri *reaksiya norması* adlanır.


* Genotip – valideynlərdən alınan genlərin cəmidir.

** Fenotip – orqanizmin xarici və daxili əlamətlərinin cəmidir.

Canlılarda müxtəlif əlamətlərin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri eyni cür müşahidə olunmur. Qaramalda südün miqdarı yemin miqdarından asılı olaraq, çox dəyişir. Südün yağıllığını yemin miqdarını artırmaqla çoxaltmaq olmur. Yağıllığı yemin tərkibini dəyişməklə artırmaq mümkündür. Müşahidələr göstərir ki, heyvanın rəngini nə qidanın miqdarı, nə də müxtəlifliyi dəyişə bilər. Ancaq yuxarıda deyildiyi kimi, tükü qırılıb belinə buz bağlanmış adadovşanlarının belində ağ tük əvəzinə qara tükün çıxması rəngin də mühit amillərinin təsiri ilə dəyişə biləcəyini göstərir. Beləliklə, qaramalda südün miqdarı geniş reaksiya normasına, rəng isə ən dar reaksiya normasına malikdir.

7 Fikirləşin, reaksiya norması yalnız mühit şəraitindənmi asılıdır?

Modifikasiya dəyişkənliyi norması daxilində əlamətin dəyişkənliyi *variasiya sırasını* əmələ gətirir. Variasiya sırasındakıların hər biri *variant* adlanır. Hər variantın sayını hesablayıb görürük ki, orta ölçülülərə daha tez-tez, sıranın əvvəlində və sonunda olanlara isə daha az rast gəlinir. Əgər bunu qrafikdə göstərsək, variasiya əyrisi alınar. Variasiya sırasının genişliyi genotipdən də asılıdır.



Variasiyada əlamətin orta qiymətini müəyyən etmək üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:

$$M = \frac{\sum (V \cdot P)}{n}$$

M – orta qiymət;

P – variantın rastgəlmə tezliyi;

V – variant;

$\sum$ – cəm işarəsi;


n – variantların ümumi miqdarı.

Modifikasiya dəyişkənliyinin xüsusiyyətləri:


- genotip dəyişmir;
- irsən ötürülmür;
- növlərin uyğunlaşmasını təmin edir;
- tədricən baş verir;
- növləri qoruyub saxlayır;
- qrup xarakterlidir.

6

1. Yarpaqların variasiya sırasına baxın və orta ədədi qiymətini tapın.



2. Qrafikdə inəklərdə yemin miqdarı artırıldıqda südün miqdarını, südün yağıllığını göstərənləri müəyyən edin.



3. İki inəyə verilən yemi eyni miqdarda artırdılar. Heyvanların birində südün miqdarı cüzi, digərində isə çox artdı. Bunun səbəbini izah edin.

3

Mutasiya irsi dəyişkənlikdir

M

Modifikasiya dəyişkənliyinin canlıların genotipini dəyişmədiyini bilirsiniz. Ola bilmə ki, genotip dəyişsin? Bunun səbəbini nə ilə izah edərdiniz?

f


Şəkillərə baxın və onlarda əks olunanların normal fərdlərdən necə fərqləndiyini və bunun səbəblərini şərh edin.



İrsi dəyişkənlik. İrsi dəyişkənlik Çarlz Darvinə yaxşı məlum olsa da, dəyişkənliyin səbəbləri və mexanizmi ona aydın deyildi. Ancaq o, irsi dəyişkənliyin

təkamüldə çox böyük rol oynadığını müəyyənləşdirmiş və dəfələrlə qeyd etmişdir ki, dəyişkənlik təkcə xarici şəraitdən asılı deyil. Eyni şəraitdə yaşayan, eyni valideynlərdən törəyən nəsillərdə bəzən çox kiçik fərqlər, bəzən də kəskin nəzərəçarpaq dəyişkənliyə malik fərdlər yaranır.

Genotipin dəyişməsi ilə baş verən dəyişkənlik *irsi dəyişkənlik* adlanır.



Mutasiyalar irsi dəyişkənliyin bir növüdür. Orqanizmin xromosomlarında və genlərində baş verən hər hansı bir dəyişkənlik mutasiyaya səbəb olur. Mutasiyalar bəzən elə çox kiçik fərqlərə səbəb olur ki, onlar nəzərə belə çarpmır.



Bitkilərdə mutasiya

Bəzən isə mutasiya çox qabarıq dəyişkənliyə səbəb olur ki, bunlardan da insanlar istifadə edib, yeni sort və cins yaradırlar. Məsələn, qısaayaqlı ankon qoyun cinsi, qısaayaqlı taksa it cinsi, yumurtavari yarpaqlı çiyələk, sallaq və piramidaşəkilli çətiri olan ağaclar və s. belə yaranmışdır.

Mutasiya anlayışını elmə ilk dəfə gətirən holland botaniki Hüqo de Friz olmuşdur. O müşahidə etmişdir ki, enotera (eşşəkqulağı) bitkisinin yarpaqları arasında normal formadan kəskin fərqlənənlər vardır. Onların əlamətləri nə-sildən-nəslə irsən ötürülür. Belə dəyişkənliyə botanik *mutasiya* adı vermişdir.



Heyvanlarda mutasiya

Mutasiya genotiplərdə xarici və daxili mühit amillərinin təsiri ilə yaranan dəyişkənlikdir. Onların əksəriyyəti orqanizm üçün zərərli olur. Orqanizmin məhvinə səbəb olan mutasiyalar da vardır. Belə mutasiyaları daşıyan genlər, adətən, resessivdir. Genotipi dəyişdirmə xüsusiyyətinə görə mutasiyaların bir neçə növü məlumdur.



Xromosom mutasiyaları. Belə mutasiyalar zamanı xromosomların quruluşunda dəyişikliklər baş verir. Onların formaları çoxdur və işıq mikroskopu vasitəsilə asanlıqla müşahidə olunur.

❗ Əgər xromosomlarda olan genləri şərti olaraq ABCÇDE kimi işarələsək, onlarda necə dəyişmələr baş verə bilər?

Xromosomlarda baş verən dəyişmələr:

1. Sahənin ikiləşməsi: ABCCCÇDE
2. Sahənin çatışmazlığı: ABCÇE
3. Sahənin 180° çevrilməsi: ABÇCDE
4. Sahənin qeyri-homoloji xromosomlarda yerdəyişməsi: ABCÇMK

Genom mutasiyaları. Bu mutasiyalar xromosom sayının dəyişməsi nəticəsində baş verir. Onun iki formasına təsadüf olunur: *aneuploidiya* və *poliploidiya*.

Aneuploidiya xromosom sayının bir neçə vahid artması və ya azalmasıdır. Xromosomların normal paylanmaması meyoza prosesi zamanı baş verir: məsələn, insan hüceyrələrində daun sindromu $2n = 47$, Şerşevski-Terner sindromu $2n = 45$ olur. Göründüyü kimi, bu zaman xromosom sayının azalıb və ya artması ciddi dəyişikliklərə səbəb olur.

Poliploidiya xromosom yığımının bir neçə dəfə artmasıdır. Poliploidiya bitkilərdə geniş yayılmışdır. Heyvanlar aləmində nadir hallarda rast gəlinir. Orqanizmdə xromosom yığımı $3n$ olarsa, *triploid*, $4n$ olarsa, *tetraploid* və s. adlanır.

❗ Poliploid bitkilərə artıq və alp çəmənlərlərində daha çox təsadüf olunur. Bunun səbəbini araşdırın və müzakirə edin.

Gen mutasiyaları. Bu mutasiyalar *nöqtəvi mutasiyalar* da adlanır. Onları işıq mikroskopu ilə müşahidə etmək mümkün deyil. Bu mutasiyalar DNT

nukleotidlərində baş verən dəyişmələrlə əlaqədardır. DNT-də nukleotidlər yer dəyişdikdə amin turşularının yeni ardıcılığı müəyyən olunur ki, bu da yeni bir zülal sintezinə səbəb olur. Çox vaxt mutasiyaya uğrayan gen fəaliyyətdən qalır. Bu zaman RNT və zülal əmələ gəlmir. Gen mutasiyaları zamanı yeni allellər əmələ gəlir ki, bunun da təkamüldə çox böyük əhəmiyyəti vardır.

Somatik mutasiyalar. Somatik mutasiyalar orqanizmin bəzi somatik hüceyrələrində baş verir. Onlar bitki və heyvanlarda cinsi çoxalma zamanı irsən nəslə ötürülmür. Ancaq bitkilər vegetativ yolla çoxaldılarsa, bu mutasiyalar irsən nəslə ötürülə bilər.

? Bəs, görəsən, mutasiyaları eksperimental yollarla almaq mümkündürmü?

Müasir dövrdə mutasiyaların tezliyini artıran və yeni mutasiyalar yaranan metodlar vardır. Rentgen şüaları, ionlaşdırıcı şüalar, temperatur dəyişmələri, qaz rejiminin, rütubətin dəyişməsi və s. mutasiyaları artırır. Hazırda rentgen şüalarının təsiri ilə mutasiyaların tezliyini 150 dəfə artırmaq mümkün olur.

- 1.** Əgər diploid bitkini tetraploid bitkinin tozcuğu ilə tozlandırısaq, alınan hibrid bitkinin yarpaq hüceyrəsinin xromosom yığımı necə olar?
- 2.** Xromosomlarda genləri DEKMNL kimi işarələsək, baş verə biləcək mutasiyalardan bir neçəsini yazıb adlandırın.
- 3.** Bitkilərdə somatik mutasiyaların nəslə ötürülməsi formalarını yazın.

Çiyələk	Bıgıcıqlar vasitəsilə
Qızılgül	?
Uzambar bənövşəsi	?
Söyüd	?
Moruq	?

4

Kombinativ və korelyativ dəyişkənlik



Eyni valideynlərin övladları, adətən, valideynlərinin və bacı-qardaşlarının tam oxşarı olmur. Sizcə, bunun səbəbi nədir?




Şəkillərə baxın və əkiləri fərqləndirin. Bunun səbəbini izah edin. Kombinativ dəyişkənliyi yaradan əsas səbəblər nə ola bilər?



Müxtəlif yumurta əkiləri

İrsi dəyişkənlik təkcə mutasiyalar nəticəsində baş vermir. Cinsi çoxalma zamanı genlərin və xromosomların yeni kombinasiyaları yaranır ki, bunun nəticəsində yaranan orqanizmlərdə yeni əlamətlər və xassələr meydana çıxır. Bu cür dəyişkənlik *kombinativ dəyişkənlik* adlanır.



Kombinativ dəyişkənlik sonsuz sayda genotip və fenotipin yaranmasına səbəb olur. O, təbii seçmə üçün tükənməz material verir. Əgər qəbul etsək ki, insanda hər bir cüt homoloji xromosomda bir cüt allel gen yerləşir, onda mümkün olan qamətlərin müxtəlifliyi 2^{23} , genotiplərin sayı 3^{23} olar. Bu isə insanların sayından 20 dəfə artıqdır. Halbuki xromosomlarda genlərin sayı daha çoxdur.

7

Verilmiş çuğundur bitkilərini fərqləndirən əlamətləri müəyyənəldirən və səbəbini izah edin.



Ç.Darvin tükləri seyrək olan itlərdə dişlərin zəif inkişaf etdiyini, ayaqlarında lələk olan göyərçinlərin barmaqları arasında pərdə olduğunu müşahidə etmişdir. O bunun səbəbini izah edə bilməmişdir. Hazırda müəyyən edilmişdir ki, bu, bir genin bir neçə əlamətə təsir etməsi ilə əlaqədardır. Deməli, bir gen dəyişəndə bir neçə əlamət dəyişir. Belə dəyişkənlik *korelyativ (nisbətli) dəyişkənlik* adlanır. İrsi dəyişkənliyin bütün formaları genin və ya xromosom yığımının dəyişməsi ilə əlaqədardır.

t

1. İnsanlarda fenotiplərin (3^{23}) genotiplərdən daha çox olmasının səbəbi nədir? İzah edin.
2. Bəzən nisbətli dəyişkənlik seleksiyaçıları üçün sərfəli olmur. Bunun səbəbini araşdırın və şərh edin.
3. Şəkillərə baxın. Canlılarda olan dəyişkənlik formalarını yazın.



4. İrsi dəyişkənlik haqqında müxtəlif alimlərin irəli sürdükləri fikirləri araşdırın və təqdimatlar hazırlayın.

1

Maddələr mübadiləsi

M Maddələrin xarici mühitdən orqanizmə daxil olması, parçalanması və lazımsız məhsulların orqanizmdən xaric olunması kimi ardıcıl mürəkkəb prosesə *maddələr mübadiləsi* deyilir.

Maddələr və enerji mübadiləsi canlı həyatın əsasıdır. Orqanizm arası kəsilmədən xarici mühitdən qida maddələri, su, oksigen və mineral duzları mənimsəyir, karbon qazı, su, sidik cövhəri və s. maddələri isə xaric edir.

- Maddələr mübadiləsi müxtəlif canlılarda necə baş verir?
- Bu prosesin həyata keçirilməsində hansı ümumi qanunauyğunluqlar vardır?

J Şəkilləki canlılarda maddələr mübadiləsinin necə getdiyini şərh edin.

- Maddələr mübadiləsinin gedişinin müxtəlif canlılarda fərqli olmasının səbəbini izah edin.
- Müxtəlif canlılarda bu prosesin həyata keçirilməsində olan ümumi cəhətləri qruplaşdırın.
- Araşdırmanızın nəticələrini şifahi və ya yazılı şəkildə təqdim edin.



İbtidai orqanizmlərdən başlamış ali bitki və heyvanlar da daxil olmaqla bütün canlılar xarici mühitdən mənimsənilən qida hesabına böyüyür, inkişaf edir və çoxalır.

Bitkilər kökləri vasitəsilə torpaqdan su və mineral maddələri alır. Yarpaqlarda fotosintez prosesi gedir və üzvi maddələr sintez olunur. Heyvanlar bitkilərdən fərqli olaraq, hazır üzvi maddələrlə (karbohidratlar, yağlar, zülallar) qidalanır, həzm orqanlarında həzm prosesləri gedir.

Maddələr mübadiləsi bütün canlı hüceyrələrinə xasdır. Lakin onların fərqli cəhətləri də vardır. Yaşıl bitki hüceyrələri karbon qazını mənimsəyir, oksigeni xaric edir. Paxlalı bitkilərin köklərində yaşayan bakteriyalar havanın azotunu mənimsəyir, nitrat turşusu ifraz edir. Bəzi bakteriyalar hidrogen-sulfid mənimsəyir, kükürd xaric edir. Buna baxmayaraq, maddələr mübadiləsi ümumi bir qanuna tabe olur. Hüceyrə yaşayarsa, xaricdən maddələr fasiləsiz olaraq hüceyrəyə, hüceyrədən isə xarici mühitə verilir.

Orqanizmə daxil olan qida maddələri parçalanır, hüceyrənin mənimsəyə biləcəyi formaya salınır. Maddələr mübadiləsində fermentlərin rolu əvəzsizdir. Fermentlər qida maddələrini parçalayan əsas amildir. Orqanizmdə baş verən müxtəlif kimyəvi proseslərin cəmi maddələr və enerji mübadiləsi ilə nəticələnir. Hüceyrə daxilində gedən maddələr mübadiləsi orqanizmdə gedən ümumi mübadilənin ilkin mənbəyi hesab edilir. Çünki hüceyrə tərəfindən mənimsənilən maddələrdən orqanizmə məxsus zülallar, yağlar, karbohidratlar və nuklein turşuları sintez olunur. Həmin maddələr hüceyrənin hissələrinin formalaşmasında istifadə edilir. Böyüyən və yetkin hüceyrələrdə gedən sintez nəticəsində müntəzəm olaraq işlənmiş, istifadə olunmuş molekullar yeniləri ilə əvəz olunur. Maddələr mübadiləsi nəticəsində hüceyrə kimyəvi tərkibini və formasını daim sabit saxlaya bilir. Maddələr mübadiləsi bilavasitə enerji çevrilməsi prosesidir. Bu prosesin normal getməsi temperaturdan asılıdır. Temperaturun dəyişməsi prosesin sürətinə təsir göstərir.

Maddələr mübadiləsi, əslində, bir-birini əvəz edən mürəkkəb biokimyəvi proseslərin zənciri kimi başa düşülməlidir. Bu proseslər aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Xarici mühitdən maddələrin qəbul edilməsi;
2. Orqanizmdə həmin maddələrin istifadə olunması və digər maddələrə çevrilməsi;
3. Parçalanmış məhsulların bir qisminin xarici mühitə çıxarılması.

Maddələr mübadiləsi orqanizmdə üç əsas formada və istiqamətdə həyata keçirilir:

1. Ümumi maddələr mübadiləsi;
2. Aralıq maddələr mübadiləsi;
3. Əsas və ya enerji mübadiləsi.

Orqanizmdə müşahidə olunan oksidləşmə reaksiyaları *toxumanın tənəffüsü* adlanır. Bu zaman baş verən oksidləşmə-reduksiya prosesləri maddələr mübadiləsinin əsasını təşkil edir.

Aralıq maddələr mübadiləsi toxuma hüceyrələrində müəyyən üzvi birləşmələrin digərinə çevrilməsidir, yəni hüceyrədaxili həzm prosesidir.


Əsas və ya enerji mübadiləsi orqanizm üçün zəruri olan enerjinin alınması və bir enerji növünün digərinə çevrilməsi prosesidir.

Orqanizmin qidalanması ilə tənəffüsü bir-biri ilə əlaqəlidir. Bu proseslər maddələr mübadiləsinin əsasını təşkil edir.


Maddələr mübadiləsi canlı aləmdə eyni dərəcədə getmir. Soyuqqanlı heyvanlarda (*balıqlar, suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər*) proses zəif gedir. Onların bədəninin temperaturu həmişə xarici mühitdən asılı olur.

İstiqanlı heyvanlarda (*quşlar, məməlilər*) maddələr mübadiləsi intensiv gedir. Bu canlıların bədən temperaturu xarici mühitdən asılı olmur. Quşların şaxtılı havalarda belə bədən temperaturu 40°C -dən aşağı olmur. Buna görə ilin bütün fəsilələrində hətta Arktika və Antraktidada məməlilər və quşlar fəal həyat tərzini keçirirlər. Canlıların müxtəlif amillərə dözümlüliyü onların orqanizmində gedən maddələr mübadiləsindən asılıdır. Əksər soyuqqanlı heyvanlar qışı anabioz vəziyyətdə keçirir. Bəzi istiqanlı heyvanlar uzun müddət qış yuxusuna gedir. Bu mürəkkəb proseslər məhz maddələr mübadiləsi vasitəsilə tənzimlənir.


1. Sağdakı sxemdə qeyd olunan canlıları (A; B; C; D) müəyyən-ləşdirin. Bu canlılarda maddələr mübadiləsinin gedişinin müqayisəli xarakteristikasını şərh edin.



2. Oxlarla (1, 2, 3, 4) göstərilən proseslərin mexanizmini izah edin. X və Y canlılarında gedən maddələr mübadiləsinə aid təqdimat hazırlayın.



3. Yumrucuq və kükürd bakteriyalarının fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitdə sərbəst azotun (1) və kükürdün (2) miqdarının zamandan asılılıq qrafikini tərtib edin.



M Müxtəlif canlılarda gedən maddələr mübadiləsinin fərqli olmasının səbəbi nədir?

J Şəkilləri nəzərdən keçirin. İnsanlarda bu cür fərqliliyin yaranmasının səbəbini araşdırın və sualları cavablandıraraq təqdim edin.

- Maddələr mübadiləsinin gedişində sağlam həyat tərzinin nə kimi əhəmiyyəti var?
- Bu prosesin həyata keçirilməsinə hansı mühüm amillər təsir göstərir?



Maddələr mübadiləsinə təsir göstərən amillər orqanizmin həm daxilində, həm də xaricində mövcuddur. Daxili amillər orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsinə birbaşa, xarici amillər isə dolayı yolla təsir edir. Məsələn, həddindən artıq soyuğun orqanizmin daxili orqanlarına təsiri nəticəsində maddələr mübadiləsinin pozulması xarici amildir. Xəstəlik nəticəsində orqanizmdə baş verən dəyişikliklər daxili amil hesab edilir. Biotik, abiotik və antropogen amillərin orqanizmə təsiri əlverişli və əlverişsiz olur.

Maddələr mübadiləsinə təsir göstərən bir sıra amilləri nəzərdən keçirək.

► Maddələr mübadiləsinə *qidalanma prosesi* güclü təsir göstərir. Qidalanma prosesində aşağıda göstərilənlərə əməl olunmadıqda maddələr mübadiləsi pozulur:

- Sutkalıq qida payının verdiyi enerji kifayət qədər olmalıdır.
- Zülal, yağ və karbohidratlar normada qəbul olunmalıdır.

- Qida keyfiyyətə tam dəyərli, tərkibində bütün qida maddələrinin nisbəti normada olmalıdır (yağlar, zülallar, karbohidratlar).

- Qidalanma rejimi müəyyən edilməlidir. Qidalar gün ərzində düzgün bölüşdürülməlidir. Qidalanma sutkanın müəyyən saatlarında həyata keçirilməlidir.

► Maddələr mübadiləsi müxtəlif yaşlarda eyni olmur. Məsələn, azotun orqanizm tərəfindən mənimsənilməsi səviyyəsi orqanizmin yaşından, fəaliyyətindən və fizioloji vəziyyətindən asılıdır.

Uşaqlarda müsbət, yaşlılarda isə mənfi *azot balans* müşahidə olunur. Azot balansı sutka ərzində orqanizm tərəfindən mənimsənilən və xaric olunan zülalın miqdarına görə müəyyən olunur. Qidanın tərkibində olan azotdan xaric olunan azotun miqdarını çıxırlar. Alınan rəqəm 1,0-dan aşağı olarsa, mənfi; 1,0-dan yuxarı olarsa, müsbət; 0 olarsa, azot balansının tarazlığı yaranır. Ona görə də həkimlər xəstələrdə maddələr mübadiləsinin vəziyyətini yoxlamaq və diaqnoz qoymaq üçün qanda və sidikdə analizlər nəticəsində zülal, yağ, karbohidrat və s. miqdarını müəyyən edirlər.

► Maddələr mübadiləsinin nizamlanması vegetativ sinir sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Mərkəzi sinir sistemi daxili sekresiya vəzilərinin işini tənzimləyir. Sekresiya vəzilərinin hormonları isə, öz növbəsində, maddələr mübadiləsinə humoral yolla tənzimləyir. Maddələr mübadiləsinə həmçinin fermentlərin miqdarı da təsir göstərir. Beləliklə, həzm və maddələr mübadiləsinin tənzimi vahid neyrohumoral mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilir.

► Vitaminlər və mikroelementlər orqanizmdə maddələr mübadiləsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onlar orqanizmdə tənzimləyici kimi çıxış edir. Vitaminlər çatışmadıqda mübadilə prosesində pozulma baş verir. Müəyyən orqanların fəaliyyəti pozulur və xəstəlik yaranır.

Orqanizmin daim vitaminlərə və mikroelementlərə ehtiyacı vardır. Qidalanma düzgün getmədikdə orqanizmdə vitamin çatışmazlığı baş verir. Bunu *hipovitamin*oz adlandırırlar. Orqanizmin 40-a qədər vitaminə tələbatı vardır. Bir vitamin digər vitamini əvəz edə bilmir. Onların birinin orqanizmdə olmaması böyük fəsadlar törədə bilər.

Qidada vitaminlər və mikroelementlər normada olmalıdır ki, qida maddələrinin mənimsənilməsi, orqanizmin inkişafı normal təmin olunsun, müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə qarşı davamlılıq artsın.

► Uzun sürən aclıq və susuzluq maddələr mübadiləsinə kəskin təsir göstərir. Bu amillər onların sinir və humoral tənzimləyici funksiyası ilə bağlıdır. Məsələn, qanda qlükozanın miqdarı az və ya çox olarsa, müxtəlif xəstəliklər yaranar. Bunlardan biri də *şəkərli diabet* xəstəliyidir. Xəstəlik orqanizmin maddələr mübadiləsinə kəskin təsir göstərir. Bu zaman qanda suyun miqdarı azalır (osmotik təzyiq artır), maddələr mübadiləsi pozulur, orqanizm normal fəaliyyət göstərə bilmir.

► Maddələr mübadiləsinə orqanizmə daxil olan zərərli maddələr də təsir göstərir. Orqanizmdə zərərli maddələrin miqdarı artdıqda maddələr mübadiləsinin pozulması baş verir. Məsələn, göbələklərlə zəhərlənmə, ilanın, zəhərli cücülərin sancması, dərmanlardan düzgün istifadə olunmaması və s. zamanı mübadilə pozulur. Bəzən bu orqanizmin ölümü ilə də nəticələnir. Həddindən artıq qida qəbulu da maddələr mübadiləsinin gedişinə təsirsiz qalmır.

► Xarici mühit amillərinin təsiri ilə bədənin artıq soyuması, istivurma, günvurma, güclü streslər, yorğunluq, spirtli içkilər, narkotik maddələr, siqaret çəkmək və s. maddələr mübadiləsinə mənfi təsir göstərir.



İstivurma zamanı ilk yardım

► QİÇS, hepatit, xərçəng və s. xəstəliklər orqanizmdə hüceyrə səviyyəsində gedən maddələr mübadiləsinə təsir göstərir. Orqanizmin fəaliyyətini zəiflədir və ya dayandıra bilir.



QİÇS-li xəstədə yaranan yaralar

► Maddələr mübadiləsinə orqanizmin normal istirahəti, insanlarla xoş münasibət, idman, normal yuxu, musiqi və s. müsbət təsir göstərir. Bütün bunlar orqanizmin sekresiya vəzilərinə, onlar da öz növbəsində, maddələr mübadiləsinə birbaşa və ya dolaylı yolla təsir göstərir.



Maddələr mübadiləsinə təsir göstərən amillər müxtəlif və çoxsaylıdır. Ona görə də mənfi amillərdən özünüzü və ətrafınızdakıları qoruyun.

6

1. Məsələləri həll edin:

1. İnsana lazım olan sutkalıq minimal qida normalarının onu nə qədər enerji ilə təmin etdiyini hesablayın.
2. 500 qram karbohidratın parçalanmasından alınan enerjinin hamısı ATF sintezinə sərf olunarsa, neçə mol ATF sintez olunur?

2. İnsanlar arasında şəkərli diabet xəstəliyinin artması səbəblərini araşdırın və təqdimat hazırlayın.

3. Araşdırma apararaq zülal, lipid və karbohidrat mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan 3 xəstəlik, onların əlamətləri və yaranma mexanizmlərinin izahını verin.

- M** 1988-ci ildə velosiped yarışında iştirak edən fransız velosipedçilərinin baldır əzələlərinin yarışdan sonra hədsiz zəiflədiyi müşahidə edilmişdir. Araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, 3 həftəlik yarış zamanı onların qəbul etdikləri qidada zülalların miqdarı az olmuşdur.



İnsan qidasının əsas tərkib hissəsini təşkil edən üzvi maddələr orqanizm üçün mühüm enerji mənbəyidir. Məlumdur ki, qidanın tərkibindəki bu birləşmələr orqanizmdə bir çox əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirir. Bunun üçün də bu maddələrin miqdarında baş verən dəyişikliklər insan orqanizmində bir sıra xəstəliklərə səbəb olur.

- 7** Zülal, lipid və karbohidratların funksiyalarını yadınıza salın.

- Zülal çatışmazlığı daha nəyə səbəb ola bilər?
- Üzvi maddələr çatışmasa, orqanizmdə nələr baş verər?
- Bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir?

Karbohidrat mübadiləsinin pozulması. Karbohidratlar qidanın əsas tərkib hissəsidir. Gündəlik qida rasionunda karbohidratlar zülallara nisbətən 4-5 dəfə çox olur. İnsan orqanizmində zülalların və yağların dissimilyasiya məhsullarından da karbohidrat sintez olunur. Lakin əsas karbohidrat mənbəyi qida maddələridir. İnsan orqanizmində karbohidrat mübadiləsi bir-biri ilə sıx əlaqəli olan aşağıdakı proseslərdən ibarətdir:

1. Qidanın tərkibində həzm sisteminə düşən karbohidratların həzmə uğrayaraq qana sorulması;

2. Qana keçmiş qlükozanın bir hissəsinin insulin hormonunun iştirakı ilə qlikogenə çevrilib ehtiyat halında toplanması;

3. Qlükozanın dissimilyasiyası;

4. Heksozaların (*altı karbonlu karbohidrat*) müxtəlif növlərinin bir-birinə çevrilməsi. Bu proses nəticəsində orqanizm heksozaların digər növlərindən olan fruktoza, qalaktoza sintez edir və öz tələbatına müvafiq şəkildə istifadə edir;


5. Karbohidrat strukturuna malik olmayan məhsullardan (*qliserin, bəzi amin turşuları və s.*) qlükozanın sintez edilməsi.

Bu proseslərin gedişində baş verən dəyişikliklər karbohidrat mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur. *Pankreatit xəstəliyi* zamanı mədəaltı vəzi tərəfindən ifraz olunan amilazanın miqdarı azalır. Nəticədə nişasta və qlikogenin həzmi pozulur. Uzun müddət bağırsaqda qalan nişasta qıcqırma prosesinə uğrayır. Buna görə də bağırsaq möhtəviyyəti turş reaksiyalı olur. Turş mühitin bağırsaq reseptorlarına təsiri nəticəsində ishal törənir. Bu xəstəlik zamanı mədəaltı vəzinin xarici sekretor funksiyası pozulur. Bu da təkə karbohidrat deyil, zülal və yağların da həzminin pozulması ilə nəticələnir. Karbohidratın aralıq mübadiləsinin pozulmasının əsas əlaməti qanda şəkərin qatılığının dəyişməsidir. Qanda şəkərin qatılığının 6,66 mmol/-dən (120 mq %) çox olması – *hiperqlikemiya*, 3,59 mmol/-dən (70 mq %) az olması isə *hipoqlikemiya* adlanır. Qanda qlükozanın qatılığı həddən artıq olduqda sidikdə şəkər ifraz olunur. Buna *qlükozuriya* deyilir. Bu cür dəyişikliklər patoloji proseslərdir. Hətta az vaxt ərzində çoxlu miqdarda şəkərlə qidalanma əsəbilik, şiddətli psixoemosional gərginlik nəticəsində də fizioloji *hiperqlikemiya* və *qlükozuriya* meydana çıxı bilər.

Qidalanma məqsədilə qısa müddətdə çoxlu şəkər qəbul edilməsi sağlam və xəstə şəxslərin qanında şəkərin qatılığına müxtəlif dərəcədə təsir göstərir. “Şəkər yükü” sınağı aparmaq məqsədilə belə adamlarda hər 15 dəqiqədən bir qanda şəkərin miqdarı yoxlanılır.

7 Qrafikdən istifadə edərək “şəkər yükü” sınağını xarakterizə edin.

şəkər, (mmol/l)



Lipid mübadiləsinin pozulması. Lipidlərin həzmi, əsasən, mədəaltı vəzi şirəsində olan lipazanın fəallığından asılıdır. Bu prosesdə öd də mühüm rol oynayır. Ona görə də hər iki orqanın funksiyalarında baş verən dəyişiklik lipidlərin həzminə və sorulmasına öz təsirini göstərir.

Öd axacağıının tutulması, öd kisəsinin iltihabı, öd sekresiyasının pozulması, infeksiya hepatit zamanı yağların həzmi və sorulması pozulur. Çünki onların sorulması bağırsaq möhtəviyyatında öd turşusunun olmasından asılıdır. Bu zaman nəcisin tərkibində hidroliz edilməmiş yağlar və üzvi turşular olduqda o, bozuntul-ağ rəngdə olur. Bağırsaq vərəmi, dizenteriya, enterokolit kimi bağırsaq xəstəlikləri zamanı bağırsaq divarının selikli qişasında anatomik dəyişiklik baş verir. Bu da lipid hidrolizi məhsullarının sorulmasının pozulmasına səbəb olur.

Qida maddələrinin tərkibindən yağların və digər lipidlərin çıxarılması yolverilməzdir. Çünki bu zaman insan yağlarda həll olan vitaminlərdən (A, D, E, K) və əvəzedilməz yağ turşularından məhrum olur.

Amin turşu mübadiləsinin pozulması. Amin turşu mübadiləsinin pozulmaları qazanılmış və irsi olmaqla iki qrupa bölünür. Qazanılma xarakterli pozulmalara qidanın keyfiyyətsizliyi (qidada əvəzedilməz amin turşularının və bəzi vitaminlərin çatışmazlığı), həzm sisteminin funksiyasının zəifliyi, endokrin sistemin bəzi xəstəlikləri, uzunmüddətli aclıq və s. amillər səbəb ola bilər. Əvəzedilməyən amin turşularının hər hansı birinin və ya bir neçəsinin çatışmazlığı orqanizmdə zülal biosintezinin zəifləməsinə səbəb olur. Bu zaman qanda sərbəst amin turşularının miqdarı artır. Sidikdə normal göstəricidən artıq miqdarda amin turşusu ifraz edilir. Qidasının tərkibində əvəzedilməz amin turşularından biri və ya bir neçəsi çıxarılmış heyvanlarda ümumi zəiflik və sinir fəaliyyətinin pozulması müşahidə edilir.

İnsanın qidasında amin turşularından olan *triptofanın* çatışmazlığı ciddi arıqlamaya, *lizin* çatışmazlığı başgicəllənməyə və ürəkbulanmaya, *histidin* çatışmazlığı qanda hemoqlobinin miqdarının azalmasına səbəb olur.

Albinizm. Bu xəstəlik amin turşusu mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəlikdir. Bu zaman dəridə, tüklərdə və gözün qüzehli qişasında pigmentin əmələ gəlməsi pozulur, dəri və tüklər ağ, gözlər isə qırmızımtıl olur. Hazırda irsi pozğunluqlar nəticəsində amin turşusu mübadiləsinin pozulmalarının 100-dən çox xəstəliyə səbəb olması müəyyənləşdirilmişdir.


Zülal mübadiləsinin pozulması. Bədəndə zülallar daima parçalanır və yeniləri ilə əvəz olunur. Böyüməkdə olan orqanizmin zülallara ehtiyacı daha çox olur. Zülal mübadiləsi pozularsa, orqanizmdə çox böyük fəsadlar yaranar. Ancaq orqanizmdə zülal mübadiləsi pozğunluqlarına az rast gəlinir.

Mədə şirəsində pepsinin azalması çox vaxt xlorid turşusunun azalması nəticəsində baş verir. Xlorid turşusu çatışmayanda maddələrin pepsinə çevrilməsi prosesi ləngiyir. Bu zaman zülal mübadiləsi pozulur. Mədə və bağırsaqalarda ferment çatışmazlığı qida maddələrinin tam həzminə imkan vermir. Orqanizmə daxil olan zülalların 90 %-i mənimsənilir. Bu zaman orqanizmdən nəcislə xaric edilən azotun miqdarı sutkada 2,5 qramdan artıq olmur. Zülal mübadiləsi pozulanda bu, 3 qram və daha artıq olur. Zülalların tərkibinin dəyişməsi bir çox xəstəliklərin yaranması ilə nəticələnir. Xüsusən uşaqlarda belə hal *ağıl kəməliyinə* və erkən yaşlarda ölümə səbəb olur.



1. Çoxlu karbohidrat qəbul etmiş insanın qanında bu maddənin miqdarının zamandan asılılıq qrafikini nəzərdən keçirin. Bu insan haqqında mülahizələrinizi təqdim edin.

qanda karbohidratın miqdarı



2. Qidanın tərkibində əvəzolunmaz amin turşularının çatışmamasının zülal biosintezinə təsirinin qrafik təsvirini verin.
3. Araşdırma apararaq bağırsaq divarında anatomik dəyişikliklərin baş verməsinin lipid mübadiləsinə təsirinin səbəbini izah edin.

M İnsan canlı orqanizmdir. Mühitin abiotik və biotik amilləri ona da təsir siz qalmır.

- Sizcə, insan sağlamlığına abiotik amillər necə təsir göstərir?

7 Orqanizmlərə normadan artıq işıq, rütubət və temperaturun mənfi təsirlərinə aid nümunələr göstərin.

Temperatur	Rütubət	İşıq

Əsas abiotik amillərə işıq, temperatur, rütubət və s. aiddir. Bu amillərin canlıların həyatında böyük əhəmiyyəti var.

Temperatur. Yer üzərində temperatur rejimi mövsümdən, bölgələrdən asılı olaraq müxtəlif cür dəyişir. Məsələn, yanvar ayında müxtəlif coğrafi zonalarda havanın orta temperaturu -40°C ilə $+30^{\circ}\text{C}$ arasında tərəddüd edir. Yay ayında isə 0°C -dən aşağı və 40°C -dən yuxarı ola bilər. Amma ekvator da daimi temperatur orta hesabla $+25-30^{\circ}\text{C}$ olur. Müəyyən olmuşdur ki, dəniz səthindən yuxarı dağlıq zonaya qalxdıqca temperatur aşağı düşür, yəni hər 100 m yüksəklikdə $0,5^{\circ}\text{C}$ azalır.

Temperatur bitkilərin, heyvanların və insanların həyatına müxtəlif cür təsir göstərir. Məsələn, ontogenezin gedişində, ömrün uzunluğunda, balavermə qabiliyyətində və s. bunu müşahidə etmək olur.

Heyvanlar bədən temperaturuna görə *soyuqqanlı* və *istiqlanlı* olmaqla iki yerə ayrılır. Soyuqqanlı heyvanlarda bədən temperaturu ətraf mühitin temperaturundan asılıdır. Ona görə də onlarda enerji mübadiləsi və həyat rejimi xarici mühitin dəyişən temperaturuna uyğunlaşmışdır. İstiqlanlı heyvanlarda maddələr mübadiləsinin daha intensiv getməsi bədən temperaturunun sabit saxlanmasına və xarici mühitin temperaturundan asılı olmamasına səbəb olmuşdur.

Təkamül prosesində quşlarda, məməlilərdə, eləcə də insanlarda daha mükəmməl tənzimləyici sistem yaranaraq bədən temperaturunun sabit saxlanmasına imkan vermişdir. Onların fəaliyyəti xarici mühitin mənfi temperaturunda da davam edir. Ancaq temperaturun kəskin dəyişməsi canlılarda gedən fizioloji proseslərdə dəyişiklik yaradır.

Su. Canlı orqanizmlərin fəaliyyətində mühüm əhəmiyyətə malik olan biokimyəvi reaksiyalar üçün əsas mühit, həm də sitoplazmanın vacib tərkib hissəsidir. Qida maddələri orqanizmdə, əsasən, suda həll olmuş vəziyyətdə dövr edir. Orqanizmdə su mübadiləsi bir-birinə əks olan iki prosedən ibarətdir:

- orqanizmə suyun daxil olması;
- onun xaric edilməsi.

İnsan orqanizminə su onu içərkən və qidanın tərkibində daxil olur. Su orqanizmdən qida qalıqları ilə qarışaraq nəcis, sidik, hava və tərkib vasitəsilə xaric edilir. Beləliklə, orqanizmdə su mübadiləsi və onunla birlikdə digər maddələr mübadiləsi baş verir. Su orqanizmdə maye və buxar şəklində ola bilər. Canlı orqanizmlər susuz yaşaya bilmir. Suyun təsir gücü onun dövrə-nindən, paylanma formasından və atmosferin tərkibində buxarlanmanın dərəcəsi-dən asılıdır. Biosferdə su mühüm rol oynayır, iqlimi formalaşdırır, fotosintez zamanı fotolizə uğrayır, OH^- və H^+ ionlarına parçalanır, üzvi maddə sintezində əsas rol oynayır. Su mühitində canlıların sağlamlığını qo-rumaq üçün müxtəlif proseslər gedir. İnsan orqanizmində gedən biofiziki və biokimyəvi proseslərdə su çox həyati prosesləri tənzimləyir.

Sağlamlıq üçün suyun keyfiyyəti vacib şərtlərdən biridir. Suyun keyfi-yəti dedikdə onun müəyyən məqsəd üçün yararlı olması başa düşülür. Suyun çirklənmə dərəcəsi onun kimyəvi tərkibinin dəyişməsi, insan sağlamlığı üçün zərərli olması və xəstəlik törətmə qabiliyyətinə malik olmasıdır. Yerüs-tü və yeraltı suların çirklənməsinin əsas səbəbi məişət, sənaye və kənd təsər-rüfatından gələn təmizlənməmiş çirkab sularının axıdılmasıdır. Suların çirk-lənməsi nəticəsində onun mineral, üzvi, bakterioloji və bioloji tərkibi dəyiş-ərək canlılar üçün təhlükə törədir.

İşıq. Canlı varlıq kimi insanın da yaşaması günəşdən asılıdır. Günəş şüası görmə analizatoru vasitəsilə insanı məkanda istiqamətləndirir, mərkəzi sinir sisteminin vəziyyətinə təsir göstərir. Işıq orqanizmdə fotokimyəvi proseslərə, həyatın sutkalıq ritminə, maddələr mübadiləsinə və s. təsir göstərir. Günəşin ultrabənövşəyi şüaları insanın endokrin vəzilərinin fəaliyyətini gücləndirir. Günəş radiasiyasının çoxluğu və azlığı sağlamlığa mənfi təsir göstərir. Işıq çatış-mazlığı insanlarda vərəm və ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsini çətinləş-dirir. Günəş radiasiyasının çoxluğu insanda immunitet zəifliyi, bədxassəli şiş-lərin yaranması təhlükəsini artırır. İstilik, rütubət və işığın əmələ gətirdiyi müxtəlif birləşmələr hava axınına, atmosfer təzyiqinə, elektrik hadisələrinə səbəb olur. Bu hadisələr hava amilləri vasitəsilə canlı orqanizmə təsir göstərir.

Müəyyən olunmuşdur ki, insan üçün ən əlverişli şərait havanın 40-60 % rütubətliyi, 18-20°C temperatura malik olduqda mümkündür. Təmiz havada kifayət qədər oksigen olması isə insanda şən əhvali-ruhiyyə, fəal iş qabiliy-yəti yaradır.

Hava insana həm hərtərəfli, həm də ayrı-ayrı komponentləri vasitəsilə tə-sir göstərir. Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi qanın oksigenlə doymasını aşağı sa-lır və sinir uclarını mexaniki şəkildə qıcıqlandırır.

İstilik, rütubət və işığın müəyyən həddə dəyişməsi havadakı ionların və molekulaların nisbətini dəyişmir. Buna görə orqanizmdə kəskin dəyişikliklər baş vermir.

6

1. Uyğunluğu müəyyən edin və seçiminizi şərh edin.

- temperatur
- suyun çirklənməsi
- radiasiyanın çoxluğu

- a) bədxassəli şişlər
- b) yoluxucu xəstəliklər
- c) istivurma
- d) ürək-damar xəstəlikləri
- e) immunitetin zəifləməsi

2. Abiotik amillərin təsiri nəticəsində maddələr mübadiləsində yaranmış pozulmalara aid təqdimatlar hazırlayın.

3. Havada temperaturun normadan artıq olması hansı canlıların fəaliyyətinə daha çox təsir göstərir? Seçiminizi izah edin.



M Bəzi uşaqlar 10–15 və daha artıq yaşa çatsalar da, gördükləri, eşitdikləri onların yadında qalmır. Bəziləri hərfləri tanısalar da, oxuya bilmir, rəqəmləri yadda saxlayıb hesablamağı bacarmırlar.

- Belə hallar hansı səbəblərdən baş verir? Bu cür halların baş verməməsi üçün, sizcə, nə etmək olar? Belə qüsurlar hansı orqanlar sisteminin fəaliyyətinin pozulması ilə əlaqədardır?

J Bəzən insanlar aldıkları zədə nəticəsində düşünmək qabiliyyətini itirirlər. Bunun başvermə mexanizmini araşdırın. Gəldiyiniz nəticəni qruplarda müzakirə edin.



İnsan orqanizmi çoxlu sayda şərtsiz və şərti reflekslər sayəsində xarici mühitlə əlaqədə olur. Qəbul olunmuş qıcıqlar beyin qabığında ayırd edilir. Cəmiyyətin həyatında özünü göstərən şüurlu fəaliyyətin əsasını insanın beyinində gedən mürəkkəb proseslər təşkil edir. Bəzən böyük beyin yarımkürələri qabığında yaranan dəyişikliklər orqanizmin həyati funksiyalarını pozur. Bu zaman əmək qabiliyyəti aşağı düşür, bəzən isə tamamilə itir. Bu hadisələr daxili və xarici mühitdə baş verən dəyişikliklər nəticəsində olur.

Məsələn, bir sıra xəstəliklər, zərərli vərdişlər, yetərinə hərəkət etməmək, normal qidalanmamaq, emosional gərginlik, az müddətdə çoxlu məlumatlar qəbul etmək, kompüterdə fasiləsiz işləmək insanın beyin qabığının funksiyalarını pozur və bu da bir çox hallarda dəyişiklik yaradır, ali sinir fəaliyyətinin pozulması ilə nəticələnir.



Cəmiyyətdə baş verən münaqişələr də insanın ali sinir fəaliyyətinə təsirsiz qalmır. Uşaqların sinir sistemi tam formalaşmadığı üçün belə hallar onlara daha çox təsir edir.



Bu dəyişikliklər böyük beyin yarımkürələri qabığında gedən oyanma və tormozlanma proseslərini pozur. Nəticədə insanda yuxunun və şərti reflekslərin pozulması, yaddaşın zəifləməsi və s. baş verir. Əgər bu dəyişkənliyi yaradan səbəblər vaxtında aradan qaldırılsa, insan yaşadığı mühiti dəyişərsə, öz istirahətini təmin edərsə, bu proseslər bərpa oluna bilər. Bəzən uzun müddət baş verən dəyişiklikləri həkim müdaxiləsi olmadan aradan qaldırmaq mümkün olmur.

İnsanın ali sinir fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olan amillərə alkoqol, nikotin, narkotiklər də aiddir. Alkoqol qəbul olunduqdan iki dəqiqə sonra qana keçir. Qan vasitəsilə bütün orqanlara, o cümlədən baş beyinin böyük yarımkürələrinin qabıq hüceyrələrinə çatdırılır. Bu da insanın davranışında ciddi mənfi dəyişikliklər yaradır.

Qanda alkoqolun miqdarı	İnsan orqanizmində baş verən dəyişikliklər
0,04–0,05%	İnsanın özünə nəzarəti itir, ağılla düşünə bilmir.
0,1%	Hərəkətlər nizamsız olur, səbəbsiz yerə sevinir, həyəcanlanır.
0,2%	Vəhşi instinktlər baş qaldırır.
0,3%	Alkoqol kütlüyü baş verir – insan nə eşitdiyini, nə gördüyünü ayırd edə bilmir.
0,4%	Huşunu itirir, yuxuya gedir, sidik ifrazı qeyri-iradi olur.
0,6-0,7%	İnsan ölür.

Nikotin də mərkəzi sinir sisteminə güclü təsir göstərir. Siqaret çəkən adamlar əsəbi olur, yaddaşları zəifləyir, əlləri əsməyə başlayır. Bu şəxslərdə beyin damarları daralır və bu səbəbdən orqanizmdə ciddi dəyişikliklər baş verir. Belə insanların ömrü xeyli qısalar.

Gün rejiminə düzgün riayət etmək insanın ali sinir fəaliyyətinin normal həyata keçməsi üçün əsas şərtlərdən biridir. Bu zaman insanda müxtəlif şərti reflekslər əmələ gəlir. Bu da orqanizmdə ritmik proseslərin baş verməsinə səbəb olur və sinir sisteminin yorulmasının qarşısını alır.



1. Bəzi uşaqlar kobud, bəziləri isə qaradınmaz və ya dəyməduşər olurlar. Bunun bioloji və ictimai əsaslarını şərh edin.
2. Uzun müddət zehni əməklə məşğul olmaq insanın ali sinir fəaliyyətində dəyişikliyə səbəb olur. Sinir sisteminin yorğunluğu diqqətsizliyə, yaddaşın pozulmasına və s. imkan yaradır. Bu halların baş verməməsi üçün nə təklif edərdiniz? Siyahı tərtib edin. Yorğunluğun aradan qaldırılması yollarını şərh edin.
3. Narkotiklərin insanın ali sinir fəaliyyətində törətdiyi dəyişikliklərə aid təqdimat hazırlayın.

M Qədim bir atalar sözündə belə deyilir: “Dayanmaqdan, oturmaq, oturmaqdan, uzanmaq daha yaxşıdır. Amma ən yaxşısı oturmuş və uzanmış vəziyyətdə hərəkət etməkdir”. Sizcə, bunun mənası nədir?

Həyat hərəkət deməkdir. Hərəkətsizlik daşlaşmış onurğa sütunu, boyunun fəaliyyətsiz əzələləri, soyuq, hissiyyətsiz əl və ayaqlar və s. deməkdir.

f Hərəkətin orqanizm üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Azhərəkətlilik hansı fəsadlara səbəb olur? Araşdırma apararaq sualları cavablandırın. Nəticəni təqdim edin.



Vaxtilə insanlar yaşamaq üçün, əsasən, fiziki əmək sərf etmişlər. Onlar ağır əzələ işindən can qurtarmaq üçün münasib yollar axtarmış və buna nail olmuşlar.

Müasir dövrdə əzələ işini əvəz edən və ya yüngülləşdirən texniki vasitələrin sayı gündən-günə artır.

f İnsanın əzələ işini yüngülləşdirən cihazların siyahısını tərtib edin. Onların orqanizm üçün fayda və zərərlərini müzakirə edin.



Hazırda insanların əksəriyyəti şəhərlərdə yaşayır. Kəndlər də şəhər yaşayış səviyyəsi normalarına uyğun abadlaşdırılır. Evlərin kanalizasiya və istilik sistemləri, isti və soyuq su ilə təchizatı, məişət və ticarət obyektlərinin yaşayış yerlərinə yaxın olması, məişət texnikalarının hər məqamda köməyə çatması insanların fiziki işlə az məşğul olmasına, bu da özlüyündə passivliyə və azhərəkətliyə gətirib çıxarır. Bütün bunlar bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.

70 gün tərpənmədən uzanan insanın ürəyinin ölçüsü 13–18 % kiçilir.

Bilirsiniz ki, ürəkdən vurulan qan damarlarla bütün hüceyrələrə çatdırılır. Ürəkdən axan qanın sürəti kapilyarlarda hədsiz aşağı düşür. Onu geri qaytarmaq isə skelet əzələlərinin yığılması sayəsində mümkün olur. Əgər əzələlər fəaliyyətdən qalarsa və ya fəallıqları azalarsa, hüceyrə və toxumalar üçün oksigen aclığı, qida çatışmazlığı yaranar. Maddələr mübadiləsinin son məhsullarının toxuma və orqanlardan kənarlaşması prosesi hüceyrə və toxumaların qanla təchizatında problem yarandığı zaman pozulur. Bu da orqanların iş qabiliyyətinin azalmasına, nəticədə isə xəstəliklərə səbəb olur. Belə hallarda arterial təzyiq artmağa başlayır. Bəzən qan damarlarının divarlarında yağabənzər maddə – *xolesterin* yığılır. Damarların divarında yığılan bu maddə onların mənfəzini daraldır və *ateroskleroz* xəstəliyinə səbəb olur. Bu xəstəlik çox vaxt ürəyin tac damarlarını zədələyir.

Fiziki işin yoxluğu insan ömrünü 4 il azaldır. Fiziki işlə məşğul olmamaq ürək xəstəlikləri və insult riskini iki dəfə artırır.

Ancaq insanlarda rast gəlinən ürək-damar xəstəliklərini (stenokardiya, miokard infarktı, insult və s.) yalnız hərəkət fəallığının azalması ilə əlaqələndirmək olmaz. Sinir gərginliyi, bədən çəkisinin artması, bədənə nikotin və alkoqolla tədricən zəhərlənməsi və s. də buna səbəb olur.

Hər bir insan öz əzələlərinin işləməsinin payğısına qalmalıdır.

Aktiv həyat tərzini keçirən insanlarda tez qocalma və artıq çəki problemləri çox azalır.



Əzələ işi

Sağlam olmaq üçün insanlar hər gün bir neçə kilometr piyada gəzməlidirlər. Təmiz hava, hərəkət, düzgün qidalanmaq insan sağlamlığı üçün vacib şərtlərdir. Orqanizmin, onun hüceyrə və toxumalarının fəaliyyəti yalnız dinclikdən yox, hərəkətdən də asılıdır.

Hərəkət təkcə fiziki sağlamlığı möhkəmləndirmir, o həm də iradəni gücləndirir, insana güc verir, onun sinir sisteminin sağlamlığına şərait yaradır. Sağlam olmaq üçün məənən və ruhən güclü olmaq tələb olunur. İradənin, əsəblərin və psixikanın gücü, doğrudan da, ürəyi və damarları gücləndirir.

Beləliklə, insanlar öz sağlamlıqlarını qorumaq üçün hərəkətdə olmalıdırlar. Alimlər belə nəticəyə gəliblər ki, insan sağlamlığının 10%-i irsidirsə, 5%-i həkimlərin yardımından, 85%-i isə özündən asılıdır. Deməli, sağlamlığımız həyat tərzimizlə bağlıdır.

1. “İşlənməyən dəmir pas atar” atalar sözünü müzakirə edin. Atalarımızın nə üçün bu qənaətə gəldiyini açıqlayın.
2. Bölgənizdə olan idman kompleksləri haqqında məlumat toplayın. Bu komplekslərdəki idman növlərinin siyahısını tərtib edin. İdman növlərindən birini seçərək onun orqanizm üçün əhəmiyyətini şərh edin.
3. “İdman sağlamlığın rəhnidir” mövzusunda təqdimat hazırlayın.

M

Qeyd etdiyimiz kimi, orqanizmin sağlamlığının əsas şərtlərindən biri hərəkətdir. Ancaq hərəkət etməklə yanaşı, istirahət etmək də zəruridir.

- İstirahətin orqanizm üçün əhəmiyyəti nədir?
- Orqanlar necə istirahət edir?
- İstirahəti necə təşkil etməli?



Sağlam olmaq üçün



f

- Ayrı-ayrı orqanların və bütövlükdə orqanizmin fəaliyyəti və istirahəti arasında olan əlaqələr hansılardır?
- Əlaqələri müəyyənləşdirib nəticəni təqdim edin.

İnsan orqanizmində olan əksər orqanlar həm işləyir, həm də istirahət edir. Ürəyin, əzələlərin, sinir sisteminin, həzm orqanlarının və s. necə işlədiyini bilərsiniz. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, istirahət fəaliyyətin ayrılmaz hissəsidir. İstirahət yoxdursa, sağlamlıq da yoxdur. Çünki istirahətsiz orqanizmin fəaliyyəti pozulur, hətta orqanlar, toxumalar, hüceyrələr zədələnilir. Bunun nəticəsində müxtəlif xəstəliklər yaranır.



Fiziki və zehni iş zamanı sinir hüceyrələri oyanır. Əgər bu oyanmalar çox davam edərsə, sinir hüceyrələrinin fəaliyyəti avtomatik olaraq ləngiyir, qıcıqları qəbul etmir və beləliklə, özlərini məhv olmaqdan qoruyur. Belə hallarda istər fiziki, istərsə də zehni işi dayandırmaq lazımdır ki, beyin qabığının və əzələlərin işi bərpa olunsun.

İstirahətin iki növü vardır: fəal (hərəki) və qeyri-fəal (passiv) istirahət.

Fəal istirahət zamanı əzələlər və sinir sistemi öz iş qabiliyyətini daha tez bərpa edir. İvan Mixayloviç Seçenov təcrübələr zamanı müəyyən etmişdir ki, sağ əl yorulduqda onun yorğunluğunu tam istirahət yox, sol əllə işləmək daha tez aradan qaldırır. Zehni iş zamanı yorulanda isə orqanizm fiziki işə keçsə, onun yorğunluğu daha tez aradan qalxır.

Ancaq orqanizm öz iş qabiliyyətini fəal istirahətlə bərpa etsə də, insanın qeyri-fəal istirahətin bir formasına – yuxuya çox böyük ehtiyacı vardır. Düzgün yuxu rejimi (eyni vaxtda yatıb, eyni vaxtda oyanmaq) böyük sağlamlaşdırıcı əhəmiyyətə malikdir. Bəzi insanlar gündüzlər 1–2 saat yataraq gecə yuxusunun müddətini qısaldırlar. Bu zaman orqanizmə ziyan dəyir. Səkkiz saatlıq yuxu insanın qeyri-fəal istirahətinə olan tələbatını ödəyir. Fəal istirahət asudə vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan yaradır. Ancaq bu o zaman əhəmiyyətli olur ki, sinir sisteminin müxtəlif mərkəzləri növbə ilə işləsin. Məsələn, paltar ütüləmək zehni işin yorğunluğunu aradan qaldırır. Ancaq elmi ədəbiyyat oxumaq siyasi ədəbiyyat oxumaqdan yaranan yorğunluğu aradan qaldıra bilməz.

Fəal istirahət səmərəli olur:

- vərdiş edilmiş peşə fəaliyyətindən kəskin fərqləndikdə;
- müxtəlif əzələlər iş gördükdə;
- passiv və hərəki istirahət mərhələləri növbələşdikdə.

Passiv istirahət:

- kitab oxumaq;
- televizora baxmaq;
- şahmat oynamaq;
- mənzərə seyr etmək;
- incəsənət nümunələrinə baxmaq və s.

Fəal istirahət:

- fiziki məşqlər;
- idman oyunları;
- gəzinti;
- bağda iş;
- yüngül ev işləri və s.

LAYIHƏ

Uşaq və yeniyetmələrin istirahətində üstünlük fəal istirahətə verilir.



Yeniyetmə




Ancaq çox vaxt uşaqlar və gənclər əsil istirahətin nə olduğunu dəqiq müəyyən edə bilmirlər. Onlar belə düşüncələr ki, saatlarla kompüter və televizor qarşısında oturmaq, planşet, mobil telefonlarda oyunlar oynamaq elə istirahətdir. Ancaq bu texniki vasitələrin müxtəlif orqanlara, xüsusən də sinir sistemi və gözlərə zərər vurduğu məlumdur.

Bəzən deyirlər ki, “İnsan istirahət edir ki, daha yaxşı işləsin”, “İnsan işləyir ki, istirahətə imkan olsun”. Bu fikirlərdən belə çıxır ki, istirahət iş qabiliyyətini qorumaq üçündür. Ancaq yaxşı təşkil edilmiş istirahət sağlamlığı möhkəmləndirmək və iş qabiliyyətini bərpa etməklə bərabər, özlüyündə bir çox xoş duyğuların, müsbət emosiyaların mənbəyidir.

6

1. Təbiət qoynunda istirahət nə üçün şəhərdə edilən istirahətdən üstün sayılır? Fikirlərinizi əsaslandırın.
2. Öz istirahətinizi necə təşkil etdiyiniz haqqında esse yazın.
3. Regionunuzda istirahət üçün əlverişli olan ərazilərin siyahısını tərtib edin. Bu əraziləri nəyə görə istirahət üçün zəruri hesab edirsiniz? Seçiminizi əsaslandırın.
4. Çimərliklər istirahət üçün çox faydalı hesab olunur. Bunun səbəbini yoldaşlarınızla müzakirə edin.
5. Hansı istirahəti zərərli hesab edirsiniz? Fikirlərinizi əsaslandırın.



M Siz biologiyanın müxtəlif sahələrinin olduğunu bilirsiniz. Görəsən, yoluxucu xəstəlikləri, onların səbəbini, yoluxma yollarını öyrənən elm sahəsi hansıdır?

Epidemiologiya insanlar arasında müxtəlif yoluxucu xəstəlikləri və onların yaranması səbəblərini öyrənir. Xəstəliklərlə mübarizədə profilaktik tədbirlərin hazırlanması epidemiologiyanın əsas məqsədidir.

5 Tarixən qədimdə və orta əsrlərdə insanlar yoluxucu xəstəliklərlə necə mübarizə aparırdılar? Onlar infeksiyon xəstəliklərin qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görürdülər? Sizcə, insanlara peyvəndlər nə üçün vurulur?

Araşdırma apararaq sualları cavablandırın və təqdim edin.

- Hazırda epidemiyaların qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür?
- Pandemiya* zamanı hansı müalicə üsulları tətbiq olunur?

Epidemiologiya qədim zamanlardan yoluxucu xəstəliklərin yayılması və onlara qarşı mübarizə zamanı aparılan müşahidələr əsasında yaranıb. Cəmiyyətin inkişafının ilk dövrlərində yaranmış infeksiyon xəstəliklərin insanlar şərq qüvvələrin işi hesab edirdilər.

Yoluxucu xəstəliklərlə mübarizənin və profilaktikanın praktiki üsulları quldarlıq quruluşu dövründə xeyli inkişaf etmişdir. Belə ki Misirdə birələrlə, gəmiricilərlə mübarizə aparılır, heyvanlara baxış keçirilir, qurban ətini damğalayırdılar. Hələ eramızdan 2000–3000 il əvvəl Aşşur və Vavilonada epidemiyaların törədiciləri ilə heyvanlar arasında əlaqənin olduğu bildirilmişdir.

Epidemiyalarla mübarizədə xəstələrin və vəfat edənlərin əşyalarının yandırılması, bu insanların şəhər ərazisindən uzaqlaşdırılması, xəstə heyvanların məhv edilməsi, yoluxma şəraiti olan ərazilərdən əhəlinin köçürülməsi, sərhədlərin bağlanması praktikası tətbiq edilirdi.

O dövrdə yoluxucu xəstəliklərin yaranması haqqında iki nəzəriyyə var idi. Birinci nəzəriyyənin tərəfdarı Hippokrat hesab edirdi ki, xəstəliklərin yaranma səbəbi üfunətli buxarların, bataqlıq yerlərdə olan müəyyən maddələrin insan orqanizminə daxil olmasıdır. O, epidemiologiya elminin banisi hesab olunur. Onun “Epidemiyalar haqqında yeddi kitab”, “Hava, su və ərazilər haqqında” və s. əsərləri günümüzədək gəlib çatmışdır. Hippokratın zamanında “epidemiya” sözü insanlar arasında yoluxucu və yoluxucu olmayan kütləvi xəstəliklər kimi başa düşülürdü.

* Pandemiya – yunanca “pan” – bütün, “demos” – xalq, əhali

İkinci nəzəriyyə tərəfdarları isə ehtimal edirdilər ki, epidemiyanın inkişafına və yayılmasına səbəb “gizli” varlıqlardır. Bu fikrin müəlliflərindən biri qədim yunan filosofu Aristotel (e.ə. 384–322) olmuşdur. İki nəzəriyyənin tərəfdarları arasında olan daimi diskussiya epidemiologiyanın gələcək inkişafına təkan vermişdir.

Antoni Van Levenhukla başlayan mikroskopik tədqiqatların inkişafı böyük mikrobioloji kəşflərə gətirib çıxardı. XIX əsrin ikinci yarısında Robert Koxun, Lui Pasterin və onların şagirdlərinin tədqiqatları yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizədə bir çox praktik tədbirlərin: müasir diaqnostika, dezinfeksiyadan istifadə, vaksin və zərədlərin köməyi ilə spesifik profilaktik tədbirlərin hazırlanması, təcrübədə geniş tətbiqi üzrə və s. kimi praktik tədbirlərin işlənməsi zərurətini yaratdı.

Epidemiologiyanın inkişafı aşağıdakı dövrlərə bölünür:

Bakteriyaların
kəşfinə qədərki dövr

- Hippokrat və bir çox alimlərin araşdırmaları;
- bir sıra infeksiyon xəstəliklərin öyrənilməsi;
- bir sıra infeksiyon xəstəliklərin epidemiyalarının öyrənilməsi.

Bakteriya dövrünün
ilk 10 illiyi
(XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəli)

- epidemiologiyanın tənəzzülü;
- mikrobiologiyanın formalaşdırılması və inkişafı.

İntibah dövrü XX
əsrin II rübünün
əvvəlindən müasir
dövrədək

- epidemiologiyanın elm kimi nəzəri cəhətdən əsaslandırılması.

Müasir dövr

- epidemiologiyanın ümumi tibb elmi kimi inkişafı.

Yoluxucu xəstəliklərin yayılma qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi üçün bir neçə metodiki tədqiqat üsullarının vəhdətindən və ya kompleks epidemioloji metoddan istifadə olunur.

Epidemioloji metod çərçivəsində aşağıdakı metodik üsullar mövcuddur:

1. Təsviri-qiymətləndirmə kəmiyyətə daha çox yayılan, iqtisadi və sosial baxımdan mühüm dəyişikliyə səbəb olan xəstəlikləri aşkar etməyə imkan verən üsuldur. Bu zaman xəstəliklərin rəsmi qeydiyyatı barədə məlumatlardan istifadə olunur. İqtisadi əhəmiyyət əhalinin xəstələnmə səviyyəsi ilə müəyyən edilir; cəmiyyətdə müəyyən xəstəliyin yayılması nəticəsində yaranmış mənfi halların məcmusu, profilaktik tədbirlərin keçirilməsi və xəstəlik nəticəsində cəmiyyətin çəkdiyi xərclərdir.

2. Eksperimental müasir dövrdə peyvənd preparatlarının, immunoqlobulinlərin, dezinfeksiya maddələrinin keyfiyyət göstəricilərinin və s. təyini.

3. Analitik üsul xəstəliyə gətirib çıxaran səbəblərin və şəraitin (risk amillərinin) aşkar edilməsi, ehtimalların yoxlanılması və dürüst ifadə edilməsi, epidemiyaya qarşı tədbirlərin işlənilib hazırlanmasıdır. Bu üsulun bir forması müəyyən müddət ərzində yoluxmanın ən tipik səbəbləri və şəraitini, digər forması isə hazırda xəstəliyi formalaşdıran səbəbləri və şəraiti üzə çıxarır.

4. Proqnozlaşdırma üsulu xəstəliyin riyazi analizindən istifadə etməklə proqnozlaşdırma.

Müasir dövrdə aparılan profilaktik tədbirlər, müalicə üsulları, qorunma tədbirləri görülsə də, epidemiyaların qarşısı alına bilmir. Hazırda Covid-19 xəstəliyinin pandemiyası buna bariz nümunədir.

- 1.** “Bəşəriyyətdə baş verən ən dəhşətli pandemiyalar” mövzusunda təqdimatlar hazırlayın.
- 2.** Epidemiyalara səbəb olmayan xəstəlikləri seçin:
1.malyariya, 2.vəba, 3.dizenteriya, 4.qızılca, 5.məxmərək, 6.vərəm, 7.talassemiya, 8.hemofiliya, 9.QİÇS, 10.grip, 11.qastrit, 12. Covid-19
Cavabınızı əsaslandırın.
- 3.** ÜST-ün (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı) məlumatlarından istifadə edərək araşdırma aparın, ayrı-ayrı dövrlərdə planetin hansı bölgələrində vəba xəstəliyinə daha çox təsadüf olunduğunu müəyyənləşdirin və bunun səbəbini izah edin.

2

İnfeksiya mənbələri və yoluxma mexanizmi


M İnsanlar müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə yoluxur və bu xəstəliklərin yayılmasına səbəb olurlar. Çox vaxt onlar xəstəliyə necə yoluxduqları barədə fikirləşirlər. Sizcə, onlar necə yoluxurlar? Yoluxma mənbələri nədir?

İnfeksiya mənbəyi törədiciyin yaşaması, çoxalması və toplanması üçün əlverişli olan təbii mühitdir.

Əsas infeksiya mənbələri: insanlar, ibtidai və ali heyvanlar, ətraf mühitin abiotik amilləri.

Nə üçün göstərilənlər infeksiya mənbəyi hesab olunur?

Sxemdən istifadə etməklə xəstəliklər və onların yoluxma yollarını araşdırıb təqdim edin.



Törədiciyin yoluxma mexanizmi xəstəlik törədiciyinin yoluxmuş orqanizmdən sağlam insan və ya heyvan orqanizminə ötürülməsidir. Bu mexanizm 3 mərhələdə həyata keçirilir:

1. Yoluxmuş orqanizmdən törədiciyin ayrılması;
2. Törədiciyin xarici mühitdə olması – hava, qida, su və s.;
3. Törədiciyin xarici mühitdən yeni, sağlam orqanizmə daxil olması.

Törədiciyə ötürülməsi müəyyən yollarla baş verir:

- **hava-damcı** (vərəm, qrip, qızılca və s.);
- **həzm yolu ilə** (vəba, qarın yatalağı, dizenteriya, dabaq və s.);

* *Sinantrop gəmiricilər* – yaşayış məntəqələrində məskunlaşan gəmiricilər (yunanca “sin” – birlikdə, “antropos” – insan)

- **təmas yolu ilə** (göbələk xəstəlikləri, qoturluq, taun və s.);
- **transmissiv** – qansoran heyvanlar vasitəsilə (malyariya, ensefalit, səpgili yatalaq və s.).

Otaq şəraitində qızılı stafilokoklar 72 saat, difteriya çöpləri 11 saat, grip virusu 4 saata qədər yaşaya bilər.



1. Düzgün fikirləri seçin:

1. QİÇS ana bətnində anasından dölə keçə bilər.
2. Xarici mühitə davamlı, həyat qabiliyyətini uzun müddət saxlayan mikroorqanizmlər hava-toz yolu ilə, xarici mühitə çox da davamlı olmayan törədicilər isə hava-damcı yolu ilə ötürülür.
3. Bütün qan xəstəlikləri xəstə olan insandan sağlam insana qan köçürmə zamanı ötürülə bilər.
4. Xəstəlik törədiciləri dəri və selikli qişalar vasitəsilə də nüfuz edə bilər.
5. Qoturluq gənəsi xəstəlik daşıyıcısıdır.

2. İnsanlarda yoluxmaya səbəb olmayanları seçin.

1. Ev iti quduzlaşmış.
2. Uşaq malyariya xəstəsi ilə eyni qabdan yemək yemişdir.
3. Tələbə küçədə ətli hamburger yeyib.
4. Balıqçı yaxşı bişməmiş balıq yeyib.
5. Astmalı xəstə metroda yanında dayanan adama tərəf öskürüb.

3. Bağırsağ infeksiyalarının mexaniki daşıyıcıları:

- A) ağcaqanadlar;
- B) milçəklər;
- C) gənələr;
- D) birələr.

M Artıq sizə məlumdur ki, viruslar çox kiçik hüceyrəsiz həyat formaları olub, nuklein turşuları və zülal molekullarından təşkil olunmuş örtükdən (kapsiddən) ibarət hüceyrədaxili parazitlərdir. Onlar yalnız sahibinin müəyyən hüceyrələrinə daxil olduqdan sonra canlı orqanizmin xüsusiyyətlərini göstərir.

Sizcə, insanlar üçün ən təhlükəli yoluxucu xəstəliklər və bu xəstəliklərin törədiciləri hansılardır?

1. Qruplara bölünün, araşdırma aparıb (istənilən virus xəstəliyinə dair) cədvəli doldurun. Nəticələri müzakirə edin.

Xəstəliyin adı	Əlamətləri	Yoluxma yolları	Qorunma yolları

2. Tapşırıqları yerinə yetirin.

- Viruslu hepatitlər haqqında bildiklərinizi şərh edin.
- Sinir sistemində virusların törətdiyi xəstəlikləri və onların yoluxma yollarını qeyd edin.
- İİV (insanın immun çatışmazlığı virusu) və onun törətdiyi QİÇS xəstəliyi haqqında bildiklərinizi qeyd edin.
- Tənəffüs sisteminin virus xəstəlikləri haqqında bildiklərinizi qeyd edin.
- XXI əsrin pandemiyası Covid-19 haqqında fikirlərinizi şərh edin.

Yoluxucu xəstəliklər içərisində ən geniş yayılanlar virusların törətdikləri xəstəliklərdir.

Epidemioloji xarakteristikasına görə virus xəstəlikləri 2 yerə bölünür: **antroponoz** – yalnız insanın tutula biləcəyi xəstəlik (poliomielit), **zooantroponoz** – heyvanlardan insana keçə biləcək xəstəlik (quduzluq).

Yayılma xarakterinə görə virus xəstəlikləri hava-damcı yolu ilə, təmas zamanı, o cümlədən cinsi əlaqələr, əşyalardan ümumi istifadə, qida və su vasitəsilə yoluxa bilər.

Viruslar müxtəlif orqanların hüceyrələrini zədələdiyinə görə onları: dəri, cinsi (zöhrəvi xəstəliklər), tənəffüs yolları, tənəffüs orqanları (respirator xəstəlikləri), qara ciyər, göz, bağırsağ viruslarına ayırırlar. Dəri virus xəstəliklərinə dərinin qabıq verməsi, dəmrovlar, ekzema, saç və dırnaqların zədələnməsi aiddir.

Qara ciyərin hepatit virusuna yoluxması qaraciyər hüceyrələrinin nekrozuna (qurumaya) gətirib çıxarır. Bu A, B, C hepatit viruslarına yoluxma zamanı baş verir. Hepatit C virusu cinsi yolla da yoluxa bilər.

Xəstəlikdən sonra insanda bəzi virus infeksiyalarına qarşı immunitet yaranır ki, bu ya ömürlük qala, ya da zamanla keçə bilər. Belə ki uşaqlıqda məxmərək və ya qızılca xəstəliyi keçirən insan bir daha bu xəstəliyə tutulmur. Qeyd etmək lazımdır ki, virus xəstəlikləri uşaq yaşlarında daha asan keçirilir və mənfi nəticələri az olur.

İİV tərəfindən törədilən QİÇS kimi bəzi virus xəstəliklərinin bu günə kimi tam müalicəsi mümkün deyil. Müasir təbabət virusun inkişafını yalnız nəzərəcərpacaq dərəcədə ləngidə bilər.

Yerli simptomlarla (tənəffüs yollarının selikli qişasının zədələnməsi) və ümumi xarakterli – bədənin temperaturunun yüksəlməsi, zəiflik, damarlarda və əzələlərdə ağrı, qanın tərkibinin dəyişməsi və s. kimi simptomlarla müşahidə olunan kəskin virus xəstəliklərinə daha tez-tez rast gəlinir. Belə xəstəliklər KRX və ya KRVX – kəskin respirator virus xəstəlikləri (qrip, zökəm, Covid-19 və s.) adlanır. Bu xəstəliklər insanların yoluxma kütləviləyinə görə dünyada birinci yeri tutur. Onlar çox tez yoluxur və asırma, burun-udlaq iltihabı, öskürək və zökəmlə müşayiət olunur.


Epidemiyaların qarşısını almaq üçün virus xəstəliklərinin profilaktik tədbirlərindən biri olan peyvəndlər tətbiq edilir. Virus xəstəliklərinin müalicəsi immunitetin möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır. Çünki bu xəstəliklər immuniteti zəiflədir. Antibiotiklər viruslara birbaşa təsir etməsə də, onların tətbiqi virus infeksiyalarının ağırlaşmalarının qarşısının alınması məqsədilə aparılır.

1. Cümlələri tamamlayın:
 - a) Viruslar həyat formalarıdır.
 - b) Bütün viruslar zülallar və ... ibarətdir.
 - c) Bütün viruslar – hüceyrədaxili ...
 - d) Hepatit virusları ... hüceyrələrini, QİÇS virusları isə ... sistemi məhv edir.
 - e) KRVX-nə ... aiddir.
 - f) Virusların əksəriyyətini yalnız ... mikroskopu altında görmək mümkündür.
2. “Müasir bəşəriyyətin virus xəstəlikləri və onlarla mübarizə yolları” mövzusunda təqdimat hazırlayın.
3. Covid-19 və ondan qorunma yolları haqqında təqdimat hazırlayın.

M Bakteriyaların törətdiyi xəstəliklər ən çox yayılmış infeksiyon xəstəliklərdən sayılır. Bakteriyaların törətdiyi xəstəlikləri xatırlayın.

Qrip və angina, vərəm və qızılca xəstəliklərini yada salın, onları törədənlər eyni mikroorqanizmlərdirmi?

f Cədvəli dəftərinizə çəkib doldurun və fikirlərinizi şərh edin.



Bakterial xəstəliklərin sayı çoxdur: angina, faringit, meningit (faringiti virus, meningiti isə virus və birhüceyrəlilər də törədə bilər), skarlatina, tetanus, taun, vəba, sibir xorası, difteriya, vərəm, qarın yatalağı və s.

Bakterial infeksiyalardan yaranan xəstəliklərin inkişafı zamanı bakteriyalar orqanizmdə iltihab reaksiyası doğuran və *intoksikasiyaya* (zəhərlənməyə) səbəb olan zəhər (toksinlər) ifraz edir, bununla da müxtəlif orqanları zədələyir. Toksinlər iki cür olur: *endotoksinlər* və *ekzotoksinlər*. Endotoksinlər bakteriya hüceyrələrinin məhv olmasından və dağılmasından sonra ifraz olunan zəhərdir. Ən təhlükəli endotoksin meningit xəstəliyi zamanı əmələ gələn *meninqokokk* endotoksindir. Ekzotoksinlər bakteriyaların həyat fəaliyyəti prosesində ayrılan zəhərdir.

Bakterial xəstəliklərin diaqnostikasında əsas metod bakterioloji müayinədir ki, bu zaman xəstədən tərkibində bakteriya olan material götürülür və xüsusi qida mühitində əkilir. Bakteriyaların artımından sonra (təxminən 48 saat) həmin bakteriyaların növü müəyyən olunur. Bu metodun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bakteriyaların konkret növünü müəyyən etdikdən sonra müvafiq antibiotik seçmək və müalicəyə başlamaq olar. Bundan başqa, bakterial infeksiyaların diaqnostikası üçün bakteriyaların mikroskopik tədqiqatından və qanda müəyyən bakteriya növünə uyğun antitellərin olmasını müəyyən edən seroloji üsuldən* istifadə olunur.

* Seroloji üsul – qan zərdabında törədicinin aşkar edilməsi

Əhalinin sanitar mədəniyyətinin yüksəlməsi, xəstəliklərin vaxtında aşkarlanması və müalicəsi, xəstələrlə təmasda olarkən tənzif bağlardan istifadə, əllərin, meyvə və tərəvəzlərin təmiz yuyulması, müvafiq xəstəlik daşıyıcılarının olduğu yerlərin dərmanlanması, vaksinasıya və s. bakterial xəstəliklərdən qorunmanın əsas vasitələridir.

Bakterial xəstəliklərin müalicəsində mikroorqanizmlərdən ayrılan, digər mikroorqanizmlərin inkişafının qarşısını alan və hətta bu hüceyrələri öldürmək qabiliyyətinə malik olan maddələr – antibiotiklər tətbiq olunur. İlk klinik tətbiq üçün yararlı antibiotiki – penisillini 1929-cü ildə Aleksandr Fleming əldə etmişdir. II Dünya müharibəsi zamanı penisillinin tətbiqi sayəsində əsgərlərin həyatı xilas edilmişdir. Hazırda antibiotiklər insan, heyvan və bitki xəstəliklərinin müalicəsi məqsədilə tətbiq olunur. Lakin antibiotiklərin külli miqdarda və uzunmüddətli tətbiqi mikroorqanizmlərin onlara davamlı formalarının yaranmasına gətirib çıxarır. Ona görə də bütün dünyada, dərman vasitəsi kimi antibiotiklərdən imtina barədə məsələ qaldırılmışdır.



1. “Xəstələr” və “həkimlər” qruplarına ayrılın. Müəyyən bakterial xəstəliklərə aid tapşırıqlar hazırlayın.
“Xəstələr”in hər qrupu öz “xəstəliyi”nin simptomlarını “həkimlər”in müəyyən qrupuna təqdim etməli, “həkimlər”in müvafiq qrupu isə diaqnoz qoymalıdır.
2. Bakterial xəstəliklərin simptomlarını, profilaktik tədbirlərini və müalicə üsullarını qeyd edərək cədvəl tərtib edin.
3. Bakteriyalarla bağlı düzgün fikirləri seçin:
 1. Bəzi bakteriyaların sporları qaynama və ya maye azot temperaturuna (–195) davam gətirə bilər.
 2. Bakteriyaların membranlı orqanoidləri yoxdur.
 3. Bütün bakteriyalar heterotrofdur.
 4. Bakteriyaların diploid xromosom dəsti var.
 5. Mikroskop altında bakteriyaları ilk dəfə A. Levenhuk müşahidə etmişdir.
 6. Yumru formalı bakteriyalar basillər, çöp şəklində olanlar isə kokklər adlanır.

M Müasir dövrdə yoluxucu xəstəliklər içərisində tez-tez göbələk xəstəliklərinin də adı çəkilir.

- Göbələklərin insanlar üçün zərəri nədir?
- Hansı göbələk xəstəliklərini tanıyırsınız?

f Şəkillərə baxın və müəyyənəşdirin:



- Göbələklər insana hansı mənfi təsirləri göstərə bilər?
- Göbələklərin insanlarda törətdiyi yoluxucu xəstəliklər hansılardır? Xəstəliklərin qarşısını necə almaq olar?

Göbələklərin insanlara vurduğu ziyan həm zəhərlənmələr, həm də xəstəliklər şəklində olur:

1. Zəhərlənmə. Maddələr mübadiləsi zamanı göbələklərdən ayrılan zəhərli maddələr zəhərlənməyə səbəb olur. Bu maddələr qaynama və ya donma zamanı dağılmır.

2. Mikoqlar insan və heyvanlarda parazit göbələklərin yaratdığı xəstəliklərdir. Parazitlər daha çox dəridə yerləşir, ancaq onlara daxili orqanlarda da rast gəlmək olur.

Göbələklərin insanlarda törətdiyi xəstəliklər:

Keçəllik. Bu, antisanitariya şəraitində: başın tez-tez yuyulmaması, qırılması, saç bit düşməsi səbəbindən yaranır. Kirli, uzun dırnaqlarla başı qaşımaq, çirkədən qartmaq bağlamaq halları başın dərisində iltihablı yaralar əmələ gətirir. Bunun da nəticəsində xəstəlik törədici olan göbələklərin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır.

Göbələk xəstəliyi. Bəzən antibiotikdən çox istifadə etdikdə göbələk xəstəliyi baş verir. Bu zaman xırda-xırda diyircəkli dərialtı suluq, qızartı, bəzi hallarda isə irinli suluqcuqlar olur. Göbələk insan orqanizminin hər yerində ola bilər. Qulaq, burun, göz və dərinin incə yerlərində ona daha tez-tez rast gəlinir.


Dırnaq göbələyi. Adamların çox olduğu idman zalından, hovuzdan, başqalarının təriklərindən istifadə zamanı keçə bilər. Ona görə də şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etmək lazımdır. Lakin göbələklərlə əlaqə heç də həmişə göbələk infeksiyasına gətirib çıxarmır. Göbələk infeksiyasının inkişafı üçün müəyyən şərait lazımdır. Hava buraxmayan dar ayaqqabı, rütubət, zədələnmiş dırnaq və ya dırnaq yastığı buna şərait yarada bilər.

Dəmrov. Dəri həddən artıq quruyur. Dəri səthində qırmızı qabarmış ləkələr əmələ gəlir. Qabarmanın rəngi solğun bozuntul və ya gümüşü rəngdə olub, soyuyub donmuş mum və ya parafini xatırladır.

Göbələk xəstəliklərinin artması ətraf mühitin çirklənməsi, xüsusən radiasiyanın artması və orqanizmin müdafiə qüvvəsini zəiflədən digər amillərlə bağlıdır.



1. Əlavə məlumat mənbələrindən istifadə edərək göbələklərdən ayrılan zəhərli maddələr və onların insan orqanizminə təsirinə aid cədvəl tərtib edin.
2. Sxemə əsasən xəstəlikləri seçin. Bu xəstəliklərin əlamətləri və onlara yoluxmamaq yolları haqqında təqdimat hazırlayın.



3. Araşdırma aparın və aşağıdakı suallara cavab tapın:
 1. Sizcə, niyə yeməli göbələkdən həddən artıq istifadə etmək olmaz?
 2. Hansı göbələkdən xalq təbabətində xərçəngin müalicəsində istifadə olunur?
 3. Nə üçün göbələk xəstəliklərinin inkişaf riski insan yaşlandıqca daha çox artır?

6

Birhüceyrəli (ibtidai) heyvanların törətdiyi xəstəliklər

M Birhüceyrəli heyvanlar içərisində bir çox növlərin xəstəlik törətdiyini bilirsiniz.

- Bu xəstəliklər hansılardır?
- Onlar orqanizmə necə təsir edir?
- Bu xəstəliklərdən qorunmaq üçün nə etməlisiniz?

f Araşdırma apararaq cədvəli tamamlayın.

Nümayəndələr				
Törətdiyi xəstəlik				
Xəstəliyin əlamətləri				
Yoluxma yolları				
Qorunma yolları				

Birhüceyrəli heyvanlar müxtəlif üzvlərdə parazitlik edir. Buna müvafiq olaraq onları bəzən aşağıdakı kimi qruplaşdırırlar.

Birhüceyrəlilər:

Müxtəlif toxumalarda və qanda parazitlik edənlər

Bağırsaqda parazitlik edənlər

Ağız boşluğunda parazitlik edənlər

Sidik-cinsiyyət orqanlarında parazitlik edənlər

Birhüceyrəlilərin törətdiyi xəstəliklər *protozooz* adlanır.

İnsan üçün səciyyəvi olan protozoozlar: amöbiaz, lyamblioz, malyariya, toksoplazmoz, tripanosomoz, leyşmanioz.

Siz artıq bilirsiniz ki, dizenteriya amöbü sarkodinlərə aid edilir və insanın yoğun bağırsaqlarında yara əmələ gətirir. Sista mərhələsində 4 nüvəyə malik olur. Milçəklər sistaları xəstənin nəcisindən müxtəlif əşyaların və ya qidanın üzərinə ötürür. İnsanın mədə-bağırsaq sisteminə düşərkən sistanın örtüyü dağılır və hər nüvə ikiye bölünür.

Beləliklə, səkkiznüvəli amöb əmələ gəlir ki, bunlardan da səkkiz yeni amöb yaranır.

Malyariyaya tropik və subtropik ölkələrdə daha çox rast gəlinir. Sporlular tipinə aid olan malyariya parazitinin həyat tsikli kifayət qədər mürəkkəbdir. Onun əsas sahibi ağcaqanaddır. Parazitin cinsi inkişaf dövrü Anofeles cinsindən olan ağcaqanadın orqanizmində olur. Aralıq sahibi insan sayılır ki, onun orqanizmində parazitin qeyri-cinsi inkişaf dövrü keçir.

Malyariya 39–40 dərəcəyədək qızdırma, qara ciyərin və dalağın ölçülərinin artması, qanaxlığı ilə müşayiət olunur. Bu xəstəliyin bir neçə forması mövcuddur. Onlardan ən ağırı tropik növdür. Bu, Afrika və Asiya ölkələrində hər il yüz minlərlə insanın, əsasən, 1–5 yaşlı uşaqların ölümü ilə nəticələnir.

Azərbaycan ərazisində XX əsrin əvvəlindən 5 malyariya epidemiyası baş verib. Sonuncu malyariya epidemiyası 1990-cı illərdə müşahidə olunmuşdur. Hazırda ölkəmizdə görülən profilaktik tədbirlər nəticəsində malyariyaya yoluxma hallarını minimuma endirmək mümkün olmuşdur.

Leyşmanioza subtropik və tropik ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da rast gəlinir. Daşıyıcıları dişi mığmığalardır. Dəri leyşmaniozunda dişlək yerlərində əvvəlcə düyünlər əmələ gəlir, daha sonra bu düyünlər çətin sağalan yaralara çevrilir. Leyşmaniozun visseral* formasında isə xəstələrdə yüksək temperatur müşahidə olunur, dalaq, qaraciyər və s. daxili orqanlar zədələnir.

Xəstəlik müalicə olunmadıqda, adətən, ölümə nəticələnir.

* *Visseral – daxili*

Tripanosom, leyşmaniya və lyambliyalar qamçılılar sinfinə aiddir. Tripanosomun keçiriciləri *se-se* milçəkləridir. Xəstəlik Afrikanın tropik zonalarında geniş yayılmışdır. Bu parazit qan vasitəsilə insanın baş beyin və onurğa beyninə daxil olaraq yuxu xəstəliyini yaradır.

Bu isə güclü baş ağrıları, qızdırma, hərəkət pozuntularına gətirib çıxarır. Bəzən ölümə də nəticələnə bilər.

Lyamblioza daha çox uşaqlar yoluxurlar. Hərəkətli lyambliya 4 cüt qamçı və sorucu diskə malikdir ki, bunun vasitəsilə nazik bağırsağın selikli qişasına yapışır. Onlar həzm yolu ilə orqanizmə daxil olur. Nazik bağırsaq qara ciyər və öd kisəsində parazitlik edir. Lyambliyalar nazik bağırsaqdan yoğun bağırsağa keçən hərəkətliliyini itirərək sistaya çevrilir və nəcisə xaric olunur.

Toksoplazma koksidlərə aiddir. Toksoplazmanın əsas sahibi pişikimilər fəsiləsinin nümayəndələri, aralıq sahibi isə digər istiqanlı heyvanlar, həmçinin insan da ola bilər. Toksoplazmoz xəstəliyi, adətən, insanlarda yüngül keçir. Lakin hamilə qadınlar, habelə immuniteti aşağı olanlar üçün bu xəstəliyin ağır nəticələri ola bilər.



1. Aşağıdakı suallara cavab verin:

1. Nə üçün malyariya ocaqlarından olan bataqlıq sahələrin qurudulması və ya ora neft çilənməsi həyata keçirilir?
2. Nə üçün malyariya xəstəliyi keçirmiş insanları 3 il müddətinə dispenser qeydiyyatına salırlar və qızdırmanın qalxması hallarında müayinə edirlər?
3. Hazırda alimlər geni modifikasiya olunmuş ağcaqanadları yetişdirirlər. Sizcə, burada məqsəd nədir? İzah edin.

2. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının malyariya üzrə hesabatlarından istifadə edərək dünyada malyariyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş təqdimat hazırlayın.

3. Parazit birhüceyrəlilərin insan orqanizminə daxilolma yollarını müəyyənləşdirin və cədvəl şəklində təqdim edin.

M İnsanlar ev heyvanlarını sevir və onları özlərinin dostu hesab edirlər. Ancaq onlarla davranış qaydalarını unutmamaq lazımdır.

- Nə üçün itlər və pişiklərlə təmasda olmaq, durğun su hövzələrində çimmək, həmin sudan içmək, yaxşı bişməmiş ət yemək arzuolunmazdır?
- Parazit qurdlardan (helminit) qorunmaq üçün hansı profilaktik tədbirlər görülməlidir?
- Parazit qurdlar insan orqanizminə nə kimi zərər vurur?
- Helmintozlara qarşı hansı müalicə metodlarından istifadə olunur?

7 Parazit qurdlar haqqında biliklərinizə əsaslanaraq cədvəli dəftərinizə çəkin və doldurun.

Parazit qurdlar	
nümayəndələri	törətdiyi xəstəliklər

Parazit qurdlar, əsasən, yastı və sap qurdlar tiplərinə aiddir.

Parazit qurdların törətdiyi xəstəliklər helmintoz adlanır. Helmin termini elmə gətirən (yunanca “helmins” – qurd), parazit qurdların yaratdığı xəstəlikləri ətraflı təsvir edən Hippokrat olmuşdur.

Bağırsaq helmintozlarına yoluxmuş xəstələr sayına görə dünyada yoluxucu xəstəliklərlə yoluxanların içində üçüncü yeri tutur. İnsan orqanizmində parazitlik edən 250-dən çox helmint növü qeydə alınıb. Helmintlərin insan orqanizminə patogen (zərərli) təsirlərinin mexanizmi olduqca müxtəlifdir.

Ümumiyyətlə, parazit qurdların törətdiyi xəstəliklər uşaqların əqli və fiziki inkişafının geri qalmasına, yaşlı adamların iş qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Onlar allergiyaya səbəb olaraq orqanizmin yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimət qabiliyyətini aşağı salır.

Parazit qurdlar orqanizmə yoluxduqda bir sıra əlamətlərlə özlərini büruzə verir.

Parazit qurdların törətdiyi xəstəliklər

Qəbizlik	İshal	Köpmə	Mədə və bağırsaq sindromu	Oynaq və əzələ ağrıları
Bağırsaq və öd axaqları bağlana bilər.	Tezleşmiş sulu nəcis ifrazı olur.	Nazik bağırsaqda iltihab nəticəsində olur.	Mədə və bağırsaqda iltihab olur.	Qurdların oynaq mayesində və əzələlərdə miqrasiyası zamanı yaranır.

Allergiya	Anemiya	Yuxunun pozulması	Dişlərin qıcadılması	Əsəbilik
parazitlərin bağırsaq qışalarını qıcıqlandırması və deşməsi nəticəsində iri molekullu maddələr xovlara daxil olur.	qida maddələrini parazitlərin sorması nəticəsində baş verir.	gecələr tez-tez oyanmalarla baş verir.	kiçik yaşlı uşaqlarda yatarkən baş verir.	parazitlərin buraxdığı toksiki maddələr sinir sistemini qıcıqlandırır.

İnkişaf dövrü və yayılma yollarından asılı olaraq helminlər 3 qrupa bölünür:

1. **Əlaqə (təmas)** helminləri. İnsan üçün bilavasitə yoluxucu olan yetişmiş və ya yetişməkdə olan yumurtaların ayrılması bu helminlər üçün səciyyəvidir. İnsan məişət əşyaları və ya çirkli əllər vasitəsilə yoluxa bilər. Enterobioz xəstəliyinin törədiciyi – bizquyruq bu qrupa aiddir.

2. **Geohelminlər.** Aralıq sahibi olmadan, birbaşa inkişaf dövrü ilə səciyyələnir. Bu qrup parazitlər yetişməmiş yumurtalar qoyur ki, bunlar da inkişafının müəyyən mərhələsini torpaqda keçirməlidir. İnvazion (yoluxucu) mərhələyə çatan parazitlər müxtəlif yollarla insan orqanizminə daxil olur. Askarid bu qrupa aiddir.

3. **Biohelminlər.** Sahiblərini dəyişməklə daha mürəkkəb inkişaf mərhələsi keçir. İnkişafın müəyyən mərhələsində insan üçün yoluxucu ola bilər. İnsanda teniarinxoz xəstəliyinin törədiciyi – öküz soliteri bu qrupa aiddir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi orqanizmə düşən parazitlərin sayından və insanın fərdi həssaslığından asılıdır.

Helminlər praktiki olaraq insanın bütün orqanlarında yaşaya bilər. Bir çox hallarda helminlər müəyyən orqana daxil olmaq üçün qan damarları vasitəsilə və ya bilavasitə toxumalardan keçərək digər orqanlara miqrasiya edə bilər.

Bir çox parazit qurdlar parazitizmlə əlaqədar olaraq sərbəst hərəkət qabiliyyətini itirmiş, onların sinir sistemi xeyli sadələşmişdir. Daxili orqanlara yapışmaq üçün çoxunun sorucu orqanları və qarmaqları vardır. Lentşəkilli qurdlar bədənlərinin bütün səthi boyu qidalı maddələri udmağa qadirdirlər.

Çox nadir hallarda xəstə adam ətrafdakılar üçün bilavasitə təhlükə törədir, lakin yenə də helmintlərin xarici mühitə yayılma mənbəyi olaraq qalır.

Helminitlər insan orqanizmində uzunmüddətli yaşama qabiliyyəti qazanıb. Bəzi fərdləri 25 ilədək yaşayır və nəhəng ölçüyə çata bilər. Helmintozların profilaktikası üçün, ilk növbədə, şəxsi gigiyenaya, həmçinin qidalanma gigiyenasına riayət etmək lazımdır.

Helmintozların müalicəsi parazitlərin aşkar edilməsi üçün aparılan dəqiq analizlərdən sonra həkimin təyin etdiyi bir və ya bir neçə qurd əleyhinə dərman preparatlarının istifadəsi ilə aparılır.



1. Uyğunluğu müəyyən edin.

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Oynaqlarda ağrılar ... | a) köpmə |
| 2) Öd və bağırsaq yollarının tutulması ... | b) ishal |
| 3) Bağırsaqlarda iltihab ... | c) qurdların miqrasiyası |
| 4) Tezleşmiş nəcis ifrazı ... | d) qəbizlik |

2. Aşağıdakı sualları cavablandırın və cavablarınızı əsaslandırın:

1. Hansı helmintlər soyuqdəymə əlamətləri olmadan davamlı quru öskürək yarada bilər?
2. Nə üçün helmintozlar zamanı, allergiyada olduğu kimi, səpgilər və qaşınma müşahidə oluna bilər?
3. Hansı parazit qurdlar uşaqlarda anusda qaşınma yarada bilər?


3. Helmintozların profilaktikasına həsr olunmuş illüstrasiyalı divar qəzeti hazırlayın və sinif otağından asın.

Buğumayaqlıların törətdiyi və yaydığı xəstəliklər

M İnsanlar çox qədim zamanlardan evlərinin pəncərələrinə tor tutur, yatarkən miçətkən qururdular.

- Sizcə, bu nə üçün həyata keçirilirdi?
- Buğumayaqlılar vasitəsilə törədilən və yayılan xəstəliklər hansılardır?

f Şəkildə təsvir olunmuş buğumayaqlıları qruplaşdırın. Onların hansılarının insanda xəstəlik törədicisi olduğunu, hansılarının yoluxucu xəstəliklər yaydığını müəyyənəldir.




Buğumayaqlılar vasitəsilə yayılan xəstəliklər iki qrupa bölünür:

Yalnız buğumayaqlılar vasitəsilə yayılan xəstəliklər	Həm buğumayaqlılar, həm də abiotik amillər vasitəsilə yayılan xəstəliklər
səpgili yatalaq, malyariya, sarı qızdırma	taun, tulyaremiya

Buğumayaqlılar vasitəsilə yayılan virus xəstəlikləri məlumdur. Xəstəliklərin yayılmasında gənələr çox təhlükəlidir. Bir sıra heyvanların bədənində yaşayan gənələr həm onlara, həm də yoluxduğu insana ziyan verir. Müxtəlif xəstəlik törədiciləri gənələrin bədənində çoxalır və uzun müddət sağ qalır.



Müxtəlif növ gənələr



Qoturluq gənəsi

toxumalara daxil olaraq insanda qoturluq xəstəliyi yaradır.

Qoturluq axşam və gecə saatlarında güclənən qaşınma ilə özünü göstərir. Qaşınma gənələrin mexaniki təsirindən deyil, bu parazitlərin dəri altına ifraz etdiyi maddələrə qarşı allergiya zamanı əmələ gəlir.

Yoluxma məişət əşyaları ilə, təmas vasitəsilə, geyim, yataq dəsti və s. ilə baş verir. Dəriyə sürtülən kükürd məzi və benzilbenzoat xəstəliyin müalicəsi üçün əsas preparatlardandır.

* Dermatit – kimyəvi, fiziki və bioloji təsirlərdən dəridə baş verən iltihabi proses



Birələr

müxtəlif bakteriyaların, virusların, parazit qurdların və xəstəlik törədən ibtidailərin daşıyıcılarıdır. Onlar məməlilər, quşlar və digər heyvanların üzərində və yuvalarında yaşayır, qanla qidalanır. Bəzi növləri qansormadan 18 aya qədər yaşaya bilər.

Taun xəstəliyinin yayılması yetkin birələr vasitəsilə həyata keçirilir. Onlar gəmiricilər üzərində yaşayıb xəstəliyin yayılmasına (epidemiyalara) səbəb olur. Birələr həm də tulyaremiya, qarayara, və s. xəstəliklərin törədicilərini də gəzdirir.



Ağcaqanadlar

tundradan tutmuş səhralara qədər yayılmışdır. Malyariya parazitinə yoluxmasında ağcaqanadların əsas rol oynayır. Ağcaqanadlar həm də tulyaremiyanın, müxtəlif növ ensefalitlərin və s. daşıyıcısıdır.



Hünülər (mığmığalar)

ağcaqanadlar kimi hünülərin dişiləri də qan soruqları üçün təhlükəlidir. Bunlar dəri və daxili üzvlərin (visserial) leşmaniozu kimi xəstəlikləri yayır və epidemiyalara səbəb ola bilər.



Bitlər

səpgili yataqlar, Volin qızdırması və qayıdan yataqlar törədicilərinin keçiriciləridir. Qayıdan səpgili yataqlar xəstələrdən sağlam insana yalnız bitlər vasitəsilə keçir. Bu zaman bitin bədənində olan parazitlər dərinin təmliyi pozulduğu yerdən insanın bədənində daxil olur. Bitlərin baş bit, paltar bit və s. kimi növlərinin hamısı ektoparazitlərdir.

Bitlər insandan insana bilavasitə təmasda olduqda və ya məişət əşyaları, geyim, yataq dəsti vasitəsilə ötürülür. Dəri qaşınmaları, saçlara yapışmış sarımtıl-ağ sirkələr (bitlərin yumurtaları) bitlənmənin əsas simptomlarıdır. Yoluxmaların sayının artması müharibələr, fəlakətlər, insanların sıx antisənətiyyə şəraitində yaşadığı zaman baş verir.



Milçəklər

70 növə qədər mikroorqanizm daşıyıcı müxtəlif xəstəliklərə səbəb ola bilər. Dizenteriya, qarın yataqlığı, vəba, polimielit, difteriya, vərəm, qarayara, taun və s. kimi xəstəliklər buna misal ola bilər.

Eramızdan təxminən 500 il əvvəl Herodot yazırdı ki, Misir kəndlilərinin və mirzələrinin başını həmişə təmiz qırıxdılar ki, onlar "... tanrılara xidmət etdikdə heç bir bit və ya digər murdar məxluq onlara yapışmasın".

Göründüyü kimi, qansoran buğumayaqlılar insanda müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı olmaqla bərabər, sancıqları yerdə allergik reaksiya da törədə bilərlər.

Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək yoluxmaların sayının azalmasına imkan yaradır.

7 1. Aşağıdakı cədvəli doldurun:

Xəstəlik	Törədici	Daşıyıcı

2. Araşdırın.

Hansı şərait və həyat tərzini insanın buğumayaqlılarla təmasına daha çox imkan yaradır və bu riski necə minimuma endirmək olar?

3. İnformasiya mənbələrindən istifadə edərək Azərbaycanın rayonları üzrə insan üçün təhlükəli olan buğumayaqlıların yayılma xəritəsini tərtib edin və təqdimat hazırlayın.

4. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. milçək
2. birə
3. bit

- a) səpgili yataqlar
- b) askarid
- c) dizenteriya
- d) vərəm
- e) difteriya
- f) tulyaremiya

M Müxtəlif səbəblərdən bir çox yoluxucu xəstəliklərin baş verməsi və yayılması artmağa başlayır.

Yoluxucu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər onların azalmasına, bəzilərinin törədicilərinin tamam məhv olmasına səbəb olur.

- Yoluxucu xəstəliklərə yoluxmamaq üçün nə etməliyik?
- Qaynadılmış su içdikdə hansı xəstəliklərə qarşı yoluxma təhlükəsi olmur?

f Xəstəlik törədicilərini və xəstəliyi yayanları qruplaşdırın.

Xəstəlik daşıyıcısı və törədicilərinin hansı xəstəliklərə səbəb olduğunu və ona qarşı aparılan mübarizə tədbirlərini müəyyənəldir.



İnfeksion xəstəliklərin qarşısını almağa yönələn fəaliyyətlər 3 qrupa bölünür:

1. İnfeksiya mənbəyinə yönələn tədbirlər;
2. Yoluxma mexanizminin müəyyənləşdirilməsi;
3. Həssas orqanizm – infeksiya mənbəyi ilə təmasda olan şəxslərə qarşı görülən tədbirlər.

İnfeksiya
mənbəyinə yönələn
tədbirlər

- a. infeksiya mənbəyinin vaxtında aşkar edilməsi, diaqnozun düzgün və vaxtında qoyulması;
- b. məlumatlandırma;
- c. təcridedilmə;
- d. sanitar-baytarlıq tədbirləri (xəstə heyvanların aşkar edilməsi və s.).

Yoluxma
yolları

- a. həzm;
- b. tənəffüs;
- c. qan;
- d. dəri vasitəsilə;

Yoluxma
mexanizmi

- a. törədicinin yoluxmuş orqanizmdən ifraz edilməsi;
- b. ətraf mühitdə qalması;
- c. yenidən həssas orqanizmə daxil olması;

İnfeksiya mənbəyi
ilə təmasda olan
şəxslərə qarşı
görülən tədbirlər

- a. onların vaxtında aşkarlanması və qeydiyyata alınması;
- b. onlarda tibbi müşahidə;
- c. təcili profilaktik tədbirlər;
- d. təcridlər;
- e. maarifləndirmə işlərinin aparılması.



• Yoluxucu xəstəliklərin yoluxma mexanizminin hansı mərhələlərdən ibarət ola biləcəyini müzakirə edin.

Xəstəliklərin qarşısının alınması üçün törədicilərin zərərsizləşdirilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu məqsədlə aparılan əsas tədbirlər:

Dezinfeksiya	Sterilizasiya	Dezinseksiya
xəstəlik törədicilərinin kimyəvi və bioloji preparatlarla məhv edilməsidir.	buxar, isti-quru hava, qazlar və ionlaşdırıcı şüalar vasitəsilə aparılır.	yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin canlı keçiricilərinin məhv edilməsidir.

Xəstəliklərin qarşısının alınmasında peyvəndlərin əhəmiyyəti böyükdür.

1. Bəzən şam ağacı qatranı (skipidar), kerosin və sabun qarışığı ilə evlərin döşəmələrini silirlər. Bunun nə məqsədlə aparıldığını yoldaşlarınızla müzakirə edin.

2. Bəzi gəmiricilərə qarşı xüsusi yapışqanlardan istifadə olunur. Bunu gəmiricilərə qarşı aparılan tədbirlərin hansı qrupuna aid etmək olar?



3. Siçanların hansı xəstəlikləri yaydığını müəyyənəldir.

3. Uyğunluğu müəyyən edin.

dezinfeksiya
sterilizasiya
dezinseksiya

- a) gəmiricilərin məhv edilməsi;
- b) birələrin məhv edilməsi;
- c) quruducu cihaz;
- d) yod;
- e) qaynatma;
- f) aerosol.

4. Xəstəliklərə qarşı peyvəndlərin uşaqlara hansı yaşda vurulduğuna dair məlumat toplayın və təqdimat hazırlayın.

Təqdimat və referat mövzuları


1. Daha çox insan ölümünə səbəb olan pandemiyalar haqqında statistik məlumat.
2. Azərbaycanda baş vermiş epidemiyalar, onların ən çox yayıldığı bölgələr.
3. Epidemiyaların qarşısını alan tədbirlər, əməl olunmalı gigiyenik qaydalar.
4. İbtidai heyvanların yaratdığı xəstəliklər və onlardan qorunma yolları.
5. Dünyanı qorxuya salan virusların (AH1N1 – qrip xəstəliyinin pandemiya yaradan xüsusi forması, Ziko, Ebola) yaratdıqları xəstəliklər və onların qarşısının alınma yolları.
6. Mikoqlar və onların artma səbəbləri.
7. Helmintoqlar yoluxma yolları və mübarizə tədbirləri.

1

Makrotəkamülü isbat edən paleontoloji dəlillər

M Bildiyiniz kimi, mikrotəkamül nəticəsində yeni növlər yaranır. Görəsən, növdən daha böyük taksonomik vahidlər necə yaranmışdır və bunların yaranmasına səbəb olan hansı prosesdir? Canlıların inkişaf tarixində mikrotəkamüllə yanaşı, makrotəkamül də baş vermişdir.

7 Şəkillərə baxın və onların müasir dövrdə yaşayan hansı heyvanlara oxşar olduğunu müəyyənləşdirin və müqayisə edin.




Makrotəkamül daha yüksək təkamül olub növdən yüksək taksonomik vahidlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Makrotəkamül uzun sürən proses olduğuna görə onu bilavasitə izləmək mümkün deyil. Makrotəkamül də mikrotəkamül kimi divergent xarakter daşıyır. O, bir sıra elmi dəlillərlə isbat edilir.

Qazıntı halında tapılan qalıqlar təkamülü isbat edən mühüm dəlillər verir. Canlıların tapılan qalıqları onların hansı dövrdə və hansı şəraitdə yaşadığını, həm də qalıqların bizim dövrə qədər necə qorunub saxlandığını araşdırmağa imkan yaradır.

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində canlıların diş, sümük, çanaq, dırnaq və s. qalıqları tapılmışdır. Müasir dövrdə yaşayan canlıları bu qalıqlarla müqayisə etdikdə onlarda müəyyən dəyişikliklərin baş verdiyini görmək mümkündür.

Paleontoloji dəlilləri aşağıdakı qruplara bölürlər.




1. Stratigrafiik d lill r. M xt lif geoloji d vrl rd  tapılan qalıqlara  sas n m  yy n olunur ki,  n q dim qatlarda onur asız heyvan tipl rin , sonrakı qatlarda is  xordalılar tipin  aid heyvan qalıqları olmuŗdur. Yerin  n  st qatlarında m asir d vrd  yaŗayan bitki v  heyvan qalıqlarına rast g linir.


2.  zotop.  k nt  s xurlarının yaŗı onlarda olan radioaktiv madd lərin izotoplarına g r  m  yy n olunur. Radioaktiv madd lərin par alanması  traf m hit ř raitindən asılı deyil. Ona g r  d  yer qatının yaŗı onda olan radioaktiv madd  miqdarına g r  t yin edilir. M hz buna  sas n d  Yer planetinin yaŗı m  yy n olunmuŗdur.

3. Ke id formalar. Paleontoloqlar m xt lif geoloji d vrl r  aid bitki v  heyvan qalıqlarını  skar etmiŗlər. Bunların bir qismi ke id formalar hesab olunur. Onlara aŗa ıdakıları misal g st rm k olar:


Trilobit r h lq vi qurdlarla bu umayaqlılar arasında ke id forma hesab olunur. Onların bu umlarında, sinir sistemində, t n ff s orqanlarında oxŗarlıq  oxdur. Ancaq trilobit lərin h r bu umunda bir c t  traf olmuŗdur.



 xtiosteqa iki b y k taksonu birl ŗdirir. Onlar balıqlarla suda-quruda yaŗayanlar arasında ke id forma hesab edilir. H m  zg c, h m d   trafları olmuŗdur. B d nl rinin  z ri pulcuqlarla  rt lm ŗd r. Onlara oxŗar olan steqosefallarda h tta s r n nl rin  lam tl rinin oldu u da g man edilir.



Katilozavrlar q dim s r n nl rd r. Onların b zil rində suda-quruda yaŗayanların  lam tl rin  rast g linir.



Psilofit r yosunlarla ali sporlu bitkil r arasında ke id formasıdır. D nizl rin k narında bit n, a aca v  ota b nz r formaları var imiŗ.  z rində pulcuqlar olmuŗ, yeraltı hiss l ri k k msova b nz miŗdir. Torpa a rizoidl r vasit sil  b rkimiŗdir. D ricik  z rində a ız-cıqlar var imiŗ. Onlarda mexaniki,  t r c ,  rt k toxumalarının oldu u g man edilir.



Arxeopteriks sürünənlərin əlamətləri ilə yanaşı, quşların da əlamətləri olmuşdur. Lələklərin olması, ön ətrafların qanadlara çevrilməsi, pəncə lüləsi, içi boş sümüklər, çəngəl sümüyünün olmasına görə quşlara; dişlərin, uzun quyruq fəqərələrinin, qarın qabırğalarının olmasına, pəncə sümüklərinin bitişməməsinə görə isə sürünənlərə oxşamışdır. Onlarda döş tili inkişaf etməmişdir. Uça bilməyən arxeopterikslər yalnız ağacdən ağaca süzmə hərəkəti etmişlər. Hazırda arxeopteriksi birbaşa sürünənlərlə quşlar arasında keçid forma kimi götürürlər.




İnostranseviya sürünənlərlə məməlilər arasında keçid formasıdır. Onlarda kəllənin, onurğanın, ətrafların quruluşunda məməlilərə oxşarlıq daha çox olmuşdur. Bu heyvanların dişləri də, məməlilərdə olduğu kimi, kəsici, köpək və azı dişlərinə bölünmüşdür.



4. Filogenetik sıralar. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində alimlər bir çox heyvanların filogenetik sıralarını müəyyənləşdirmişlər. Bunlardan dırnaqlıların, yırtıcıların, molyuskların, xortumluların və s. heyvanların filogenetik qruplarını göstərmək olar. Dırnaqlılardan atın filogenetik sırasını izləyək.

f Şəklə baxın və atın filogenetik sırasında olan heyvanları və onların ətraflarını müqayisə edin.




Atların filogenetik sıralarını Vladimir Kovalevski müəyyən etmişdir. Onların əcdadının əvvəlcə beşbarmaqlı, tülkü boyda olması məlumdur. Dişləri isə ot yeyən heyvanlardakı kimi qabarıq formalı idi. Hündür otların arasında gizlənmiş bu heyvanlar sıçrayışla hərəkət etmişdir. Təkamül nəticəsində onlarda barmaqların sayı azalmışdır. Neogenin sonunda mühit şəraitinin dəyişməsi, daha quraq olması nəticəsində bitkilər alçaqboylu, kobud və qaba olmuşlar. Belə şəraitdə çöllərdə heyvanlar yalnız qaçmaqla özlərini xilas edə bilərdilər.

Təbii seçmə nəticəsində onlarda ətraflar uzanmış, barmaqların sayı azalmışdır. Bundan sonra heyvanlar sürətlə qaça bilmişlər. Nəticədə 3-cü barmaq inkişaf etmiş, 2-ci və 4-cü barmaqlar isə rudiment şəklində qalmışdır. Qaçmaq həm də onurğa sütununun möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdur. Qaba yem onların dişlərinin qırıqlı olması ilə nəticələnmişdir.

5. Qitələrin dreyfi. Alimlərin yürütdüyü fikirlərdən biri qitələrin yerdəyişməsidir. Paleontoloqlar Antraktidada məhv olmuş çoxlu kələz (iri kərtən-kələ) qalıqları aşkar etmişlər. Bu onu göstərir ki, vaxtilə burada hava isti olmuşdur. Yer kürəsində sürüşmələr nəticəsində iqlim dəyişdikdən sonra heyvanlar şimala doğru çəkilməmişlər.

Bu dəlillər onu göstərir ki, canlılar aləmi müasir şəkllə düşənədək uzun və tarixi bir təkamül yolu keçmişdir.

- 7
1. Yer təbəqələrinin və qazıntı halında tapılan qalıqların yaşlarının necə hesablandığını araşdırın və təqdimat hazırlayın.
 2. Şəkildəki canlılar göy balının əcdadı hesab olunur. Onların təkamülünün ardıcılığını düzgün sıralayın və baş verən dəyişiklikləri müqayisə edin.



3. Şəkillərdə “Canlı qazıntılar” adlanan heyvanlar göstərilmişdir. Onlar hansı heyvanların əlamətlərini daşıyırlar?



4. Qazıntı halında tapılan çənə sümüyünə, onurğa və ətrafların sümüklərinə əsasən heyvanların hansı xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək olar? Fikirlərinizi ümumiləşdirib təqdimat hazırlayın.

2

Makrotəkamülü isbat edən embrioloji dəlillər

M

Çarlz Darvinin təkamül təlimindən sonra bir çox alimlər yeni araşdırmalar aparmış, canlılarda oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, baş verən dəyişiklikləri yalnız paleontoloji dəlillərlə yox, digər faktlarla da əsaslandırmağa çalışmışlar. Belə faktlardan biri də rüşeymlərin quruluşunda oxşarlıqlar olmuşdur.

Embriionların quruluşunda olan oxşarlıq təkamül üçün hansı dəlilləri verə bilər?


7

Qruplara bölünüb şəkildə verilənləri nəzərdən keçirin və onların oxşar cəhətlərini müəyyənəldirin.

1




2



4



3




Embriologiya elmi canlıların rüşeym mərhələsini öyrənir və təkamül dəlilləri verir. Ç.Darvin də orqanizmlərin fərdi inkişafının onların tarixi inkişafı ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu söyləmişdir. Embrioloji dəlillər birhüceyrəli-lərlə çoxhüceyrəli-lər, onurğasızlarla onurğalı-lar və onurğalı-ların müxtəlif sinifləri arasında rüşeymlərin inkişafındakı oxşarlıqları müəyyən etmişdir.

Onurğalı heyvanların inkişafı da birhüceyrəli ziqotdan başlayır. Sonra ziqot bölünərək çoxhüceyrəli birqatlı rüşeymə (*blastula*) çevrilir. Rüşeymin sonrakı inkişafı zamanı bağırsaqboşluqlulardakı kimi ilk bağırsaq boşluğu yaranır və divarı iki qatdan ibarət *gastrulaya* çevrilir. Sonralar onlarda qurdlarda olan rüşeym vərəqləri, buğum-ayaqlıların ürəyinə oxşar döyünən damarlar və s. əmələ gəlir. Doğulmağa və yumurtadan çıxmağa az qalmış isə növün əlamətləri üzə çıxır.

Biogenetik qanun.

XIX əsrin ikinci yarısında alman alimləri Frist Müller və Ernst Hekkel ontogenezin nisbəti qanununu – *biogenetik qanunu* kəşf etdilər. Bu qanuna görə, hər bir fərd öz inkişafında daxil olduğu növün tarixini qısa şəkildə təkrar edir. Yəni *ontogenez** *filogenezin*** qısa təkrarıdır.



Alman alimi və filosofu, ekologiya termininin müəllifi Ernst Hekkel “Təbii yaradılış tarixi” (1868) kitabında insan, meymun və it rüşeymlərindən istifadə etməklə apardığı bəzi müqayisələr əsasında öz mülahizələrini irəli sürmüşdü. Çəkdiyi rəsmlər, demək olar ki, hamısı eyni idi. O, bu rəsmlər əsasında sözügedən canlıların eyni mənşədən yaranması fikrini müdafiə etmişdir.




Frits Müller alman naturalistidir. Onun araşdırmaları, əsasən, darvinizmə, biologiyaya, bitki və heyvan filogenezinə aiddir. Müllərin digər işləri ibtidai dəniz heyvanlarının anatomiya və embriologiyasına, həşərat və çiçəklərin qarşılıqlı əlaqələrinə aiddir.

* *Ontogenez* – orqanizmlərin mayalanma anından (yəni ziqotdan başlayaraq) bioloji ölümünə qədər olan həyatıdır.

** *Filogenezi* – orqanizmlərin tarixi inkişafıdır.





Sxemə baxın və inkişafın necə getdiyini müəyyənəldir.



Onurğalı heyvanların inkişafı zamanı onlarda əvvəl xorda və udlaqda qəlsəmə qövsləri əmələ gəlir. Ətrafları isə olmur. Udlaq qövslərinin olması, ətrafların olmaması, hamısında bir qan dövranının, kloakanın varlığı, böyrəklərin quruluşu və s. onların eyni mənşəyə malik olduğunu göstərir. Sistematik kateqoriyalar böyüdükcə rüşeymlərin oxşarlığı azalmağa başlayır. Növün fərdləri bir-birinə daha çox, eyni tipə daxil olan fərdlər isə daha az oxşar əlamətlərə malik olurlar.



Heyvanların inkişaf zamanı əlamətlərini sxemə uyğun müəyyənəldir.



1. Qurbağa sürfəsinin (çömçəquyruğun) balığa oxşar əlamətləri:

- quyruq;
- üzgəclər;
- qəlsəmələr;
- ikikameralı ürək;
- bir qan dövrəsi;
- yan xətt orqanı;
- ürək boşluğunda yalnız venoz qanın olması.


2. Milçək sürfəsi:

- qurda bənzəyir;
- ətrafları yoxdur;
- qanadları yoxdur;
- baş hissəsi inkişaf etməyib.


Biogenetik qanunu sonralar Aleksey Nikolayeviç Severtsov və İvan İvanoviç Şmalhauzen inkişaf etdirərək göstərmişlər ki, canlılar ontogenezlərində əcdadın yetkin fərdinin yox, embrional mərhələlərinin əlamətlərini təkrar edir. Beləliklə, biogenetik qanun ontogenezlə filogenezlə arasında olan əlaqələrə əsaslanaraq təkamülün isbat etmək üçün mühüm dəlillər verir.

7

1. Neştərcənin inkişafını nəzərdən keçirin və rüşeymində hansı əlamətlərin onurğalılara aid olduğunu müəyyənə bilərsiniz.



2. Qıjının protalında əcdadına oxşarlıqları müəyyənə bilərsiniz.



3. Həşəratlarda ontogenezlərin müxtəlifliyi haqqında məlumat toplayın və təqdim edin.

3

Makrotəkamül – müqayisəli anatomiya dəlilləri


Müasir dövrdə yaşayan canlıların daxili quruluşunu öyrənib təkamül nəticəsi çıxarmaq olarmı?

1. Müasir dövrdə yaşayan oxşar quruluşlu canlıları seçin, müqayisə edib təkamül nəticəsi çıxarın.
2. Qruplara bölünün və araşdırma aparın. Şəkildəki canlı orqanlarda baş verən dəyişikliyin səbəbini müəyyənəldirən. Gəldiyiniz nəticələri müzakirə edin.


1




2



3



4



Makrotəkamülü sübut edən dəlillərdən biri də müqayisəli anatomiya-
dır. Bu dəlillərlə müasir dövrdə yaşayan canlıların orqanları, orqanlar sis-
temləri müqayisə edilir və təkamül nəticəsi çıxarılır.

Makrotəkamül prosesi mikrotəkamül kimi divergensiya yolu ilə gedir.

Divergensiya qohum növlərdə daha tez-tez müşahidə edilən homoloji
orqanların yaranmasına səbəb olur.

Homoloji orqanlar. Mənşəcə eyni, quruluş və funksiyalarına görə bir-birindən fərqlənən orqanlar homoloji orqanlar adlanır. Suiti və delfinin ətrafları, noxudun bığcığı ilə kaktusun tikanı, insanın qolu ilə yarasanın qanadı buna misal ola bilər.



Bu prosədə konvergensiyaya da tez-tez rast gəlinir.

Konvergensiya. Oxşar mühit şəraitində müxtəlif sisteməlik qruplarda orqanizmlərin oxşar xüsusiyyətlər qazanması konvergensiyadır. Məsələn, su mühitində yaşayan köpək balıqları, ixtiozavr (sürünən) və balinalarda (məməli) oxşar bədən forması yaranmışdır. Köstəbək və danadışılərin ön ətrafları torpağı qazmağa uyğunlaşmışdır.


Deməli, konvergensiya analogi orqanların yaranmasına səbəb olmuşdur.



Analogi orqanlar. Mənşəcə müxtəlif olub, eyni funksiyanı yerinə yetirən orqanlar analogi orqanlar adlanır. Onlar quruluşca oxşarlıq qazanmışdır. Məsələn, kəpənəyin qanadı ilə quşun qanadı, köstəbək və danadışının ön ətrafları, zirincin tikanı ilə göyəmin tikanı, boranın bığcığı ilə noxudun bığcığı eyni mənşəli deyil. Məsələn, quşun qanadı ətraf, kəpənəyin qanadı isə dəri çıxıntısıdır. Noxudun bığcığı yarpaq, üzümün bığcığı gövdədir.




Rudimentlər. Bəzi yaşlı heyvanlarda bir qisim orqanlar vardır ki, onlar öz funksiyalarını yerinə yetirmir, yəni qalıq halındadır. Belə orqanlara rudimentlər deyilir. Rudimentlər də canlıların eyni mənşəyin olmasını sübut edir. Köstəbəyin və kor siçanın gözləri rudimentdir. Balinalarda və bəzi sürünənlərdə arxa ətrafların qurşaq sümükləri qalıq halında qalmış, yəni rudimentə çevrilmişdir. Məməlilərin üçüncü göz qapağı da rudimentdir.



Atavizmlər. Bəzən canlı orqanizmlərin inkişafı zamanı bəzi rudiment orqanlar inkişaf edir. Onlar əcdadlarının əlamətlərini xatırladır. Buna atavizm deyilir. Məsələn, bəzən quyruqlu, bəzən çoxtüklü insanların doğulması buna misal ola bilər.

1. “Göstərilən canlılarda konvergensiyaya rast gəlinir” fikrini əsaslandırın.



süngər



hidra



2. Cədvəl qurub bitkiləri qruplaşdırın. Qruplaşdırmanızı əsaslandırın.



zirincin tikanı



nepentesin yarpağı



qarpızın bığcığı



göyəmin tikanı



kaktusun tikanı



noxudun bığcığı

3. Analoji orqanları müəyyənləşdirin.

- A) yemişin bığcığı – boranının bığcığı;
- B) ipəkqurdunun qanadı – göyərçinin qanadı;
- C) pələngin ön ətrafı – quşun qanadı;
- D) insanın əli – yarasanın qanadı;
- E) tırtılın döş ayaqları – hörümçəyin ətrafları.

4. Canlılarda rudiment və atavizmlərə aid araşdırma aparın və təqdimat hazırlayın.

M Hazırda bitki və heyvanların müasir sistematik qrupları təkamülü əks etdirir. Yadınıza salın: bitkilər və heyvanlar aləmində hansı təsnifat vahidləri vardır?

7 2 qrupa bölünün:

I qrup – çay çınqıllıqotunun;

II qrup – boz dovşanın təsnifat sxemini qurun.

Sxemləri müqayisə edin və onlarda oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləyin.

Hazırda canlılar haqqında məlumatlar toplayıb onları sistemləşdirərkən qohumluq əlaqələrinin nəzərə alındığını bilirsiniz.

Əvvəllər canlıların müxtəlif təsnifat sistemləri yaradılmışdır.

Karl Linney ilk elmi təsnifat yaradıcılarından biri olsa da, onun təsnifatı süni idi. Çünki bu təsnifat yalnız zahiri əlamətlərə görə yaradılmışdı. Təsnifat vahidləri isə belə idi: növ, cins, dəstə, sinif.

K.Linney insanlarla insanabənzər meymunları bir dəstədə yerləşdirmişdi. Ancaq bu zaman onların qohumluq əlaqələrini yox, zahiri görünüşlərini nəzərə almışdı.

Canlıların sistematikasını yadandarlardan biri də Jan Batist Lamark olmuşdur. O, heyvanlar aləmini sadəcədən mürəkkəbə doğru 14 sinfə ayırmışdır. Quruluşlarındakı mürəkkəbliyə görə sinflər 6 pilləyə bölünmüşdür. Lamark belə prinsipə qradasiya (pillə) adı vermişdir. Çarlz Darvin canlıları sistemləşdirərkən mənşə birliyini əsas götürmüş, taksonlar* arasında qohumluq əlaqələrinin olduğunu qeyd etmişdir.

Müasir sistematika müxtəlif taksonlar arasında olan qohumluq əlaqələrini çox düzgün əks etdirir. O, ümumi əcdada malik növlərin getdikcə ayrıldığını, ancaq qohumluq əlaqələrinin qaldığını aydın sübut edir. Cinsdən başlayaraq hər bir sistematik qrup özündən aşağıda duran qrupları birləşdirir. Sistematik qrupları ağaca bənzətmək olar. Ağacın uc budaqları növlər olarsa, onlar getdikcə birləşəcək və nəhayət, gövdəni (tip, şöbə) əmələ gətirəcəkdir.

Bitkilər:

aləm, şöbə, sinif, sıra, fəsilə

cins, növ


Heyvanlar:

aləm, tip, sinif, dəstə, fəsilə


cins, növ

* Takson – sistematikanın ölçü vahidi

LAYIHƏ



Oxşar növlərin cinslərdə birləşməsinə Darvinin Qalapaqos adalarında müşahidə etdiyi birəbitdənləri (vüroklar) misal göstərmək olar. Darvin səyahətdə olarkən adalarda bu quşların üç cinsinin olduğunu müşahidə etmişdir: ağac birəbitdənləri, yer birəbitdənləri və silvilər.



Yer birəbitdənləri açıq sahələrdə qidalanırlar, yerdə yuva qururlar. Ağac birəbitdənləri ağacda qidalanırlar, yerdə yuva qururlar. Silvilər isə müxtəlif yerlərdə qidalanırlar və yerdə yuva qururlar. Bu quşları bir-birindən fərqləndirən qidalanma yeri, qidanın müxtəlifliyi, dimdiyin formasıdır. Onların bir qismi bitki mənşəli (parçalayan dimdik), bir qismi isə heyvan mənşəli (tutucu və ovan dimdik) qida ilə qidalanırlar. Məsələn, böyük yer birəbitdəninin qalın, parçalayan dimdiyi toxumların sındırılması üçün uyğunlaşmışdır. Kaktus yer birəbitdəninin dimdiyi və haçalanmış dili kaktus çiçəklərindəki nektarla qidalanmağa imkan verir. Ağac birəbitdələrindən olan ağacdələnbənzər birəbitdən ağac qabıqlarını ovur (ovan dimdik), ancaq uzun və yapışqanlı dili olmadığına görə dimdiyində kaktus iynəsi tutur və cücüləri qabıq altından onunla çıxarır.

Birəbitdələrin hamısı bir növdən əmələ gəlmişdir. Onların əcdadı mərkəzdə yaşamış, adalara gəldikdə isə müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışdır.

Müasir təsnifatın prinsipləri:

- Təbii sistem yaradılarkən indi yaşayan və məhv olmuş növlərin qohumluq əlaqələri nəzərə alınır;
- Bitki və ya heyvanın yerini təsnifatda müəyyən edən zaman onun bütün yaşlarda əlamətlərinin cəmi nəzərə alınır;
- Müasir təsnifatda növlərin xromosom aparatındakı oxşarlıq və fərqlərdən geniş istifadə olunur. Çünki bu, qohumluq əlaqələrinin müəyyən olunmasında əsas rol oynayır.



1. Bitkiləri Karl Linneyə (erkəkciklərin sayına görə) və müasir təsnifata görə qruplaşdırın:

pomidor, kələm, günəbaxan, zəncirotu, turp, kartof, göyçiçək, eşşək-qanqalı, badımcan, soğan.


2. Şəkli nəzərdən keçirin və dimdik formalarını qruplaşdırın.



3. Çarlz Darvinə qədər təsnifatlar nə üçün uğurlu olmurdu? İzah edin və təqdimat hazırlayın.

M Canlıların tarixən inkişafı sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən aliyə doğru getmişdir. Növlər yaşadıkları həyat şəraitinə uyğunlaşmış və buna görə də müəyyən uyğunlaşma xüsusiyyətləri qazanmışlar. Bu uyğunlaşmalar necə baş vermişdir?

5 Göstərilən canlıların yaşadıkları şəraitə uyğun olaraq qazandıqları xüsusiyyətləri müəyyənəldirin. Səbəblərini araşdırın və təqdim edin.



Təbiətdə təkamülün necə getdiyini başa düşmək üçün canlıların tarixi inkişafının əsas istiqamətlərini və yollarını müəyyən etmək lazım idi. Alimlər bu sahədə müəyyən işlər görmüşlər. Aleksey Nikolayeviç Severtsov və İvan İvanoviç Şmalhauzen təkamülün iki istiqamətdə – bioloji tərəqqi (proqress) və bioloji tənəzzüllə (reqress) getdiyini müəyyənəldirmişlər.

Təkamül prosesi canlı orqanizmlərin ətraf mühitə fasiləsiz olaraq uyğunlaşması ilə gedir. Mühit şəraiti dəyişərsə, əlamətlər digər uyğunlaşma əlamətləri ilə əvəz olunur. Bu səbəbdən növlərin bəzisi uyğunlaşıb tərəqqi edir, bəzisi isə uyğunlaşa bilməyib tənəzzülə uğrayır.

Bioloji tərəqqi növlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsinə deyilir.

Bu zaman növün populyasiyalarındakı fərdlərin sayı artır, areal genişlənir, yeni yaranan fərdlərin sayı məhv olanlardan çox olur. Arealın genişlənməsi çox vaxt yeni populyasiyaların yaranması ilə nəticələnir. Hazırda bəzi növlər bioloji tərəqqidədir. Məsələn, əksər cücülər, sap qurdlar, dovşanlar, siçanlar, siçovullar və s. buna misaldır.

Bioloji tənəzzül bioloji tərəqqinin əksidir. Bu zaman məhv olan


fərdlər yeni yarananlardan daha çox olur, növün fərdlərinin sayı azalır, areal kiçilir. Hətta bəzi növlər tənəzzülə uğrayır və məhv olur. Hazırda bir çox iri məməlilərin sayı (fil, kərgədan, bizon və s.) həddindən çox azalmışdır. Bitkilərdən plaunkimilərin nəsli kəsilmək üzrədir. Tarixi inkişaf zamanı bir çox bitki və heyvan növləri tamamilə yox olmuşdur.

A.N.Severtsov və İ.İ.Şmalhauzen təkamülün 3 yolunu göstərmişlər: aromorfoz, idioadaptasiya və ümumi degenerasiya.

Aromorfoz. Bu elə təkamül dəyişkənliyidir ki, quruluşu ümumi yüksəlişə aparır, həyat fəaliyyətini artırır. Quruluş səviyyəsi yüksəldikcə orqanizmlər yeni həyat şəraitinə keçmə imkanı qazanır. Belə orqanizmlər yaşamaq uğrunda mübarizədə böyük üstünlüklər əldə edir və qalib gəlir. Canlılarda fotosintezin yaranması, çoxhüceyrəlilik, cinsi çoxalma prosesi Arxey erası və Proterozoy erasına keçiddə ən mühüm aromorfozlar olmuşdur. Heyvanların quruya çıxması ilə əlaqədar olaraq onlarda bir sıra aromorfozlar: daxili mayalanma, ağ ciyərlər, ətraflar, qanadlar yaranmışdır.

Bitkilərdə baş verən aromorfozlara misal olaraq toxumaların, orqanların yaranmasını, toxumla çoxalma, ikiqat mayalanma proseslərini göstərə bilərik.

- 7 • Məməlilərdə və quşlarda nə kimi aromorfozlar baş vermişdir?
 - Bitkilərdə aromorfozları yada salın və yazın.
 - Onurğalı heyvanların qan-damar sistemində olan aromorfozları müəyyənənləşdirin.
- Araşdırmanın nəticələrini təqdim edin.



Onurğalıların qan-damar sistemi

Aromorfozlar nəticəsində populyasiyalarda doğum ölümə nisbətən çox baş verir. Bu, fərdlərin sayını artırır. Say artdıqca areal genişlənir, bu isə yeni populyasiyaların yaranmasına səbəb olur. Deməli, aromorfozlar bioloji tərəqqi ilə nəticələnir. Aromorfozlar nəticəsində tip, şöbə, sinif kimi iri taksonomik qruplar yaranır.

İdioadaptasiya. Bu prosesdə canlılar yaşadıkları mühit şəraitinə uyğunlaşmalar qazanırlar. Belə uyğunlaşmalar aromorfozlara nisbətən daha kiçik təkamül dəyişiklikləridir. İdioadaptasiyalara misallar:

balıqlar




*bədənənin yastılaşması,
üzgəclərin quruluşu*

çiçəklər



*nektarlıqlar, efir maddələri, əlvan
ləçəklər və s.*

quraqlıq bitkiləri



*yarpaqların tikana, pulcuğa çevrilməsi,
köklərin çox dərinə getməsi, gövdə və
yarpaqlarda suyun toplanması*

meyvə və toxumlar



*qarmaqcıqların, tikancıqların, qanadçaların
və uçağanların* yaranması*


* Uçağanlar bəzi bitkilərin meyvə və toxumlarının yayılmasını təmin edirlər.

Heyvanlarda xəbərdarlıqedicici rəng, qoruyucu rəng, mimikriya, maskalanmalar idioadaptasiyalara misaldır. İdioadaptasiyalar nəticəsində kiçik taksonomik qruplar: növ, cins, fəsilələr əmələ gəlir. İdioadaptasiyalar növ sayının artmasına, arealın genişlənməsinə, növəmələgəlmənin tezləşməsinə, yəni bioloji tərəqqiyə səbəb olur.

Ümumi degenerasiya. Bu prosesdə orqanizmlərin quruluşu sadələşir, çox vaxt onlarda bəzi orqanlar yoxa çıxır və ya qalıq halında qalır. Degenerasiyaya ən çox oturaq və ya parazit həyat tərzini keçirən orqanizmlərdə rast gəlinir. Parazitizmlə əlaqədar olaraq qurdlarda bir çox orqanlar yoxa çıxmış və ya sadələşmişdir. Məsələn, öküz soliterində həzm, hərəkət, duyğu orqanları yox olmuş, sinir sistemi sadələşmişdir. Parazit qurdlarda bu sadələşmələrə baxmayaraq, çoxalma orqanları güclü inkişaf etmişdir.

Parazit həyat tərzini ilə əlaqədar olaraq qızıl sarmaşıqda yaşıl rəng, kök, yarpaqlar yox olmuşdur. Ancaq onda olan sarmaclar bitkinin qidalanmasını təmin edir. Qızılsarmaşıq sürətlə çoxalır. Deməli, ümumi degenerasiya da bioloji tərəqqiyə səbəb olur.

Müasir dövrdə insan bir çox növlərin tərəqqisinə, bir çoxlarının isə təbəzzülünə səbəb olmuşdur. Bunun əsas səbəbi canlı aləmlə onu əhatə edən mühit arasında qarşılıqlı əlaqənin pozulmasıdır. İnsanın cücülərə qarşı istifadə etdiyi kimyəvi maddələrə, bakteriyalara qarşı istifadə etdiyi antibiotiklərə dözümlü formaların yarandığını, çirkab suların axıdılmasının göy-yaşıl yosunların inkişafına səbəb olduğunu yada salın.



A.N.Severtsova görə təkamül yollarının nisbəti

Hər bir iri takson, təbii ki, aromorfoz yolu ilə yaranır. Bundan sonra çoxsaylı idioadaptasiyalar baş verir. Təkamüldə degenerasiyaların daha az baş verdiyi məlumdur.

1. Şəkildəki yosunları qruplaşdırın, suyun dərin qatlarında yaşamaları ilə əlaqədar uyğunlaşma əlamətlərini araşdırın və təqdim edin.



2. Tarixi inkişaf zamanı nəslə kəsilmiş bəzi bitki və heyvanların siyahısını tərtib edin və onların məhv olma səbəblərini araşdırın.
3. Parazit qurdlarda idioadaptasiya və degenerasiya əlamətlərini müəyyənə bilərsiniz, cədvəli doldurun (+ və - qoymaqla) və təqdim edin.

Qurdlar	Hərəkət orqanları	Sormaclar	Qarmaq-cıqlar	Duyğu orqanları	Həzm orqanları
Öküz soliteri					
Exinokokk					
İnsan askaridi					
Qara ciyər sorucusu					
Donuz soliteri					

6

Yer üzərində canlıların inkişaf tarixi



Canlıların inkişafı necə getmişdir? Müasir canlılar necə formalaşmışdır?

Alimlər canlı varlıqların yarandıqdan sonra inkişafının necə getdiyini araşdırmış və bu nəticəyə gəlmişlər ki, müasir canlılar uzun sürən tarixi inkişaf nəticəsində formalaşmışdır.




Şəkillərdə gördüyünüz canlıların xarakterik xüsusiyyətlərini göstərin. Onlar hansı canlıların əlamətlərini daşıyır, onlardan müasir dövrə qədər sayanı hansıdır?



Alimlər Yer üzərində həyatın yaranmasını və inkişafını öyrənmək üçün uzunmüddətli tarixi vaxtlar müəyyənləşdirmişlər. Onlardan ən uzun müddəti eondur.




Həyatın yaranmasının təqribən 3,5–4 milyard il bundan əvvəl baş verdiyi güman edilir. İlk canlılar suda yaranmış, sonra isə quruya çıxmışlar. İlk quru bitkilərindən biri də psilofitlər olmuşdur.



Quruya ilk çıxan heyvanlar isə buğumayaqlılar və molyusklar olmuşdur. Hürümçəkkimilər ilk quru heyvanları hesab olunur.

İlk quru onurğalıları qədim pəncəüzgəcli balıqlardan əmələ gəlmişdir. Qədim pəncəüzgəcli balıqlarda, müasir növü olan latimeriyadan fərqli olaraq, qəlsəmələrlə yanaşı, ağ ciyərlər də olmuşdur.




1. Geoxronoloji cədvəldən istifadə edərək uyğunluğu müəyyən edin:

Arxey	• qapalı qan-damar sistemi;
Proterozoy	• xorda;
Paleozoy	• çoxhüceyrəlilik;
	• ilk quru onurğalıları;
	• eukariotlar;
	• fotosintez;
	• heyvanlar aləminin son tipi.

2. Paleogen dövrünə uyğun olanları seçin.

ikinci signal sistemi, lemurlar, insan, parapitek, süni seçmə, heyvanların əhliləşdirilməsi, driopiteklər, caynaqlar, yastı dırnaqlar.

3. Düzgün çıxışı tapın.



Canlıların inkişafının geoxronoloji tarixinin əksi

Cədvəl

Eonlar	Eralar		Dövrlər və davam etmə müddəti	Heyvanlar aləminin dəyişməsi və ən vacib aromorfozlar	Bitkilər, göbələklər və bakteriyalar aləminin dəyişməsi və ən vacib aromorfozlar
	Adı və davam etmə müddəti mln. illər	Yaşı (mln. illər)			
FANEROZOY	Kaynozoy (yeni həyat) ~67	67	Antropogen, 1,8	İnsan əmələ gəlir və inkişaf edir. Heyvanlar və bitkilər aləmi müasir görkəm alır.	Müasir bitki aləmi formalaşır. Neogenin sonunda tayqa və tundra əmələ gəlir. Antropogendə müasir bitki qruplaşmaları formalaşır.
			Neogen, 23,5	Məməlilər və quşlar hökmandırlar. Driopiteklər və avstrolopiteklər meydana çıxır.	
			Paleogen, 42	Quyuqlu lemurlar, uzunpəncəlilər, parapiteklər meydana çıxır. Başayaqlı molyuskların bir çox qrupları yox olur.	
			Tabaşir, 70	Əsil quşlar və əsil məməlilər formalaşır. Tozlayıcı cücülər meydana çıxır.	Örtülitoxumlular meydana çıxır və geniş yayılır.
	Mezozoy (orta həyat) ~163	230	Yura, 58	Arxeopteriks meydana çıxır. Sürünənlər hökmanlıq edir. Uçan onurğalılar yaranır.	Çıpaqtoxumlular və qijilər geniş yayılır.
			Trias, 35	İlk məməlilər, əsil sümüklü balıqlar meydana çıxır. Dövrün axırında timsahlar əmələ gəlir.	Toxumlu qijilər yox olur.
	Paleozoy (qədim həyat) ~340	Ola bilsin 570	Perm, 55	Yırtıcıdışlı sürünənlər yaranır. Trilobitlərin nəsli kəsilir. Dışlərin ixtisaslaşması baş verir.	Daş-kömür meşələri yox olur. Çıpaqtoxumlu flora zənginləşir.

LAYIHƏ

		Daş kömür, 65–75	İlk sürünənlər əmələ gəlir. Cücülərin ucan formaları, habelə hörümçəklər meydana çıxır. Trilobitlərin sayı azalır.	Qijikimilər inkişaf edir. İlk iynəyarpaqlı bitkilər yaranır.
		Devon, 60	Çoxayaqlılar yaranır. Zirehlilər* inkişaf edir. Qığırdaqlı balıqlar yaranır (onların əcdadlarında sümük var idi). Pəncəüzgəclə balıqlar meydana çıxır. İlk quruda yaşayan onurğalılar – steqosefallar meydana çıxır.	Quruda ali sporlular yayılır. Qijilər, qatırquyruğular, çıpaqtoxumlular meydana çıxır.
		Silur, 30	İlk dəfə buğumayaqlılar və molyusklar quruya çıxır və onlarda hava ilə tənəffüs orqanları yaranır. İlk çənəağızlı onurğalılar meydana çıxır.	Yosunların geniş yayılır. Plaunların ot və ağac formaları yaranır.
		Ordovik, 60	Çənəsiz onurğalılar – zirehlilər meydana çıxır. Onurğa yaranır. İlk dəfə onurğalılarda sümük toxuması yaranır.	Bitkilər quruya çıxır. İlk toxumalar (örtük, mexaniki və ötürücü) və ilk orqanlar (yarpaq və gövdə) əmələ gəlir. Göbələklərin quruya çıxması güman olunur.
		Kembri, 70	Dəniz onurğasızları sürətlə inkişaf edir. Trilobitlər geniş yayılmışdır. Mineral xarici skeletlər (çanaqlar), sonra xarici xitin skeletləri yaranır. Mərcan qayaları yaranır.	Yaşıl, qırmızı və qonur yosunlar sürətlə inkişaf edir və çoxşəkilliliyi yaranır.
KRİPTOZOY	Proterozoy (ilk həyat) ~ 2000	2700	Canlılar bitki və heyvanlar aləminə ayrılır. Çoxhüceyrəli orqanizmlər meydana çıxır. Onurğasızların bütün tipləri yaranır. İlk xordahlılar – kəlləsizlər yarımipipi meydana çıxır.	Bitki hüceyrəsi yaranır. İlk ibtidai göbələklər yaranır. Birlüceyrəli yosunlar əmələ gəlir. Bəzi bakteriyaların quruya çıxması güman edilir.
	Arxey ~ 1000	Ola bilsin ki, 3900-3500		Həyat izləri çox azdır. İlk hüceyrə strukturları əmələ gəlir. İlk hüceyrələr – prokariotlar yaranır. Xemosintez və fotosintez meydana çıxır (qırmızı və yaşıl bakteriyalar, sianobakteriyalar). İlk çöktümlü süxurları yaranır. Atmosferdə CO ₂ -nin qatılığı azalır, O ₂ -nin qatılığı artmağa başlayır.
	Katarxey	4600-3900		Yer-Ay sistemi formalaşır. 4 milyard il bundan qabaq Yerin meteorit bombardmanı başa çatır. Həmçinin okeanlar əmələ gəlir. Həyat izləri hələ yoxdur. Lakin ola bilsin ki, su hövzələrində üzvi maddələrin toplanması baş verir.
QADƏY				

* Zirehlilər – bədəni qərni lövhələrdən ibarət zirehlə örtülmüş heyvanlar

1

İnsanın təkamülü

M

İnsanın əmələ gəlməsi haqqında təzadlı fikirlər mövcuddur. Bu cür fikirlərə müxtəlif xalqların folklorunda, eləcə də adət-ənənələrində rast gəlinir. İnsanın heyvan mənşəli olması haqqında da çoxlu faktlar vardır. Bir tərəfdən insanın ilahi qüvvə tərəfindən yaradıldığını deyənlər, digər tərəfdən isə onun heyvan mənşəli olduğunu sübut etməyə çalışanlar daima öz fikirlərini təsdiq etməyə çalışmışlar. Sizcə, bunların hansı düzdür?

f

Şəkillərə baxın və heyvan skeletində insan skeletinə oxşar xüsusiyyətləri müəyyən edə bilərsiniz. Fikirlərinizi əsaslandırın.



İnsanın heyvan mənşəli olmasına dair ilk fikirlər XVII əsrdə meydana çıxmağa başlamışdır. İlk dəfə Karl Linney insanı primatlar dəstəsində yerləşdirmişdir. Jan Batist Lamark insan əcdadının ağacdən yerə düşüb sürü halında yaşayan meymunabənzər heyvanlar olduğunu söyləmişdi. “İnsanın mənşəyi və cinsi seçmə” əsərində (1871) Ç. Darvin insanı təkamül zəncirinin son halqası hesab etmiş və müxtəlif dəlillərlə bunu sübut etməyə çalışmışdır.

Onun fikirlərini Fridrix Engels “Meymunun insana çevrilməsində əməyin rolu” əsərində (1896) sübut etmişdir. İnsanın təkamülündə ictimai amillərin həlledici rol oynadığını sonralar öz təsdiqini tapmağa başlamışdır.

f

Sizcə, insanın əmələ gəlməsində əməyin xüsusi rol oynadığını alimlər nəyə əsasən söyləmişlər? Fikirlərinizi əsaslandırın.

İnsan məməlilər sinfinə daxil olaraq diafraqmaya, süd vəzilərinə, qulaq seyvanına, ixtisaslaşmış və xüsusi yuvalarda yerləşən dişlərə, plasentaya, üç cüt eşitmə sümüyünə, yeddi boyun fəqərəsinə malikdir. Hissləri ifadə edən mimiki əzələlər yalnız insanabənzər meymunlar və insana məxsusdur.

- İnsanda hansı emosiyalar olduğunu və onların necə qruplaşdırıldığını yadınıza salın.


İnsana morfoloji və anatomik cəhətdən ən yaxın olan heyvanlar insana-bənzər meymunlardır. Onların bədən quruluşu, reduksiya olmuş quyruğu, yastı dırnaqları, kəsici, köpək, azı dişlərinin sayı, əldəki baş barmağın digər barmaqlarla qarşılaşması, 12-13 cüt qabırğası, 5-6 oma fəqərəsinin olması insanlara oxşardır. Meymunlar da vəba, vərəm, qarın yatalağı, çiçək, qrip kimi xəstəliklərə tutulur və dörd qan qrupuna malikdirlər. Xromosom aparatında da oxşarlıq mövcuddur. Məsələn, şimpanzenin xromosom aparatındakı nukleotid ardıcılığı 91% insanınkına oxşardır. Lakin bütün insanabənzər meymunların insana oxşarlığı eyni deyil.



Şimpanze – kəllənin quruluşu və ətrafların ölçüləri



Hibbon – yastı döş qəfəsi, kəllənin hamar olması



Qorilla – ümumi bədən nisbətləri, çanaq, bilək, pəncənin quruluşu



Oranqutan – 12 cüt qabırğa

- Bu meymunlardan quruluş etibarilə insana ən yaxın olanı hansıdır?

Meymunlardan insana ən yaxın olanını demək nisbətən çətindir. Lakin alimlər belə qənaətə gəlirlər ki, bu, şimpanze meymunudur. Ancaq bu meymunların heç biri insanın bilavasitə əcdadı sayılmır.

İnsanla insanabənzər meymunlar arasında mühüm fərqlər vardır. İnsan meymunlardan fərqli olaraq, kollektiv əmək fəaliyyətinə malikdir. İnsan mücərrəd təfəkkürə malik olub yeni əmək alətləri yaradır və onları tətbiq edir. İnsan təkamülünü təsnifat da əks etdirir.

Müasir insanın təsnifatda yeri

Aləm	Heyvanlar
tip	xordalılar
sinif	məməlilər
dəstə	primatlar
fəsilə	insanlar
cins	insan
növ	dərrakəli insan

7

1. Cümlələri tamamlayın:

1. K.Linney ... yerləşdirmişdir.
2. J.B.Lamark ... söyləmişdir.
3. Ç.Darvin ... hesab etmişdir.
4. F.Engels ... sübut etmişdir.

2. Uyğunluğu müəyyən edin:

3. Şəkildə verilənləri yuxarı ətrafların ölçüsünə görə düzgün sıralayın. Morfoloji cəhətdən onların xarakteristikasını verin və təqdimat hazırlayın.

oranqutan

hibbon

qorilla

- a) 12 cüt qabırğa;
- b) biləyin ölçüsü;
- c) çanağın quruluşu;
- d) hamar kəllə;
- e) yastı döş qəfəsi.



1



2



3



4



5

2

İnsanın təkamülü. Embrioloji və müqayisəli anatomiya dəlilləri


M İnsanla heyvanların oxşarlığını göstərən müxtəlif paleontoloji, morfoloji, anatomik, fizioloji və embrioloji dəlillər var. Bəs, görəsən, embrioloji, morfoloji oxşarlıqlar insanın tarixi inkişafının öyrənilməsində nə kimi rol oynayır?

f 1. Şekilləri nəzərdən keçirin. İnsanın embrionu hansına daha çox oxşayır? Bunun səbəbi nədir?



f 2. Şekilləri qruplaşdırın və seçiminizi əsaslandırın.

Embrioloji	Müqayisəli anatomiya



3



4



İnsanla məməli heyvan arasında olan oxşar morfoloji, anatomik, fizioloji və embrioloji xüsusiyyətlərin bir çoxu ilə siz tanışsınız.

• Yadınıza salın, insanla məməlilərin, xüsusən də insanabənzər meymunların hansı oxşar xüsusiyyətləri vardır?

Atavizm. Atavizmlər insanın heyvanlardan əmələ gəldiyini göstərir. Bəzən quyruqlu, çoxməməli, bütün bədəni sıx tüklərlə örtülü, qulaq seyvanını hərəkət etdirə bilən insanlar doğulur. Bu onların əcdadlarının əlamətlərini təkrar etməsidir.




Rudimentlər. İnsan təkamülündə əcdadlarda olan bəzi orqanlar öz əhəmiyyətini itirmiş və qalıq halında qalmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, insanda rudimentlərin sayı çoxdur. Bunlardan kor bağırsağın kor çıxıntısını (apendiks), qulaq seyvanı əzələlərini, üçüncü göz qapağını, seyrək tük örtüyünü misal göstərmək olar.




İnsanın onurğalı heyvanlarla müqayisəsi göstərir ki, o, uzun sürən tarixi inkişaf yolu keçmiş və formalaşmışdır. İnsanın məməli heyvanlara daha çox oxşadığını bilirsiniz.

Şəklə baxın, insan və heyvan rüşeymlərini müqayisə edib oxşar cəhətlərini müəyyənləşdirin.



İnsan və heyvan rüşeymlərinin inkişafını nəzərdən keçirdikdə onların oxşar xüsusiyyətlərinin olduğu müəyyən edilmişdir. İnsan da öz inkişafına mayalanmış yumurtahüceyrədən – ziqotdan başlayır. Ziqotun bölünməsi nəticəsində blastomerlər yaranır, çoxhüceyrəli rüşeym formalaşır. Rüşeymin inkişafı zamanı bir aylığında ikikameralı ürək, üç cüt qəlsəmə yarığı görünür. Barmaqlarının arasında pərdə, kloakası, balıqlarda olduğu kimi, qovucuqlardan ibarət baş beyin olur. Rüşeym inkişaf etdikcə onun baş beyinin yarım kürələri formalaşır, üzərini qırıqlı qabıq örtür. Onurğa sütununun quyruq şöbəsi də inkişaf zamanı formalaşır. Onun fəqərələrinin bir qismi

reduksiyyaya uğrayır, bir qismi isə birləşib büzdüm sumüyünü əmələ gətirir. Dö-lün 3-4 aylığında bədən-in üzəri tüklərlə örtülü olur. Ancaq inkişaf etdikcə tüklər tökülür, yalnız başda uzun tüklər qalır. Hətta 6 həftəlik rüşeymdə çoxlu süd vəzilərinə rast gəlinir. Onun ürəyi döyünən borudan ibarət olur. Rüşeym inkişaf etdikcə onda insana məxsus əlamətlər formalaşır.




7

1. İnsanda atavizm və rudimentlərin səbəblərini araşdırın və təqdimat hazırlayın.

2. İnsanda rudiment olanları seçin:

üçüncü göz qapağı, qulaq seyvanı əzələləri, süd vəziləri, büzdüm sümüyü, ağır dişləri, çoxuşaqlılıq, çiyin qurşağı sümükləri, seyrək tük örtüyü, baldır sümükləri, qan damarları.

3. Şəkilləri müqayisə edin. İnkişafdakı oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənəldirən, təqdimatlar hazırlayın.



neştərçə



insan

4. Uyğunluğu müəyyən edin.

rudiment


atavizm

- qulaq seyvanı əzələlərinin güclü inkişafı;
- çoxtüklülük;
- üçüncü göz qapağı;
- köpək dişlərinin güclü inkişafı;
- kor bağırsağın çıxıntısı (apendiks);
- quyruğun olması.

5. İnsanın tarixi inkişafının öyrənilməsində embriologiya elminin nailiyyətlərinin roluna aid referat hazırlayın.

İnsanın təkamülü. Paleontoloji dəlillər

M İnsanın təkamülünü (antropogenez) bir sıra dəlillər sübut edir. Sxemə baxın. Sxemə nəyi ifadə edir? Fikirlərinizi söyləyin.



f Araşdırın: İnsan təkamülünü hansı dəlillər sübut edir? İnsanın qazıntı halında tapılan qalıqlarını hansı elm öyrənir? Qalıqlara əsasən insanın təkamülünü necə sübut edirlər?

İnsanabənzər meymunların və insanın əcdadının mezozoy erasında kiçik həşəratyeyənlərdən başlanğıc götürməsi ehtimalı vardır. Onların qidası qarışıq olmuşdur. Ancaq ən çox cücülərlə qidalanırdılar. Sonralar bu heyvanlar bir çox şaxələre başlanğıc vermişlər. Onlardan biri də parapiteklərə başlanğıc verən şaxə olmuşdur.



Parapiteklər. Qədim insanabənzər meymunlar olmuş, Afrika, Asiya və Avropada geniş ərazilərdə yaşamışlar. Qazıntılar nəticəsində onlara məxsus qalıqlar tapılmışdır. Onlar üç şaxəyə – oranqutanlara, hibbonlara və nəslə kəsilməmiş driopiteklərə başlanğıc vermişlər.



Driopiteklər. Paleogen dövründə iqlimin soyuması ilə əlaqədar olaraq cənuba doğru uzanan buzlaqlar meşələri məhv etməyə başlamışdı. Meşələr çöllərlə əvəz olunduğu üçün insana-bənzər meymunlar ağacdən düşməyə və yerdə gəzməyə məcbur qalmışdılar. Neogen dövründə yaşayan driopiteklərdə gözlər və eşitmə orqanları yaxşı inkişaf etmişdi. Əlləri formalaşdığı üçün əşyaları daha yaxşı tutur və tullayırdılar. Bədən ölçüləri dəyişmiş, beyinləri daha yaxşı inkişaf etmiş driopiteklər səmti təyin edə bilirdilər. Güman olunur ki, onlar şimpanze, qorilla və avstralopiteklərə başlanğıc vermişlər.



Avstralopiteklər* sürü halında düzənliklərdə yaşamağa başlamış, yırtıcı olmuşlar. Bu heyvanlarda ənsə dəliyi kəllə qutusunun mərkəzinə doğru çəkilmişdi. Beyinlərinin həcmi müasir insanabənzər meymunlara nisbətən daha böyük olmuşdur. Tapılan sümüklər onlarda arxa ətrafların daha yaxşı inkişaf etdiyini göstərir.

7. Avstralopitekləri digər meymunlardan fərqləndirən xüsusiyyətləri göstərin.

Ətraf sümüklərindən, əsasən, çanaq və bud sümükləri insan sümüklərinə daha çox oxşayırdı. Çanağın geniş olması onların dik gəzdiklərini göstərir. Yuxarı ətraflarında baş barmağın quruluşu isə əllərin tutmaq qabiliyyətinin güclü olduğunu, onların daşdan və sümükdən alət kimi istifadə etdiklərini bildirir. Avstralopiteklərin dişlərinin quruluşu da insanın dişinə daha çox oxşayırdı. Müxtəlif ərazilərdə tapılan qalıqlar avstralopiteklərin çoxlu növlərinin olduğunu sübut edir.

Şimal və cənub dairələrindən başlayan soyuqlar insanabənzər meymunların yaşayışını daha da çətinləşdirmişdir. Onlar özlərini həm ətraf mühit amillərindən, həm də digər heyvanlardan qorumaq üçün bir sıra uyğunlaşmalar qazandılar. Avstralopiteklərin bir qismi özlərini müdafiə etmək üçün əmək alətləri düzəltməyə başladı.

Alimlər bu şəxəni “bacarıqlı insan” adlandırdılar.


* Avstralopitek – australis (latınca) – cənublu, pteks (yunanca) – meymun



Alimlərin bir qismi “Bacarıqlı insan”ı ən qədim insanlar hesab edir. “Bacarıqlı insan”lar çay daşlarından kəsən və doğrayan alətlər hazırlamışlar. Barmaq falanqaları yastılaşmışdır. Onlar sonrakı inkişafalarında təkmilləşmiş və ən qədim insanlara başlanğıc vermişlər.

7


1. Sxemi tamamlayın və bu canlıların təkamülü haqqında təqdimat hazırlayın.



2. Yalnız “Bacarıqlı insan”a aid olanları seçin.

- əmək alətlərinin hazırlanması;
- baş barmağın digər barmaqlarla qarşılaşması;
- dişlərin ixtisaslaşması;
- yastı falanqalar;
- yaxşı eşitmə qabiliyyəti.

3. Düzgün çıxışı müəyyənəldir.




4

Ən qədim insanlar

M İnsanın yaranmasını hansı mərhələlərə bölürlər? İlk insanlar hansı xüsusiyyətlərinə görə meymunlardan fərqlənirlər?

7 Aşağıda verilmiş primatları müqayisə edin və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirin.



İnsanın yaranması prosesini 3 mərhələyə bölürlər: ən qədim, qədim və ilk müasir insanlar.



Pitekantrop meymunlarla insanlar arasında aralıq mövqe tutan qruplar olmuşdur. Qalıqları ilk dəfə 1891-ci ildə Asiyada İndoneziyanın Yava adasında Ejen Dübua tərəfindən tapılmışdır. Sonralar Asiyanın digər ərazilərində, Afrikada və Avropada da onların qalıqlarına rast gəldi. Pitekantropar iki ətraf üzərində dayağa söykənərək gəzirdi. Düz qamətli pitekantropların beyinlərinin həcmi 900–1100 sm³, boyları 170 sm olmuşdur. Gözlərinin

üstündə qaşüstü yastıqcıqlar var idi. Çənəaltı çıxıntıları olmadığı üçün nitq qabiliyyətləri yox idi. Ancaq beyinlərinin alın və gicgah payları insana bənzər meymunlara nisbətən yaxşı inkişaf etmişdir. Sürü halında yaşamış, oddan və daş alətlərdən (*ərsin*, *burğu*) istifadə etmişlər. Yaşayış məskənləri olmayan bu qruplar paltar geyinmirdilər.



Sinantropoların qalıqları 1927–1937-ci illərdə ilk dəfə Çində, Pekin yaxınlığında tapıldığı üçün onlar “Çin adamı” da adlanır. Morfoloji xüsusiyyətlərinə görə pitekanthroplara bənzəsələr də, beyinlərinin həcmi onlarınkindən daha böyük olub, 1220 sm³-ə çatırdı. Beyinlərinin sol payı sağ payından daha yaxşı inkişaf etmişdi. Bu da onların sağaxay olduğunu sübut edir.

Alt çənələri və dişləri iri olmuşdur. Çənəaltı çıxıntıları olmadığı üçün nitq qabiliyyəti yox idi. Qaşüstü yastıqcıqları var idi. Oddan istifadə edir, onu qoruyub saxlayır, dəri paltarlar geyinirdilər. Mağaralardan tapılan kül qatları “Çin adamı”nın oradan sığınacaq kimi istifadə etdiklərini göstərir. Onların daş, buynuz və sümükdən hazırlanmış əmək alətləri (*ərsin, tiyə, iti ucluq*) olmuşdur.



Heydelberg adamının qalıqları ilk dəfə 1907-ci ildə Almaniyanın Heydelberg şəhəri yaxınlığında tapılmışdır. Bundan başqa, qalıqlara Asiya və Afrikada da rast gəlinmişdir. Aşkar edilmiş alt çənə sümüyündə çənəaltı çıxıntı yox idi. Dişlər iri olsa da, insan dişlərinə oxşar idi. Onlar da oddan istifadə etmiş, sürü halında yaşamışlar. Ən qədim insanlar hannibal idilər. Öz sürülərindən olan insanların belə əti ilə qidalana bilirdilər.




Azıxantrop Azərbaycanın Xocavənd rayonu ərazisində yerləşən Azıx mağarasında bu insanların alt çənə sümüyü tapılmışdır. Onlar da sürü halında yaşamış, oddan istifadə etmiş, dəri paltar geyinmişlər. Daşdan, sümükdən müxtəlif alətlər hazırlamışlar.

Tapılan qazıntılar azıxantropoların qazma üsulu ilə yerdə ocaq qurduqlarını göstərir.



1. Pitekanthroplarla sinantropaların oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd edin.



2. Pitekanthroplarda gicgah payının yaxşı inkişaf etməsi nəyi sübut edir? Gözlərin yanlardan ön tərəfə çəkilməsi nəyə səbəb olmuşdur? Fikirlərinizi əsaslandırın və təqdim edin.

3. Sinantropolar süni od almağı bacarmırdılar. Sizcə, onlar odu haradan əldə edirdilər? Fikirlərinizi əsaslandırın.


4. Uyğunluğu müəyyən edin.

Homo cinsinə aid olanlar

Homo cinsinə aid olmayanlar

- a) azıxantrop;
- b) driopitek;
- c) sinantrop;
- d) Heydelberq adamı;
- e) pitekanthrop;
- f) avstralopitek;
- k) şimpanze.


4. Düzgün çıxışı tapın.



5

Qədim və ilk müasir insanlar

M Şəkildəki insanlar bir-birindən nə ilə fərqlənirlər? Fərqlər ən çox hansı əlamətlərdə görünür?



T Verilmiş şəkilləri müqayisə edin və fikrinizi əsaslandırın.



Ən qədim insanın skeleti



Neandertalın skeleti




Ən qədim insanın əmək alətləri



Neandertalın əmək alətləri



Ən qədim insanın kəllə skeleti Neandertalın kəllə skeleti



Neandertallar qədim insanlar dır. Onların qalıqları ilk dəfə İspaniyada tapılmışdır. 1856-cı ildə Almaniyanın Neander çayı vadisi ərazisində onların tam skeleti aşkar edilmişdir. Qalıqlara Avropa ilə yanaşı, Asiyada da rast gəlinmişdir. Boyları 155–165 sm olan bu insanlarda onurğa ayrılıqları

zəif inkişaf etmişdir. Onlar nisbətən əyilərək hərəkət edirdilər. 50–100 nəfərlik qruplarla yaşayı, dəri paltarlar geyinir, oddan istifadə edir və onu əldə etməyi bacarırdılar. Beyinlərinin həcmi təqribən 1400 sm³ idi. Beyin qabığındakı qırışlar müasir insanlara nisbətən az idi. Alınları maili idi, qaşüstü yastıqcıqları yaxşı inkişaf etmişdi. Çənəaltı çıxıntıları bəzilərinə yox idi. Ancaq qazıntılar zamanı tapılan bəzi çənə sümüklərində çənəaltı çıxıntıya təsadüf olunur. Bu da onu göstərir ki, neandertallarda aydın olmayan, bəzilərinə isə aydın nitq var imiş. Mitoxondri DNT-si müasir insanlara çox yaxın olmuşdur.

Əmək bölgüləri var idi. Əmək alətlərini daşdan, sümükdən, ağacdən (iti ucluq, ərsin, tiyə) hazırlayırdılar. Kişilər ov edir, qadınlar və uşaqlar isə bitki məhsulları toplayırdılar. Onlar müxtəlif sığınacaqlardan istifadə edir, ən çox isə mağaralarda yaşayırdılar. İlk dini rüşeymlər onlarda yaranmışdır. Ancaq neandertallar müasir insanın birbaşa əcdadı deyildi.



Kromanyonlar ilk müasir insanlar olmuşlar. Qalıqları ilk dəfə Fransa'nın Kromanyon kəndi yaxınlığında tapıldığı üçün onları belə adlandırmışlar. Sonralar bu qalıqlara Asiya, Afrika, hətta Avstraliya qitələrində də təsadüf edilmişdir. Tapılan qalıqlara əsasən onların boylarının 180 sm-ə çatdığı, alınlarının enli və düz olduğu, qaşüstü yastıqcıqlarının olmadığı müəyyən edilmişdir. Kromanyonlar aydın nitqə malik olmuşlar. Əmək alətlərindən daş ucluq, ağac dəstəyi olan ucluq, buynuzdan düzəldilmiş qarmaq (harpun), nizə və s. istifadə etmişlər. Onlar özlərinə sığınacaq düzəldir, paltarlarını tikmək üçün sümük iynələrdən istifadə edirdilər. Qayaüstü rəsmlər çəkir, öz əmək alətlərini bəzəyir, saxsıdan müxtəlif qablar düzəldirdilər.

Kromanyonlarda dini rüşeymlər daha da inkişaf etməyə başlamışdı. Onlar heyvanları əhliləşdirmiş, əkinçiliklə məşğul olmuşlar. Kromanyonlarda hannibalizm xeyli azalmışdır. Güman edilir ki, onlar özlərini ailəyə qurban vermiş, qadınların, uşaqların, qocaların, xəstələrin qayğısına qalmışlar. Kromanyonların təkamülündə sosial amillər daha üstün olmuşdur.

f Azərbaycanda kromanyonların yaşadığı məskənlərin olub-olmadığını araşdırın.

- Azıxantropların əmək alətləri Afrikada yaşamış bacarıqlı insanın əmək alətləri ilə, demək olar ki, eyni olmuşdur. Bunu necə izah etmək olar?
- Şəkillərə baxın və uşaqların xarici görkəmindəki fərqlərin səbəblərini izah edin.




Planetimizdə yaşayan bütün insanlar “Dərrakəli insan” növünə (Homo sapiens) aiddir. İnsanlar yaşadıkları ərazilərə, mühitə uyğunlaşaraq irqlərə ayrılmışlar. Hazırda alimlər insanları 3 əsas irqə – avropoid, monqoloid və ekvatorial irqlərə ayırırlar. Ancaq bu irqlərin içərisində qarışıq, kiçik irqlərə də rast gəlinir.

Avropoid



Avropa, Cənubi Asiya və Şimali Afrika əhalisi bu irqə aiddir. Dəriləri açıq rəngli olduğundan, bunlara *ağ irq* də deyirlər. Onların nazik, dar burunları, düz, yumşaq saçları, ensiz üzləri olur. Şimalda yaşayanların dəriləri daha açıq rəngdədir.

Monqoloid



Amerikanın yerli əhalisi, Sibirdə yaşayanlar, Mərkəzi və Şərqi Asiya əhalisi bu irqə aiddir. Onların nümayəndələri *sarı irq* də adlandırılır. Üzləri iri və yastı, saçları düz və sərtir. Gözlərinin ətrafları büküşlüdür.

Ekvatorial



Onların nümayəndələri iki şaxəyə – Afrika və Avstraliya şaxələrinə ayrılır. Bu irqə mənsub olanların dəriləri, gözləri qara, burunları isə yastı və enli olur. Saçları qara və qıvrımdır (avstraliyalılarda dalğalı).

İrqlərin bu cür qruplaşdırılması onların yaşadıkları mühitə uyğunlaşması hesab olunur. Məsələn, dar burun ora daxil olan havanı isidir, enli yastı burun isə onun qızmasına mane olur. Qıvrım saçlar başı günəşin zərərli şüalarının təsirindən qoruyur. Açıq rəngli dəri günəş şüalarını udur, qara dəri isə bədəni şüalardan qoruyur. Bütün bu fərqlərə baxmayaraq, planetimizdəki bütün insanlar bir növə, yəni dərrakəli insan növünə aiddir.

İrqi ayri-seçkiliyə yol verməyə!

7

1. Oddan istifadənin neandertallar üçün əhəmiyyəti nə idi? Ümumiyyətlə, oddan istifadə insan təkamülündə hansı morfoloji dəyişikliklərə səbəb olmuşdur? İzah edin.
2. Açar sözlərdən istifadə edib cümlələri tamamlayın.
 - a) Kromanyonlarda... təkamül ... təkamüldən üstün oldu.
 - b) ... dini rüşeymlər daha da formalaşmış, onlar ..., ..., ... məşğul olmuşlar.
 - c) ... ilk aydın olmayan və aydın nitqə malik olmuşlar.
 - d) Sağaxaylıq və solaxaylıq... yaranmışdır.

maldarlıq, sosial, əkinçilik, dulusçuluq, bioloji, neandertal, dəri, kromanyon, sinantrop

3. Kəllənin kimlərə məxsus olduğunu müəyyənləşdirin və xüsusiyyətlərini şərh edin.



Təqdimat və referat mövzuları

1. Makrotəkamülü isbat edən paleontoloji dəlillər
2. Makrotəkamülü isbat edən embrioloji dəlillər
3. Müasir dövrdə yaşayan keçid formalar
4. Makrotəkamülün müqayisəli anatomiya dəlilləri
5. Qarışıq və kiçik irqlər
6. Azərbaycanlıların mənsub olduğu irq. Əlamətlərin bu cür olma səbəbləri
7. İnsanın tarixi inkişaf mərhələləri
8. Paleontologiya elmi və nailiyyətləri
9. Embriologiya elmi və nailiyyətləri

Genetika irsiyyət və dəyişkənlik haqqında elmdir. Monohibrid çarpazlaşma


M Canlıların özlərinə bənzər nəsil verdiyi məlumdur. Ancaq əlamətlərin nəsildən-nəslə necə keçdiyi, oxşarlıqların və fərqlərin necə yarandığı xeyli müddət sirr olaraq qalırdı. Uzun araşdırmalardan sonra alimlər bu sirləri açmağa başladılar və beləliklə, genetika elmi yarandı.

- Genetika nəyi öyrənir?
- Əlamətlərin yeni nəslə ötürülməsi necə baş verir?

7 Suallara əsasən müzakirə aparın.

- 1) Nəyə görə yeni orqanizm valideynlərlə tam eyni olmur?
- 2) Sizin ata-ananızla, bacı-qardaşınızla oxşarlıq və fərqlərinizin səbəbi nədir?
- 3) Yaxın qohumlarınızla hər hansı bir oxşarlığınız varmı?
- 4) İnsanlar niyə bu qədər fərqli görünüşə malikdir?

Hibridləşmə hələ XVIII əsrdən öyrənilməyə başlanmışdır. 1760-cı ildə alman botaniki İosif Kelyerter bir bitkinin tozcuğu ilə həmin növə aid digər sortdan olan bitkini tozlandırırdı. Alınan yeni bitki sortu hər iki bitkinin xüsusiyyətlərinə malik olmuşdur. Alim bunun səbəbini izah edə bilməmişdir.



Bunu ilk dəfə izah edən çex alimi Qreqor Mendel olmuşdur. Mendelin işləri öz riyazi dərinliyi və dəqiqliyi ilə fərqlənir. Vyana Universitetinin riyaziyyat və biologiya fakültəsində təhsil alan, kilsədə rahiblik edən alim kilsənin

bağçasında noxud bitkisi üzərində 10000-dən çox təcrübə aparmışdır. Təcrübələrin nəticələrini Münhen Universitetinin professoru Neqeliyə göndərən Mendel ondan müsbət cavab ala bilmir. Buna görə də alimin işləri 35 il gizli qalır. Yalnız 1900-cü ildə Mendel qanunları sanki yenidən kəşf olunur.



Qreqor Yohan Mendel çex bioloqu və botanikidir. O, irsiyyət haqqındakı təsəvvürlərin inkişafında mühüm rol oynamış, “genetikanın atası” adlandırılmışdır.

Q.Y.Mendel ilk dəfə irsən keçmənin qanunauyğunluqlarını öyrənmişdir.

- Sizcə, Mendel noxud bitkisinin hansı xüsusiyyətlərinə görə təcrübələrini onun üzərində aparmışdır?



Mendelin kəşfinin uğurunu obyektin düzgün seçimi, məsələnin düzgün qoyulması, təcrübələrin sadədən mürəkkəbə doğru aparılması təmin etmişdir.

Noxud bitkisinin çarpazlaşdırılması əvvəl bir, daha sonra isə iki və daha çox əlamət üzrə aparılmışdır.

Mendel genləri göstərmək üçün latın əlifbasının hərflərindən istifadəni təklif etmişdir.

Dominant gen üstünlük təşkil edən əlaməti və onun həm homoziqot, həm də heteroziqot vəziyyətdə təzahürünü müəyyənləşdirir. Dominant gen latın əlifbasının böyük hərfi ilə işarə olunur.

Resessiv gen gizli əlaməti müəyyənləşdirir. Bu genlər homoziqot vəziyyətdə olduqda resessiv əlamət müşahidə edilir. Resessiv gen latın əlifbasının kiçik hərfi ilə işarə olunur.

Yuxarıda qeyd olunanlardan başqa, genetikada digər terminlərdən və işarələrdən də istifadə olunur:

□ – erkək fərd
○ – dişi fərd

♂ – erkək qamət
♀ – dişi qamət

Lokus xromosomda genin yerləşdiyi sahədir.

Allel genlər homoloji xromosomların eyni sahəsində (lokusunda) yerləşən genlərdir. Məs:

$\begin{array}{c} A \\ \text{---} \\ \bullet \\ \text{---} \\ A \end{array}$
 $\begin{array}{c} A \\ \text{---} \\ \bullet \\ \text{---} \\ a \end{array}$
 $\begin{array}{c} a \\ \text{---} \\ \bullet \\ \text{---} \\ a \end{array}$

Homoziqot çarpazlaşma zamanı nəsildə parçalanma verməyən, eyni tipli qamətlər hazırlayan fərdlərdir (genotiplər – AA və aa).

Heteroziqot çarpazlaşma zamanı nəsildə parçalanma verən, müxtəlif tipli qamətlər hazırlayan fərdlərdir (genotip – Aa).

Fenotip orqanizmin xarici və daxili əlamətlərinin cəmidir.

Genotip valideynlərdən alınan genlərin cəmidir.

Pariantale (P) valideyn deməkdir.

Filiale (F) qız deməkdir.

Mendelin I qanunu “Eynilik və ya dominantlıq” adlanır.



Q. Mendel öz təcrübələrində sarı və yaşıl toxumlardan alınan bitkiləri çarpaz tozlandıraraq və alınan toxumların hamısının sarı rəngdə olduğunu müşahidə etmişdir. Deməli, birinci nəsildə alınanlar eyni əlamətə malikdir. Bu təcrübədə sarı rəng dominant, yaşıl rəng isə resessivdir.

Bundan sonra Mendel aldığı hibridlərdən öz-özünə tozlanma ilə nəsil əldə edərək ciddi hesablamalar aparır. Beləliklə, o, müəyyən əlamətlərə görə fərqlənən valideyn formalarının çarpazlaşdırılması və bir sıra nəsillərdə bu əlamətlərin irsən ötürülməsinin hibridoloji metodunu genetika elminə gətirmişdir.

7 Sxem əsasında aşağıdakı sualları cavablandırın.

- Sarı və yaşıl toxumlu noxud bitkilərinin çarpazlaşması zamanı alınan birinci nəsil hibridlərini öz aralarında çarpazlaşdırdıqda hansı formalar alınar?
- Alınan nəsildə sarı və yaşıl noxudların nisbəti necə olar?

Toxumları sayan Mendel onların II nəsildə 6022-nin sarı, 2001-nin isə yaşıl olduğunu müşahidə etmişdir. Deməli, II nəslin $\frac{3}{4}$ -ü sarı, $\frac{1}{4}$ -i isə yaşıl olmuşdur. Yəni nəsildə fenotipə görə dominantlarla resessivlərin nisbəti 3:1 olmuşdur.




Buna oxşar hadisələr başqa əlamətlər üzərində aparılan təcrübələr zamanı da müşahidə edilmişdir. Mendel müşahidə edir ki, birinci nəslin hibridlərindən alınan nəsilərdə parçalanma baş verir və gizli qalan əlamətlər üzə çıxır.

♀ \ ♂	$\frac{1}{2}$ A	$\frac{1}{2}$ a
$\frac{1}{2}$ A	$\frac{1}{4}$ AA	$\frac{1}{4}$ Aa
$\frac{1}{2}$ a	$\frac{1}{4}$ Aa	$\frac{1}{4}$ aa

Bunun nəticəsində Mendel özünün ikinci – “*Əlamətlərin parçalanması*” qanununu irəli sürmüşdür.


Mendelin II qanunu (parçalanma): çarpazlaşma zamanı I nəsildə gizli qalan əlamət (ressesiv) II nəsildə 3:1 nisbətində üzə çıxır.

Analizedici çarpazlaşdırma. Çarpazlaşmadan göründüyü kimi, dominant fenotipli fərdlər həm homoziqot, həm də heteroziqot ola bilər. Belə hallarda bu fərdin genotipini dəqiq müəyyənləşdirmək üçün onu resessiv fenotipli fərdlə çarpazlaşdırırlar. Bu, analizedici çarpazlaşdırma adlanır. Burada əgər resessiv əlamət üzə çıxarsa, deməli, dominant əlamətə malik valideyn heteroziqot imiş.



Analizedici çarpazlaşma

Bəzi hallarda dominant genin əlamətləri tam şəkildə özünü göstərmirsə (natamam dominantlıq və ya irsiyyətin aralıq xarakteri), monohibrid çarpazlaşmada 2-ci nəsildə, fenotip və genotip üzrə nisbət – 1:2:1 olur.




7 1. Aşağıdakı nöqtələrin yerinə homoziqot və ya heteroziqot terminlərini əlavə edin:

- a) Resessiv əlamətli orqanizmin genotipi
- b) Hibridlərin genotipi,
- c) Dominant əlamətli fərdlərin genotipi, ola bilər.
- ç) Genotip AA
- d) Genotip AaBbCc

2. Qarpız meyvəsinin bütöv yaşıl rəngi irsən resessiv əlamət kimi ötürülür. Homoziqot zolaqlı qarpızla berrəngli qarpızın çarpazlaşdırılması nəticəsində hansı əlamətli nəsil alınacaq? (*tam dominantlıq mövcuddur*)

3. Aşağıdakı sxemdə uşaqların qan qrupu verilmişdir. Sxemə əsasən ata və ananın qan qrupunu müəyyən edin.



4. “Qurdun balası qurd olar, insan əlində böyüsə də”, “Ot kökü üstə bitər”, “Nə əkərsən, onu da biçərsən” və s. kimi atalar sözlərini əlamətlərin irsən keçməsi qanunauyğunluqlarına istinad edərək əsaslandırın.

5. Buynuzsuz (kərə) inəklə buynuzlu buğanın çarpazlaşmasından alınan buzovların hamısı buynuzsuzdur. Valideynlərin və F_2 nəsil hibridlərinin genotip və fenotipləri necə olar?

Buynuzsuzluq (kərəlik) buynuzluluq üzərində dominantdır.

M Mendel monohibrid çarpazlaşma zamanı bir çox vacib genetik qanuna uyğunluqlar üzə çıxarmışdı:

- dominantlıq hadisəsi;
- birinci nəsil hibridlərindən alınan nəslin fenotipcə 3:1 nisbətində parçalanma verməsi;
- ressesiv əlamətli fərdlərdə allellərin dəyişməzliyi;
- qamətlərin saflığı, yəni qamətlərin allel cütlərdən yalnız birinə malik olması.


Təbiətdə orqanizmlər bir yox, bir neçə əlamətə görə fərqlənir. Buna görə də Mendel sonrakı təcrübələrində iki və daha çox əlamətlərlə fərqlənən formaları da çarpazlaşdırmışdı. Sizcə, Mendel qanunları burada özünü necə göstərir?

J Araşdırma apararaq sualları cavablandırın.

- Dihibrid çarpazlaşma nədir?
- Dihibrid çarpazlaşma zamanı götürülən iki əlamət bir-birinə təsir edirmi?
- Dihibrid çarpazlaşmada fenotip və genotip nisbəti necə olur?
- Polihibrid çarpazlaşma nədir?
- Bu çarpazlaşmalarda əlamətlər hansı qanuna uyğunluqlar əsasında nəslə ötürülür?


Cədvələ əsasən dihibrid çarpazlaşma zamanı alınan nəsildə genotipləri və fenotipləri müəyyənləşdirib təqdim edin.

Dihibrid çarpazlaşma iki cüt fərqləndirici əlaməti olan valideyn formalarının çarpazlaşdırılmasıdır. Mendel rəngi və formasına görə fərqlənən homoziqot sarı hamar toxumlu noxud bitkisini yaşıl qırıxıq toxumlu bitki ilə çarpazlaşdırmışdır. Birinci nəsil hibridlərdə eynilik özünü göstərmişdir. Alınan bütün toxumlar sarı və hamar olmuşdur. Hibridlərin öz-



özünə tozlanması zamanı fenotipə görə sarı-hamar, sarı-qırıxıq, yaşıl-hamar, yaşıl-qırıxıq toxumlu noxudlar 9:3:3:1 nisbətində alınmışdır. Genotipə görə isə 4:2:2:2:1:1:1:1 şəkildə parçalanma baş vermişdir.

Polihibrid çarpazlaşma. Mendel üç cüt allellə fərqlənən noxud sortlarını da çarpazlaşdırmışdır. İrsiyyət qanunauyğunluqları bu zaman ümumi olmuşdur. Üç əlamətə görə çarpazlaşma sxemi aşağıdakı kimidir:



İkinci nəsil F_2 -ni almaq üçün birinci nəsil hibridləri çarpazlaşır. Bu zaman hər bir fərd 8 cür qamet hazırlaya bilər. Alınan qametlər: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc.

► Pennet cədvəlini doldurun, trihibrid çarpazlaşma zamanı fenotiplərin, genotiplərin və kombinasiyaların sayını müəyyənləşdirin.

	ABC	ABc	AbC	Abc	aBC	aBc	abC	abc
ABC								
ABc								
AbC								
Abc								
aBC								
aBc								
abC								
abc								

Polihibrid çarpazlaşmanın nəticələrini araşdıraraq Mendel özünün üçüncü – “*Əlamətlərin sərbəst paylanması*” qanununu irəli sürdü. Bir əlamət digərindən asılı olmayaraq nəsildən nəslə ötürülür. Bu qanun müxtəlif əlamətləri idarə edən qeyri-allel genlər başqa-başqa homoloji xromosomlarda olduğu zaman doğru olur. Qanuna əsasən, dihibrid çarpazlaşmanın fenotipi $(3:1)^2$, trihibriddə $(3:1)^3$, ... polihibriddə $(3:1)^n$, genotipdə isə $(1:2:1)^2$, $(1:2:1)^3$, ... $(1:2:1)^n$ olur.

Mendelin III qanunu: çarpazlaşma zamanı hər cüt allel digər cütlərdən asılı olmayaraq nəsildən nəslə sərbəst surətdə paylanır.



1. Qaydanı tamamlayın və cavabınızı əsaslandırın.

Fenotip genotipin təsiridir.


2. İngilis genetikisi Recinald Pennet allel genlərin uyğunluğunu müəyyən-
ləşdirmək üçün cədvəldən istifadə etməyi təklif etmişdi. Təqdim olun-
muş cədvələ genotipləri əlavə edin.

♂ / ♀	A	a	♂ / ♀	A	a
A	AA		A		
a			a		

3. Mendel qamətlərin saflığı fərziyyəsini irəli sürmüşdü. Fərziyyənin ma-
hiyyəti ondan ibarətdir ki, orqanizmlərdə hər cütdən qamətə yalnız bir
allel gen daxil olur. Bu fərziyyəni poliploidlərə aid etmək olarmı?
Fikirlərinizi əsaslandırın.

4. Pomidorun meyvələrinin qırmızı rəngi sarı rəng üzərində, yumru
formas armudvari forma üzərində dominantdır. Sxemə əsasən he-
sablaysın:

- diheteroziqotların sayını;
- homoziqotların sayını;
- bir əlamətə görə hetero-
ziqotların sayını;
- qırmızı meyvələrin sayını;
- sarı meyvələrin sayını;
- yumru meyvəli bitkilərin
sayını;
- armudvari meyvəli bitkilə-
rin sayını.




5. Məsələ.

İnsanın albinizm xəstəliyinə (*melanin pigmentinin olmaması və ya çatışmazlığı*) tutulması və solaxay olması resessiv əlamətdir. Ailədə vali-
deynlərdən biri diheteroziqot genotiplidir, digər valideyn isə bu əlamətlər
üzrə resessiv fenotipə malikdirsə, həmin ailədə uşaqların göstərilən
əlamətlərlə doğulma ehtimalı nə qədərdir?

3

İlişikli irsiyyət

Müxtəlif allelləri daşıyan genlər homoloji xromosomların müxtəlif cütlərində yerləşərkən əlamətlər sərbəst paylanır. Genlərin sayı xromosomların sayından dəfələrlə artıqdır. Buna görə də bir xromosomda çoxlu genlər yerləşə bilər. Aydındır ki, bu zaman genlər sərbəst paylana bilməz.



- Verilmiş xromosom cütlərində nə kimi fərq var?
- Mendel qanunlarını bunların hansına aid etmək olmaz?

7 Araşdırma aparın və sualları cavablandırın.

- Müxtəlif allelləri daşıyan genlər homoloji xromosomların eyni cütlərində yerləşərkən əlamətlər hansı qanunauyğunluqla nəsildən nəsle ötürülür?
- İlişikli irsiyyət hadisəsi nəyə deyilir?

Tomas Morqan genetika ilə ötən əsrin əvvəlində, Mendel qanunlarının yenidən kəşfindən sonra maraqlanmağa başlamışdır. Onun tədqiqat obyekti drozofil (meyvə milçəyi) olmuşdur.




Tomas Hant Morqan – Amerika bioloqu, genetika elminin banilərindən biri, İtakada, Nyu-Yorkda (1932) Genetika üzrə VI Beynəlxalq konqresin sədri olub. “Xromosomların irsiyyətdə rolu” ilə bağlı kəşfə görə Nobel mükafatına layiq görüldü.

7 Şəkillərə baxın və Morqanın tədqiqat obyekti üçün drozofil milçəyindən istifadə etməsinin səbəbini müəyyənləşdirin.



Erkək fərd



Dişi fərd

- Milçək laboratoriya şəraitində hər 10–15 gündən bir nəsil verir;
- Xromosom sayı azdır;
- Fenotipə fərqlənən çoxlu formaları vardır.

Morqanın homoziqot boz bədənli, normal qanadlı (dominant əlamət) milçəklə qara bədənli, rudiment (tam inkişaf etməmiş) qanadlı (resessiv əlamət) milçəyi çarpazlaşdırması zamanı bütün milçəklər boz bədənli, normal qanadlı oldu. Deməli, Mendelin birinci qanunu özünü göstərdi. Lakin birinci nəsilə alınmış heteroziqot milçəklərlə resessiv milçəklərin çarpazlaşmasında alınacaq milçəklərin sayı Mendel qanunlarına uyğun olmadı.


Əgər Mendel qanunlarına görə, diheteroziqot genotipli dişi fərdlər resessiv genotipli erkək fərdlərlə çarpazlaşarsa, alınan nəsilərdə boz bədən, normal qanadlılar 25%, boz bədən, rudiment qanadlılar 25%, qara bədən, normal qanadlılar 25%, qara bədən, rudiment qanadlılar 25% alınmalı idi. Ancaq bu nisbət alınmır. Parçalanma aşağıdakı kimi ola bilər:

- 41,5% boz bədən, normal qanad;
- 41,5% qara bədən, rudiment qanad;
- 8,5% boz bədən, rudiment qanad;
- 8,5% qara bədən, normal qanad.

Buna səbəb qeyri-allel genlərin eyni xromosomlarda yerləşməsi və irsən nəsilədən-nəslə bir yerdə ilişikli keçmələridir.


Əgər belədirsə, valideyn fərdlərə oxşamayan 17% yeni kombinasiyalar necə yaranır?

Təcrübələr göstərir ki, yeni kombinasiyaların yaranmasına səbəb meyoza prosesi zamanı I profazada homoloji xromosomların konyuqasiyası zamanı gen mübadiləsinin (krossinqover) baş verməsidir. Krossinqover hadisəsinin baş vermə tezliyi genlərin



Drozofildə analizədiyi çarpazlaşdırma

xromosomlarda yerləşməsi vəziyyətindən asılıdır. Genlər xromosomda nə qədər uzaq yerləşərsə, krossinqover bir o qədər çox baş verər. Bu hadisələrin öyrənilməsi hazırda orqanizmlərin gen xəritələrinin qurulmasına imkan verir. Hər bir orqanizmdə ilişkili gen qruplarının sayı haploid xromosom yığımına bərabər olur.



Xromosom çarpazlaşmasının sxemi:

A – homoloji xromosomlar;

B, C – xromosom çarpazlaşması (krossinqover);

D – gen sahələri mübadilə olunmuş

xromosomlar.


Sitogenetikada xromosomların öyrənilməsi sahəsində Morqan öz əməkdaşları ilə çalışarkən çarpazlaşma nəticəsində alınan nəsilərdə əlamətlərin qeyri-adi nisbətinin səbəblərini açmağa və irsiyyətin xromosom nəzəriyyəsini formalaşdırmağa nail oldu. Bu nəzəriyyənin əsas müddələri aşağıdakılardır:

1. Müxtəlif genlər eyni xromosomlarda yerləşə bilər. Hər bir xromosom ilişkili genlər qrupunu təmsil edir, növün ilişik qruplarının sayı haploid dəstdə olan xromosomların sayına bərabərdir.

2. Hər bir gen xromosomda müəyyən yer (lokus) tutur; xromosomlarda genlər düz xətt üzrə yerləşir.

3. Homoloji xromosomlar arasında allel gen mübadiləsi gedir.

4. Xromosomda genlər arasında məsafə onların arasındakı krossinqoverin sayına düz mütənasibdir.




Pomidor bitkisinin gen xəritəsi (hərflərlə genlərin adı, rəqəmlərlə yerləşmə yerləri göstərilmişdir)

7 1. Şimpanzedə $2n = 48$, toyuqda $2n = 78$ olduğunu nəzərə alsaq, bu canlılarda ilişikli gen qruplarının sayını müəyyənləşdirin.


2. Genlər arasında krossinqoveri hansı düzgün əks etdirir?

- A) A və a
- B) A və b
- C) K və d
- D) D və k
- E) C və v



3. Valideyn formalarından alınan F_1 hibridlərinin genotipi CcDdEeKk kimidir. Tam dominantlıq mövcuddur, genlər ilişiklidir, krossinqover baş verməmişdir. Çarpazlaşma zamanı alınan qamətləri yazın.

4. Sxemə əsasən AK; Ab; bD; bK genlərini aralarında ilişikliyi artma ardıcılığı ilə düzün. Seçiminizi izah edin.











4

Cinsiyyətin genetikası

M Çox qədim zamanlardan insanları düşündürən məsələlərdən biri də doğulan uşaqların cinsiyyətinin yaranmasında hansı valideynin əhəmiyyətli rol oynaması olmuşdur. Adətən, bu məsələdə analar əsas götürülürdü. Çox zaman qız uşaqları doğulduqda analar günahlandırılır, hətta cəzalandırılırdı. Sizcə, canlılarda cinsiyyətin müəyyən olmasında valideynlərdən hansı həlledici rol oynayır?


f Araşdırma apararaq verilmiş canlılarda cinsiyyəti hansı fərdin müəyyən etdiyini müəyyənəldirən? Sualları müzakirə edib cavablandırın.



- Doğulan uşağın qız və ya oğlan olması nədən asılıdır?
- Müxtəlif heyvanlarda cinsiyyət necə idarə olunur?

Drozofil milçəyinin xromosom yığımları nəzərdən keçirildikdə erkək və dişilərdə 3 cüt xromosomun fərqlənmədiyi (autosom), ancaq bir cütün fərqləndiyi görünür. Bunlar cinsiyyət xromosomlarıdır. Dişidə bunlar XX, erkəkdə isə XY adlanır. Qamətlər hazırlanarkən dişilər eyni cür 3+X qamətləri, erkəklər

isə iki cür $3+X$ və $3+Y$ qamətlərini hazırlayır. Deməli, cinsiyyəti müəyyən edən erkək fərdlərdir.



İnsanlarda, məməlilərdə, suda-quruda yaşayanlarda da xromosom yığını drozofildə olduğu kimidir.


Dişi heteroqamətliyinə təsadüf olunan orqanizmlərdə cinsiyyətin müəyyən olunması yumurtahüceyrələrdən asılıdır.

Quşlar, əksər sürünənlər, kəpənlərin bəzi növlərində.

Canlılar içərisində elə orqanizmlər vardır ki, onların dişilərinin cinsiyyət xromosomları XX olduğu halda, erkəklərdə Y xromosom olmur. Onlar XO xromosomlarına malik olur.

Düzqanadlılar, taxtabitilər və s.

Güvələrdə isə erkəklərdə XX , dişilərdə isə XO xromosomları olur.



Bal arılarında dişilər $2n$, erkəklər isə n xromosom yığımlarına malik olur. Ancaq erkəklər yaşlandıqca bu hal aradan qalxır.

7 Hələ çoxdan qeyd olunmuşdur ki, bir çox heyvan populyasiyalarında və insanlarda yeni yaranan nəsillərdə cinslərin nisbəti 1:1-dir. Bunun səbəbini necə izah edərsiniz?

Bəzi bitkilərdə cinsi xromosomlar:

♀ XX	} kənaif, maya	♀ XY	} çiyləkəkdə
♂ XY		♂ XX	
	sarmaşığı, elodeya		

- Cinsiyyətə ilişkin irsiyyətin nə olduğunu yadınıza salın.

Cinsiyyət xromosomları yalnız cinsiyyəti müəyyənləşdirmir. Autosom xromosomlarda olduğu kimi, cinsiyyət xromosomlarında da ilişkin qrupların olduğu məlumdur. Həmin genlərin cinsiyyətə ilişkin genlər, bunların nəslə ötürülməsi isə cinsiyyətə ilişkin irsiyyət adlandırığını bilirsiniz. Məsələn, pişiklərdə ala-bula rəng yalnız dişilərdə müşahidə olunur. Bunun səbəbi uzun müddət məlum qalmışdır. Cinsiyyətə ilişkin irsilik hadisəsi məlum olduğdan sonra bu məsələ aydınlaşmışdır.

Pişiklərdə qara rəng B, sarı rəng b geni ilə müəyyən olunur. Bu genlər X xromosomlarda yerləşir. Y xromosomlarda belə genlər olmur. Belə olduğu halda, Bb kombinasiyasında ala-bula pişiklər alınır.

7 Sxemdə sual işarələrinin yerinə genotipləri yazın və erkəklərin ala-bula olmamasının səbəbini izah edin.

Dişi pişiklər	Erkək pişiklər
Qara → ?	Qara → ?
Sarı → ?	Sarı → ?
Ala-bula → ?	?

İnsanlarda hemofiliya (qanın laxtalanmaması) və daltonizm (qırmızı və yaşıl rəngləri seçə bilməmək) xəstəliklərinin də cinsiyyətə ilişkin keçidi məlumdur. Daltonizm xəstəliyi resessiv genlərlə idarə olunur və X xromosomunda yerləşir. Deməli, dominant genləri daşıyan X xromosomu digər X xromosomunda daşıyan resessiv əlaməti üzə çıxmağa qoymur. Xəstəlik oğlanlarda fenotipə özünü göstərə bilər. Çünki Y xromosomları bu genlərə heç bir təsir göstərə bilmir.

- 7 Hemofiliya xəstəliyinə görə ana daşıyıcı, ata sağlamdırsa, alınan nəsildə hansı uşaqların doğulacağını müəyyənləşdirin.

İnsanlarda əzələ atrofiyası. Bu xəstəlik zamanı əzələlər zəifləyir və iş görmə qabiliyyəti itir. Belə xəstələr 20 ildən artıq yaşaya bilmirlər. Xəstəliyin səbəbi əzələlərdə olan zülallardan birinin sintezini təmin edən X xromosomda yerləşən genin öz funksiyasını yerinə yetirə bilməməsidir. Bu problemin səbəbi aydınlaşdıqdan sonra xəstəliyin müalicə olunması sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür.

Əgər təhlil olunan genlər cinsiyyət xromosomlarında lokallaşmışdırsa, cinsiyyətlə ilişikli irsilik adlanır. Morqan öz əməkdaşları ilə birlikdə təcrübi yolla sübut etmişdir ki, X və Y xromosomları cinsin müəyyən edilməsində əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən həmin xromosomlar alimlər tərəfindən cinsiyyət xromosomları adlandırılmışdır.

Hələ çoxdan qeyd olunmuşdur ki, bir çox heyvanların populyasiyasında dişi və erkəklərin nisbəti 1:1-dir. Eyni cinsiyyət xromosomlarına malik cins – *homoqamet*, müxtəlif cinsiyyət xromosomlarına malik olan isə *heteroqamet* adlanır. İnsanda, drozofildə və digər orqanizmlərdə dişi fərd, kəpənəklərdə, sürünənlərdə, quşlarda isə erkək fərdlər *homoqamet*dir.



- 7 1. İnsanlarda xromosomların sayı və növlərini nəzərə alaraq qadın və kişi orqanizmlərində hazırlanan qametləri yazın.

2. Uyğunluğu müəyyən edin və seçiminizi izah edin.

- cinsiyyəti erkəklər müəyyən edir.
- cinsiyyəti dişilər müəyyən edir.

- a) dəvəquşu
- b) şimpanze
- c) qurbağa
- d) triton
- e) gürzə
- f) tut ipəkqurdu

3. Fenotipcə daltonik xəstə qızlar doğula bilərmə? Bunun səbəbini izah edin və valideynlərin genotiplərini, nəsildə alınacaq uşaqların fenotip və genotipini yazın.

M Genetikanın öyrənilməsi, ilk növbədə, tibbi biliklərin inkişafı üçün lazımdır. Genetik pozuntulara görə 15% uşaq hələ doğulmamış, 3% uşaq doğuş zamanı, 3% uşaq böyük yaşa çatmamış tələf olur, 20% insan nikaha daxil olmur və 10% ailə uşqsız qalır. Bu və ya digər dəyişikliklər necə baş verir? Xəstəliklərin səbəbinin araşdırılmasında aşağıda göstərilənlərin nə kimi rolu vardır?

1. Əlamətin dominantlığı və resessivliyinin, həmçinin onun autosom və ya cinsiyyət xromosomu ilə ilişikliyi;
2. Xromosom və genlərdə baş verən dəyişkənliyin;
3. Ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq genotipin dəyişməsinin;
4. Hormon və fermentlərin sintezinin çatışmazlığı ilə bağlı gen mutasiyalarının.

7 Araşdırma aparın və insan orqanizmində xromosomlar və onların genlərində baş verən dəyişikliklərin hansı xəstəliklərin yaranmasına səbəb olduğunu müəyyənəldirin.

Genetik qüsurların səbəb olduğu minlərlə xəstəliklər mövcuddur. Lakin onların hamısı hələ də tam öyrənilməmişdir. Belə xəstəliklərə həm xromosomlarda, həm də genlərdə baş verən dəyişikliklər nəticəsində yaranan mutasiyalar səbəb ola bilər. Bu mutasiyalar həm autosom, həm də cinsi xromosomlarda baş verə bilər. Bu səbəbdən belə xəstəliklərin irsiyyətin autosom-dominant tipli, məsələn, *Marfan sindromu*, *polidaktiliya* və *autosom-resessiv* tipli, məsələn, *albinizm*, *fenilketonuriya* kimi növləri mövcuddur. Cinsiyyətlə ilişikli idarə olunan insan xəstəlikləri haqqında əvvəlki mövzuda artıq danışılmışdır.

Xromosom mutasiyaları xromosomun strukturunda baş verən dəyişikliklərlə bağlı ola bilər. Məsələn, beşinci xromosomun hissəsinin itkisi zamanı insanda *Lejen sindromu* və ya “pişik çığırtısı”, xromosomun hissəsinin köçürülməsi və ya xromosomun sahəsinin 180 dərəcə çevrilməsi zamanı leykozun müəyyən formaları özünü göstərir.



Lejen sindromlu uşaq


Genom mutasiyalarının kariotipdə xromosomların sayının dəyişməsi ilə bağlılığı məlumdur. Bilirsiniz ki, Daun sindromu 21-ci cüt xromosomun, Patau sindromu 13-cü cüt xromosomun, Edvards sindromu isə 18-ci cüt xromosomun artıqlığı ilə bağlıdır. Belə mutasiyalar *trisomiya* adlanır.

Cinsi xromosomların çatışmazlığı və ya artıq olması ilə bağlı pozuntulara da rast gəlmək olar. Məsələn, qadının xromosom dəstində bir X xromosomunun olmaması *Şerşevski-Terner* sindromunun inkişafına, kişilərdə isə artıq X xromosomunun (XXY) olması *Klaynfelter* sindromuna gətirib çıxarır.



Daun sindromu

Səbəbi xromosomların iyirmi birinci cütündə bir xromosomun artıq olmasıdır. *Əlamətləri* sifət yastı, göz yarıqları dar, qollar qısa, boy kiçik, kəməğillilikdir.



Şerşevski-Terner sindromu

Səbəbi iyirmi üçüncü cüt xromosomun bir vahid azalmasıdır.

Əlamətləri: bu zaman cinsiyyət xromosomu tək X olduğundan cinsiyyət-cə qadın doğulur. Lakin cinsiyyət vəziləri zəif inkişaf edir. Belə insanların boyları qısa olur, qulaqları normadan aşağıda yerləşir. Boyun əzələləri çiyinə qədər genişlənməmiş olur.



Patau sindromu

Səbəbi on üçüncü xromosom cütündə xromosomun artıq olmasıdır.

Əlamətləri: göz almasında, kəllənin beyin və üz şöbələrində qüsurların yaranması, ürək kameralarının arakəsmələrində qüsurlar, böyrək, bağırsaq və daxili cinsiyyət üzvlərində çatışmazlıqlar. Belə xəstələr, adətən, bir ildən çox yaşamırlar.

Tibbi genetikanın tərəqqisi irsi xəstəliklərin diaqnostikasının inkişafına və onların düzgün müalicəsinə imkan yaradır. Bir çox ölkələrdə, həmçinin bizim ölkədə də inkişaf etmiş tibbi-genetik məsləhətxanalar yaxın qohum nikahları zamanı yaranan irsi xəstəliklərin inkişafının qarşısının alınmasına imkan verir. Belə nikahların bağlanması zamanı zərərli resessiv genlərin homoziqot vəziyyətə keçməsi nəticəsində nəsildə irsi xəstəliklərin yaranması ehtimalı nəzərəcarpacaq dərəcədə artır.

Talassemiya xəstəliyinin fenotipcə üzə çıxması belə baş verir. Bundan əlavə, belə nikahlar ölü uşaqların doğulması hallarını iki dəfə artırır. Tibbi-genetik məsləhətvərmələr zamanı sitogenetik, biokimyəvi tədqiqat metodlarından istifadə olunur, gələcək valideynlərin şəcərəsi (nəsil ağacı) araşdırılır. Bəzən valideynlərdə olan xromosom və ya gen pozuntuları fenotipik şəkildə müşahidə olunmur. Belə pozuntular yaxın qohumların nikahlarında özünü göstərə bilər.

Hamiləlik dövründə dölətrafi mayenin biokimyəvi və sitogenetik müayinəsi – *amniosentez* müayinəsi aparılır. Bu müayinə daha çox doğulacaq uşaqda Daun və bu kimi digər sindromları təyin etmək üçün aparılır. Bu metodun köməyi ilə oraqvari hüceyrə anemiyası və s. kimi yüzlərlə genetik xəstəliyi əvvəlcədən müəyyən etmək olar.

Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, irsi xəstəliklərin yaranma riski mutagen faktorlarla bağlıdır. Bu faktorlara kimyəvi (məişət kimyası, bəzi qida boyaq maddələri, zəhərli kimyəvi maddələr), intensiv elektromaqnit dəyişkənliyi, bioloji mutagenlər (viruslar, peyvəndlərin bəzi növləri) aiddir.

Son zamanlar genetik dəyişmələr, patoloji hamiləlik, inkişafın qüsurları ilə əlaqədar xəstəliklər xeyli çoxalmışdır. Bütün bunlar ətraf mühitdə muta-

gen maddələrin çoxalması ilə əlaqədardır. Alimlər hesablamışlar ki, şüalanmadan qorunma tədbirləri mövcud olduğu halda belə yeni doğulan uşaqların 0.05 %-i süni radiasiya mənbələri hesabına xəstə gen daşıyıcıları olacaqlar. Mühit amillərinin təsiri nəticəsində somatik hüceyrələrdə baş verən mutasiyalar nəticəsində yaranan xərçəng xəstəliyi XXI əsrin bəlasına çevrilib.



Gen xəstəlikləri ayrı-ayrı genlərin molekulyar quruluşunu dəyişən mutasiyalarla əlaqədar yaranır. İnsanın patoloji əlamətlərinin genləri normal əlamətləri idarə edən genlərin allelləridir. Hazırda insanın 400-dən çox gen xəstəlikləri məlumdur. Bu xəstəliklərin meydana çıxmasının əsas səbəbi DNT molekulunda baş verən dəyişkənliklərdir.

Maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəliklər



Karbohidrat mübadiləsinin pozulması monosaxaridləri və disaxaridləri parçalayan fermentlərin genlərində baş verən mutasiyalarla əlaqədardır. Müxtəlif xəstəliklər zamanı sinir sistemi də daxil olmaqla bir çox orqanlar zədələnir. Buna Tey-Saks xəstəliyini misal göstərmək olar.

Xəstəlik zamanı mielin qışasının dağılması, əqli zəiflik, hərəkət koordinasiyasının itməsi, bəzən tam hərəkətsizlik və bəzi orqanlarda çatışmazlıqlar müşahidə olunur.

Lipid mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəlikləri iki qrupa bölürlər:


1. Mübadilənin pozulması nəticəsində yaranan məhsulların hüceyrə daxilində və ya qanda toplanması ilə yaranan xəstəliklər;
2. Lipid mübadiləsinin pozulması nəticəsində sinir sisteminə yaranan xəstəliklər.

Amin turşu mübadiləsinin pozulması gen xəstəlikləri arasında ən böyük qrupdur. Bunlardan fenilketanuriya və tirozinemiya göstərmək olar.

Vitamin mübadiləsinin pozulması müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, homosisturiya. Bu zaman mərkəzi sinir sistemi zədələnir, damar mənşəli tromblar əmələ gəlir, göz büllurunda qüsurlar meydana çıxır.



1. İnsanın genetik xəstəliklərini aşağıdakı sxem üzrə qruplaşdırın.





Müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək xəstəliklərin əlamətlərini qeyd edin və insan orqanizmində genlərin nə kimi rol oynadığının izahını verin.

2. İnsanda hansı genetik xəstəliklər autosom xromosomlarla irsən ötürülür? Cavabınızı əsaslandırın.
3. “İrsi xəstəliklərin müəyyən olunmasının müasir metodları” mövzusunda təqdimat hazırlayın.

M Canlılarda irsiyyətin öyrənilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, genlər çoxcəhətli təsirə malikdir. Orqanizmin əlamətlərinin inkişafı çoxlu miqdarda genlərin qarşılıqlı təsirində özünü göstərir.

- Bəs bu qarşılıqlı təsir fenotipə necə təsir edir?
- Ayaqları lələkli göyərçinlərdə və ya tüksüz itlərdə digərlərindən fərqli olaraq hansı əlamətlərin mütləq müşahidə olunduğunu xatırlayın.

f Şəkilə təsvir edilənlərin Qreqor Mendelin və Tomas Morqanın kəşf etdiyi qanunlarla uyğun olub-olmadığını müəyyənəldirin.



Adadovşanlarında F_2 nəsində alınan boz, qara və ağ rəngləri göstərən nisbət (9:3:4), noxudun ağ və qırmızı çiçəklərində (9:7) nisbətində alınır.

Hüceyrələrdə biokimyəvi proseslər kimi, orqanizmdəki fizioloji proseslər də qarşılıqlı əlaqəlidir. İlk növbədə, bu onunla bağlıdır ki, genotip qarşılıqlı əlaqədə olan genlər sistemidir. Genetiklər sübut etmişlər ki, qarşılıqlı təsir eyni və ya müxtəlif xromosomların müxtəlif lokuslarında yerləşən həm allel, həm də qeyri-allel genlər arasında baş verə bilər.

Bu qarşılıqlı təsirlərdən bəzilərinin bioloji müxtəlifliyin dəyişməsinə əlavə bir təsiri olmasa da, digərləri üçün bunun əhəmiyyəti çoxdur. Bəzi qarşılıqlı təsirlərin dəyişməsi və ya yox olması biomüxtəlifliyin məhvinə səbəb ola bilər. Bununla da global ekoloji problem yaranır.

Mendel düşünürdü ki, hər bir əlamət 1 cüt allel tərəfindən idarə olunur. Ancaq çoxillik araşdırmalar və təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əlamətlər iki və daha artıq allellə idarə oluna bilər. Əlamətlər çoxlu allellər tərəfindən idarə olunarsa, buna *çoxallellilik* deyilir.

Bir əlamətin neçə alleli olursa-olsun, nəşildə diploid yığımda bu allellərdən yalnız ikisi, haploid yığımda isə yalnız biri iştirak edir. Əgər bir xarakteri idarə edən allelləri C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 və s. kimi işarə etsək, onda diploidlərdə C_1C_2, C_3C_4, C_1C_3 və s. kimi allellər müşahidə olunur. Haploidlərdə isə bunlardan, sadəcə, birinə, məsələn, C_1, C_2, C_3 və s. rast gəlinir.

Ada dovşanlarında tükün rəngi 4 müxtəlif allel tərəfindən idarə olunur. Bu genlər arasında qarşılıqlı təsir olmadığından onlarda 4 müxtəlif fenotip müşahidə edilir.



İnsanlardakı I, II, III, IV qan qruplarını A, B və O genləri müəyyənləşdirir. Bunlardan A və B dominant, O geni resessivdir. A və B bir yerdə olanda isə qarşılıqlı təsir özünü göstərir. İnsanın qan qruplarında 6 genotip, 4 fenotip olur.

Fenotip (qan qrupu)	Genotip		Eritrositdəki antigen	Plazmadakı antitel
	Homoziqot	Heteroziqot		
A	AA	AO	A	Anti-B
B	BB	BO	B	Anti-A
AB	–	A və B	A və B	–
O	OO	–	–	Anti-A və anti-B


- f** Heteroziqot ikinci qan qrupuna malik ana və dördüncü qan qrupuna malik atanın doğulacaq uşaqları neçə genotip, neçə fenotipə malik ola bilər?

Cədvəl qurun və alınan nəticəni əsaslandırın.


Genlərin qarşılıqlı təsiri

Genotipdə genlər qarşılıqlı təsirdə ola bilər. Biz bunun allel genlərdə dominantlıq və resessivlik olaraq necə baş verdiyini bilirik. Ancaq qeyri-allel genlər də qarşılıqlı təsirdə ola bilər. Bir əlamət bir neçə genlə idarə olunarsa, buna genlərin qarşılıqlı təsiri deyilir. Onun tipləri bunlardır: komplementarlıq, epistaz və polimeriya.


Komplementarlıq. Bir əlamət qeyri-allel genlərlə idarə olunur. Ətirli noxud bitkisinə çiçəklərin rəngi buna misal ola bilər. Əgər çiçəyin genotipində dominant gen yalnız bir allel cütündə olarsa, ağ rəngli; hər iki cüt allel olarsa, qırmızı rəngli çiçəklərə malik bitkilər alınır.



Epistaz. Qeyri-allel genlərdən biri digərinin təsir gücünü zəiflədə bilər. Buna epistaz deyilir. Adadovşanlarında tükün rəngi iki cüt allellə müəyyən olunur. Onlarda rəngin əsas geni (C – c), digəri isə rəngi paylaşıdın (A – a) allelləridir. Nəticə belə olur:



Polimeriya. Əlamətin meydana çıxması müxtəlif qeyri-allel genlərin qarşılıqlı təsirindən asılıdır. Əsasən əlamətin meydana çıxması dominant allellərin miqdarından asılı olur. Məsələn, insanda dərinin rəngi dörd cüt qeyri-allel genlərlə idarə olunur.



Genlərin külli miqdarda təsiri (pleyotropiya): Nisbətli dəyişkənlik zamanı bəzi canlılarda olan əlamətlərin bir-birinə təsirini araşdırmışdınız. Bunun səbəbi bir genin bir neçə əlamətə təsir göstərməsidir.

Deməli, orqanizmin əlamətlərinin inkişafı ayrı-ayrılıqda yox, genlərin çoxlu miqdarda təsiri ilə əlaqədardır.

1. Ana IV qan qrupuna, ata isə II heteroziqot qan qrupuna malikdir. Alınan nəslin genotip və fenotiplərini təyin edin.
2. Qara rəngli (Ccaa) adadovşanı ilə boz rəngli (CcAa) adadovşanı çarpazlaşdırılmışdır. Nəsildə neçə faiz ağ adadovşanı alınar?
3. Cədvəldə verilənlərə əsasən cavablandırın. Bəzən rəqəmlər hər iki hala aid ola bilər.

Homoziqot		Heteroziqot	
III qan qrupu	II qan qrupu	I qan qrupu	IV qan qrupu
1. genotip	2. 1 cür qamet hazırlayır	3. 4 cür qamet hazırlayır	4. fenotip
5. rezus mənfi IV qan qrupu	6. rezus mənfi II qan qrupu	7. rezus mənfi I qan qrupu	8. rezus mənfi III qan qrupu

4. Müxtəlif kombinasiyalardan istifadə edərək insanda qan qruplarının irsən ötürülməsinin sxemini tərtib edin.

M Müasir elmi məlumatlar təsdiq edir ki, irsi dəyişkənliyin əsasını mutasiyalar təşkil edir. Mutasiya daşıyan fərd başqa mutasiya daşıyan fərdlə çarpazlaşır. Müəyyən bir nəticədə genlərin yeni kombinasiyaları, yeni genotiplər yaranır. Bu da təbii seçmə üçün ilkin material verir.

Populyasiya daxilində bu proseslər necə baş verir?

f Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin əsas müddəalarını xatırlayın. Onları genetikanın qanunları ilə əlaqələndirin.

Təkamül nəzəriyyəsi populyasiyalarda genetik proseslərin öyrənilməsi sayəsində daha da inkişaf etmişdir.

Darvinin təkamül nəzəriyyəsi və Mendel genetikasının sintezi istiqamətində ilk addımları Sergey Sergeyeviç Çetverikov atıb. Mürəkkəb olmayan riyazi metodlardan istifadə edərək o sübut etmişdir ki, heyvanların təbii populyasiyasında resessiv mutasiyalar itmir, gizli (heteroziqot) vəziyyətdə toplanır, təbii seçmə və dəyişkənlik üçün material verir.

Həqiqətən, mutasiyalar irsi dəyişkənliyin daimi mənbəyidir. Mutasiyaların yaranma tezliyi müxtəlif orqanizmlərdə müxtəlifdir. Təbii populyasiyalar çarpazlaşma sayəsində yayılan müxtəlif mutasiyalarla zəngindir. Orqanizmlərin əksəriyyəti bir çox genlərə görə heteroziqotdur. Sübut olunub ki, heteroziqot orqanizmlərin yüksək uyğunlaşma və həyat qabiliyyəti vardır.

Beləliklə, homoziqot vəziyyətdə mutasiyaların əksəriyyətinin zərərli olmasına baxmayaraq, onların heteroziqot genotipdə saxlanması fərdin populyasiyada yaşamaq qabiliyyətini artırır. Digər tərəfdən, faydalı mutasiyalar təkamül prosesinin inkişafına kömək edə bilər.

Populyasiyalarda genetik prosesləri riyazi olaraq hələ 1908-ci ildə xarakterizə etmək mümkün olmuşdur. Bir-birindən xəbərsiz olaraq riyaziyyatçı Qodfri Hardi İngiltərədə və həkim Vilhelm Vaynberq Almaniyada populyasiya genetikası qanununu formalaşdırmışlar. Bu qanuna əsasən sərbəst çarpazlaşma zamanı, seçim təzyiqi və digər amillər (mutasiya, miqrasiya) olmadan homoziqot və heteroziqot orqanizmlərin tezliyi sabit qalır.

Hardi-Vaynberq qanunu aşağıdakı şərtlər olduqda özünü doğruldur:

1. Populyasiya böyük olmalıdır ki, genlər təsadüfi birləşə bilsinlər;
2. Mutasiyalar baş verməməlidir;

3. Genlər üçün əlverişli və ya əlverişsiz seçmə olmamalıdır;
4. Növün fərdlərinin başqa populyasiyalara miqrasiyası baş verməməlidir.

Təbii şəraitdə bu şərtlərə riayət olunmadıqda qanun özünü doğrultmur.

Eyni növün müxtəlif populyasiyaları müxtəlif mutant genlərlə və ya əlamətlərlə zəngin ola bilər. Bu, ətraf mühitin eyni olmayan şəraiti ilə bağlıdır. Coğrafi və bioloji izolyasiya populyasiyalar arasındakı genetik fərqi təsbit edir və möhkəmləndirir. Bu da mikrotəkamül proseslərinə şərait yaradır.

Genofond populyasiyanın, növün və digər sistematik qrupların fərdlərində genlərin cəmidir.



1. Düzgün fikirləri seçin:

- a) Populyasiya dalğaları populyasiyalarda genlərin tezliyini dəyişmir.
- b) Yeni yaranmış populyasiyaların genofondu valideyn populyasiyanın genofondundan zəngindir.
- c) Populyasiyalarda genlərin tezliyinin istiqamətlənmiş dəyişməsi təbii seçmənin təsiri ilə şərtlənmişdir.
- ç) Populyasiyalarda təbii seçmə heteroziqotların xeyrinə təsir edir.
- d) Təcrid olunmuş populyasiyalarda yaxın qohum çarpazlaşması orqanizmin həyat qabiliyyətini artırır.

2. İnsan populyasiyasında qonur gözlülərin sayı 840, mavi gözlülərin sayı isə 160-dır. Verilmiş populyasiyada heteroziqotların sayını müəyyən edin.

3. Siçovul populyasiyasında 420 boz, 80 qara siçovullara rast gəlinir. Resessiv formanın rastgəlmə tezliyini (a) və dominant formaların (A) heteroziqotlarının neçə faiz olduğunu hesablayın.

Təqdimat mövzuları

1. Genetika elminin inkişaf tarixi
2. Nəsildən nəslə ötürülən irsi xəstəlik
3. Tibb elmi və genetika
4. Patau sindromu – xromosom anamaliyasıdır.

V. Ətraf mühitin qorunması və bərpası Orqanizmlərin qarşılıqlı təsiri

M Mühitin abiotik amillər kimi, biotik amillər də təbii qruplaşmaların tərkibində mühüm rol oynayır. Hər qruplaşmada canlılar arasında müxtəlif qarşılıqlı təsirlər yaranır. Canlılar arasında münasibətlərin dəyişməsi yeni təbii birliklərin formalaşması ilə nəticələnə bilər.

Bu münasibətlər hansılardır? Münasibətlərin dəyişməsi nə kimi ekoloji problem yaradar?

- f**
- Şəkildəki canlılar arasında nə kimi münasibətlər mövcuddur? Bu münasibətlər nəyə xidmət edir?
 - Şəkildəki canlılar arasında mövcud olan qarşılıqlı münasibətlərin hansı xüsusiyyətləri var? Münasibətləri necə qruplaşdırmaq olar?
 - Təbii birliklərin yaranması üçün canlılar arasındakı münasibətlərin rolu nədən ibarətdir?
 - Canlılar arasında münasibətlərin dəyişməsinin nəticəsi nə ola bilər?



Hər bir təbii birliklərdə canlılar arasında müxtəlif qarşılıqlı təsirlər həm eyni növün (növdaxili), həm də müxtəlif növlərin (növlərarası) fərdləri arasında ola bilər. Bu cür əlaqələr qida, yaşayış yeri və s. uğrunda mübarizə zamanı müşahidə olunur. Növlərin fərdlərinin bir-birinə təsirləri faydalı (f), zərərli (z) və ya neytral (n) ola bilər. Eyni ekoloji sistem daxilində olan bu münasibətlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar: çiçəkli bitkilərdən nektar toplayan cücülər nektarla qidalanırlar, eyni zamanda bitkiləri tozlandıraraq onlara fayda verir.

Bəzi göbələk və yosunlar birgə yaşayaraq şibyələri əmələ gətirir. Şibyələrdə su və mineral maddələri göbələk mitseliləri sorur, üzvi maddələri isə yosunlar və ya sianobakteriyalar fotosintez prosesi nəticəsində hazırlayır. Bu yaşayış hər iki canlı üçün faydalıdır (f f). Orqanizmlərdən birinin məhvi şibyənin məhvinə səbəb olur.

Yumrucuq bakteriyaları paxlalı bitkilərlə faydalı qarşılıqlı təsirdə olur.

Bu bakteriyalar havanın tərkibində olan sərbəst azotu bitkilərin mənimsəyə biləcəyi hala gətirir, torpağı azotlu birləşmələrlə zənginləşdirir. Bitkilərin azota olan tələbatı ödənilir. Bitkilərin fotosintez yolu ilə hazırladıqları üzvi maddələrlə isə bakteriyalar qidalanırlar. Bu cür qarşılıqlı təsir *simbioz* adlanır.

Canlılar arasında elə münasibətlər də olur ki, bu, bir tərəf üçün faydalı, digər tərəf üçün isə zərərli olur.

Şəkildə verilən (f z) qarşılıqlı təsirlərə baxın və əlavə misallar göstərin.



Ekoloji sistemdə qarşılıqlı təsirdə olan fərdlərin hər ikisi üçün zərərli (z z) olan və rəqabət adlandırılan təsirə qoyun və keçinin, şirlə pələngin eyni qida və ya yaşayış yeri uğrunda mübarizəsini misal göstərmək olar.

(f n) – bu qarşılıqlı təsir canlılardan biri üçün faydalı, digəri üçün isə heç bir təsirə malik olmaya bilər (*kommensalizm*). Pişikdili, atpıtrağı kimi bitkilərin üzəri tikancıqlı meyvələri heyvanların tüklərinə ilişərək ətarafa yayılır. Bunun ikinci tərəfə (heyvanlara) elə bir təsiri olmur.

(z n) – bir tərəf üçün zərərli, digəri üçün əhəmiyyətsiz olan təsir *amensalizm* adlanır. İşıqsevən ot bitkilərinin hər hansı bir ağacın kölgəsində bitməsi onun zərərinədir, lakin bunun ağaca, demək olar ki, heç bir təsiri yoxdur.



Canlılar arasında rast gəlinən bu və ya digər fərqli qarşılıqlı münasibətlər müxtəlif təbii birliklərin yaranmasına səbəb olur. Hər bir təbii birlikdə külli miqdarda qarşılıqlı təsirlərin mövcudluğu həmin birliklərin illərlə dəyişilmədən qalmasına səbəb olur. Qarşılıqlı təsirlər dəyişilsə, canlıların qruplaşmaları da tədricən dəyişilər. Nəticədə yeni birliklər formalaşar.

Müəyyən bir ərazidə tozlandırıcı həşəratların olmaması onunla tozlanan bitkilərin də yox olması deməkdir. Bu da həmin ərazidə ciddi dəyişikliklərin yaranması ilə nəticələnər.

* Neytralizm – bir-birinə zərər vermədən birlikdə yaşama üsulu



- Tozlandırıcı həşəratların olmadığı qruplaşmalarda canlıların münasibətlərində hansı dəyişikliklər baş verər?
- Bu cür dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir?


Bu qarşılıqlı təsirlərdən bəzilərinin bioloji müxtəlifliyin dəyişməsinə elə bir təsiri olmasa da, digərləri üçün bunun əhəmiyyəti çoxdur. Bəzi qarşılıqlı təsirlərin dəyişməsi və ya yox olması biomüxtəlifliyin məhvində səbəb ola bilər. Bununla da global ekoloji problem yaranır.




1. Verilmiş canlılar arasında olan qarşılıqlı təsirləri qruplaşdırın. Qruplaşdırmanızı əsaslandıraraq təqdim edin.

Parazitizm						Simbioz					
a						c					
Sürmə göbələyi ilə buğda						Yumrucuq bakteriyaları ilə noxud					
b						d					
Qırmızıbaş göbələklə ağcaqovaq						Vərəm çöpu və insan					
						e					
						Soliter və insan					
						ə					
						Göbələklə yosun					

2. Şəkil və sxemdəki qarşılıqlı təsir növləri hansılardır? Araşdırın, nəticələri müəyyənəşdirib təqdim edin.



3. Sxemdə verilmiş qarşılıqlı təsirlərin dəyişməsi hansı ekoloji problemə səbəb olar? Cavablarınızı rəsmlərlə təqdim edin.



M Yer üzərində təqribən 350 min bitki, 2 milyon heyvan, 100 min göbələk, 3 minə qədər bakteriya növü məlumdur. Bu canlılar təbiətdə təsadüfi paylanmayıb. Onlar qruplar halında yaşayırlar. Belə təbii birliklərin biosenoz adlandırılması sizə məlumdur. Biosenozun yaşayış mühiti ilə birgə kompleksi nə adlanır? Görəsən, fərqli biosenozlar, orada rast gəlinən fərqli növlər, növlərin gen tərkibindəki fərqlilik hansı biologji terminlə ümumiləşdirilə bilər?

- 7**
- Şəkillərdə əks olunmuş biogeosenozların hər birinə aid olan canlıları qeyd edin.
 - Bu canlıların fərqli yaşayış yerində məskunlaşma səbəbini araşdırın.
 - Qruplaşmada olan canlılar arasında hansı qarşılıqlı əlaqələr olduğunu müəyyənəldir.



Biomüxtəliflik Yer üzərində yaşayan canlıların və onların yaşayış şəraitinin müxtəlifliyi deməkdir. Hər hansı bir bölgədə yaşayan növlərin fərqliliyi, bunların əmələ gətirdikləri fərqli təbii birliklər həmin bölgənin biologji müxtəlifliyini əmələ gətirir. Biologji müxtəliflik üç yerə ayrılır: *genetik, növ və biogeosenoz* (ekosistem).

Bioloji müxtəliflik



Genetik müxtəliflik



Növ müxtəlifliyi



Ekosistem müxtəlifliyi

Genetik müxtəliflik eyni növ daxilində fərdlər arasında fərqlilik şəklində təzahür edir. Bu müxtəliflik istənilən bir növ, yarımnoy, populyasiya daxilində nəzərə çarpır.

Növ müxtəlifliyi müəyyən bir bölgədəki və ya Yer kürəsində növlərin fərqliliyini ifadə edir. İstənilən bir biogeosenozu əmələ gətirən növlərin sayı həmin biogeosenozun növ müxtəlifliyidir.

Ekosistem müxtəlifliyi müəyyən bir bölgədəki və ya bütövlükdə Yer üzərindəki ekosistemlərin fərqli olmasıdır.

Dünyada növ müxtəlifliyi ekvatorndan qütblərə doğru getdikcə azalır. Bu fərqlilik ərazinin coğrafi mövqeyindən, oradakı abiotik amillərdən asılıdır. Tropik zonalarda bitki növlərinin sayı 8000 olduğu halda, tundrada bu, 500-dür.

Yer üzərində tundra, tayqa, enliyarpaqlı meşələr, çöl, səhra, bataqlıq və s. kimi biogeosenozlar mövcuddur. Hər biogeosenoz üstünlük təşkil edən növlərlə xarakterizə olunur. Zonalarda dəyişmə bitki örtüyündə daha aydın nəzərə çarpır. Bu da, əsasən, konsumentlərdən ibarət heyvanların və redusentlərin növ tərkibinin dəyişməsi ilə müşayiət olunur. Coğrafi zonalarda torpağın tərkibində də dəyişiklik yaranır.

Ekosistem daxilində elə növlər var ki, o yalnız müəyyən bölgələr üçün xarakterikdir. Bunlar *endemik növlərdir*. Yer üzərində yalnız bir ölkənin ərazisində yaşayan növlər həmin ölkə üçün endemik növ sayılır.



Azərbaycanda olan endemik növləri yada salın.


Hər bir biogeosenozda növ müxtəlifliyi, populyasiyanın sıxlığı və biokütlə fərqli olur.

Populyasiyanın sıxlığı sahə və ya həcm vahidinə düşən fərdlərin sayını bildirir.


Biokütlə üzvi maddənin və fərdlərin cəminin, onda toplanmış enerji ilə birlikdə miqdarıdır.

Bu qruplaşmalarda qida zəncirinin əsasını təşkil edən bitkilərin biokütləsi heyvanların biokütləsindən xeyli çox olur.

Biogeosenozun komponentləri arasında maddələr dövrəni gedir. Maddələr dövrəninə gətirməsi üçün əsas enerji mənbəyi günəşdir.



Maddələr dövrəni həyatın əmələ gəlməsinin ilk dövrlərindən yaranmış, gətirdikə mürəkkəbləşmişdir. Onun həyata keçirilməsi üçün hər bir qruplaşmada qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə hazırlayan canlıların – *produsentlərin*, əsasən, ətəyən və otyeyən heyvanlardan ibarət *konsumentlərin* və üzvi maddələri qeyri-üzvi maddələrə parçalayan, əsasən, mikroorqanizmlərdən ibarət *redusentlərin* olması zəruridir. Bunlar bütün biogeosenozlar üçün ümumi olsalar da, onların növ və say nisbəti müxtəlif təbii birliklərdə müxtəlif olur.



Növ saylarında baş verən dəyişiklik biogeosenozun dəyişməsinə səbəb olur. Bəzən bir biogeosenoz digəri ilə əvəz olunur, bəzən isə məhv olur. Təbii birliklərin dəyişməsinə antropogen amillər daha çox təsir göstərir.


- Antropogen amillərin bioloji müxtəlifliyə təsirinə aid araşdırma aparıb təqdim edin.

* *Bentos* – suyun dibində yaşayan canlılar


LAYIHƏ

Təbiət qanunlarının pozulması yalnız ayrı-ayrı ekosistemlərin – meşələrin, çəmənliklərin, bataqlıqların, nohurların və s. deyil, bütövlükdə biosferin qorunmasında beynəlxalq miqyasda səy göstərilməsini tələb edir. Təbiətin qorunması haqqında müxtəlif beynəlxalq sənədlər hazırlanır.

1. Sxemdə göstərilənlərdən istənilən birinin yox olmasının ekoloji tarazlığa təsirinə aid təqdimat hazırlayın.



2. İstənilən bir ekosistemdə bioloji müxtəlifliyə zərər verən amillər:
- a) meşə yanğınları nəticəsində yaşıllıqların azalması;
 - b) vulkan püskürməsinin torpaq strukturunu pozması;
 - c) kimyəvi maddələrin ətraf aləmə tullanması ilə əlaqədar bəzi canlıların məhvi.
- Göstərilən dəyişikliklərin birini seçin və ekoloji tarazlığa təsirinə dair təqdimat hazırlayın.
3. Ekosistemdə canlılar arasında olan qida əlaqələri sxeminə əsasən verilənlərdən doğru olanları seçin.




- a) M, N produsent canlılardır.
- b) K avtotrof canlıdır.
- c) M qeyri-üzvi maddədən üzvi maddə yaradır.
- d) L redusentdir.
- e) N konsumentdir.


M Canlılar yaşamaq üçün qidalanmalıdırlar. Qida maddələri canlıların böyüməsi, inkişafı, hərəkəti və digər bioloji proseslərini həyata keçirmək üçün enerji mənbəyi rolunu oynayır. Hər bir orqanizm üzvi maddədə olan enerjiden istifadə edir. Üzvi maddələrin parçalanması müəyyən mərhələyə qədər çatdırılır. Enerji ilə zəngin qida qalıqları başqa orqanizmlərin qidasını təşkil edir. Beləliklə, canlıların müxtəlif növləri arasında qida əlaqələri yaranır.

- Qida əlaqələrinin ilkin və son halqasını hansı canlılar təşkil edir?
- Bu qida əlaqələri necə adlandırılır?
- Nəyə görə qida zənciri 4-5 halqadan çox olmur?
- Ekoloji piramida nədir?
- Ekoloji piramidanın hansı növləri var?

7 Sxemdə verilmiş hər bir halqanın biosenozda əhəmiyyəti nədir? Fikirlərinizi əsaslandıraraq təqdim edin.




Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddə hazırlayan avtotrof canlılar qida zəncirinin əsas halqasıdır. Bura xlorofil pigmentinə malik bütün canlılar və xemosintezedici bakteriyalar aiddir. Bu canlılar qida zəncirinin başlanğıc halqasını təşkil edir. Quruda yaşayan bitkilər üzərinə düşən günəş enerjisinin 1%-dən istifadə edərək üzvi maddələr hazırlayır. Otyeyən heyvanlar bitkilərlə qidalanaraq qida zəncirini davam etdirir. Bu heyvanların ifrazatı və cəsədləri ilə müxtəlif cücülər və mikroorqanizmlər qidalanır. Təbii şəraitdə qida əlaqələri çoxşaxəli olur. Belə ki canlılar arasında mövcud olan *trofik* əlaqələrə (yunanca “trofe” – qida) otyeyən heyvanlar və parazitlər də qoşulur. Zəncirin bütün halqalarının həyat fəaliyyəti nəticəsində üzvi qalıqlar əmələ gəlir. Redusentlər isə qalıqları minerallaşdıraraq torpağa qaytarır.



Qida zəncirinin birinci dərəcəli konsumentlərinə bitki ilə qidalanan heyvanlar və həşəratlar: maral, cüyür, dəvə, dovşan, siçan, çayırtkə, şala, maybö-cəyi, yosunlarla qidalanan balıqlar və s. aid edilir. İkinci dərəcəli konsumentlər isə birinci dərəcəli konsumentlərlə qidalanan canlılardır. Üçüncü dərəcəli konsumentlər isə, əsasən, yırtıcılardır.



Produsent, konsument və redusentləri qruplaşdırın.



Qeyd etmək lazımdır ki, təbii şəraitdə qida zənciri mürəkkəb qidalanma şəbəkəsi əmələ gətirir. Bir növ bir neçə qida mənbəyindən istifadə edir. Ona görə də bir növün yox olması biogeosenozun dağılmasına və ya əvəz olunma-sına səbəb olmur.






Çoxşaxəli mürəkkəb qida zənciri

Göstərilən qida zəncirində əlaqədə ayrırıqotunun və ya maralın olmaması qida zəncirinin dağılması ilə nəticələnir. Belə ki maralın qidasını yalnız ayrırıqotu, canavarın qidasını isə yalnız maral təşkil etmir.


Biogeosenozda növ müxtəlifliyi nə qədər çox olarsa, o daha davamlı olur. Qida zəncirinin öyrənilməsi insanların canlılara münasibətini dəyişir. Məlum olmuşdur ki, yırtıcı heyvanların məhv edilməsi nəticəsində mürəkkəb qida zənciri dağıla bilər, beləliklə, mövcud biogeosenozlar məhv olar. Canavarların yırtıcı olmağı, onların, əsasən, dırnaqlı heyvanlarla qidalandığı məlumdur. Ancaq müşahidələr göstərmişdir ki, canavarların kökünün kəsildiyi ərazidə dırnaqlılar azalmağa başlamışlar. Müəyyən olunmuşdur ki, canavarlar xəstə heyvanları tutub yeməklə dırnaqlılar arasında epidemiyaların yayılmasının qarşısını alır. Tozlayıcı həşəratlar məhv edilərsə, bitkilər tozlanmaz, onların sayı azalar. Bu da bitki ilə qidalanan cücülərin azalmasına səbəb olar. Cücülərin azalması qurbağaların, qurbağaların sayının azalması isə ilanların sayının azalmasına gətirib çıxarır. Bunun nəticəsində cücülər sürətlə çoxaldığından yaşıl kütlələri məhv edirlər, beləliklə də, biogeosenoz dağılır.

Qida zəncirinin bir halqasından digərinə keçdikdə biokütlənin həcmi, enerjinin miqdarı, canlıların sayı azalır. Canlıların qidasından bədənlərinə keçən enerji 5–20% olur. Bu, *ekoloji piramida* qaydası adlanır. Qida zəncirinin halqalarında üzvi maddənin miqdarına görə *biokütlə piramidası*, fərdlərin sayına görə *say piramidası*, enerji miqdarına görə *enerji piramidası* tərtib edilir.




Məsələn, göl biogeosenozunda qida zəncirinin ilk halqasını təşkil edən fitoplanktonlar zooplanktonların qidasını təşkil edir. Zooplanktonların aldıkları qidanın hamısı onlarla qidalanan balıqlara keçmir. Qəbul edilən qidanın bir qismindən hüceyrələrin qurulmasında, digər qismindən isə həyat fəaliyyəti üçün lazım olan enerji əldə etmək üçün istifadə olunur. Qida zəncirinin ilk halqasından sonuncu halqaya doğru getdikcə qida və enerjinin miqdarı azalır.

7 Verilmiş qida əlaqələrində ildə insanların qida ehtiyacının 300 kq balıq olduğunu qəbul edəriksə, ekoloji piramida pillələrinə uyğun rəqəmləri yazın.




Eyni qayda ilə enerji piramidası tərtib edin.



Ekoloji piramida

Ekoloji piramidaları nəzərdən keçirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, piramidanın ilk halqasından sonuncuya doğru getdikcə:

- ümumi biokütlə azalır;
- növ sayı azalır;
- ehtiyat halında toplanan qidanın miqdarı azalır;
- enerji itkisi azalır.



Qida zənciri

İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində istifadə etdiyi zəhərli maddələr bəzən çoxşaxəli qida zənciri vasitəsilə onun özünün zəhərlənməsinə səbəb olur.

Bu maddələr yağış suları ilə su hövzələrinə axaraq balıqlara, onlardan isə insan orqanizminə keçir. Bu kimyəvi maddələr meyvələrlə, tərəvəz və göyərtilərlə, heyvanların əti və südü vasitəsilə insanın orqanizminə keçə bilər. Hətta orqanizmə keçən bu zərərli birləşmələr çox vaxt genotipə təsir göstərir və müxtəlif irsi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.


Ekoloji piramidada dəyişikliklər müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər:

- Xəstəlik, hava şəraiti, qanunsuz ov, mühit çirkliliyi və s. kimi səbəblərdən ekoloji piramida dağıla bilər.
- Quraqlıq, şaxta, meşələrin qırılması, hava, su, torpağın çirkliliyi piramidanın ilk halqasını təşkil edən bitkiləri azaldır.
- Otyeyən heyvanların azalması bitkilərin artması ilə nəticələnir.
- Zərərli böcək və çəyirtkələrin sayının artması quşların sayının azalması nəticəsində baş verir.

Bütün bunlar bioloji tarazlığı pozur.



1. Qrafikə əsasən produsentlərdən sonuncu konsumentə qədər sıralayın. Nəticəni əsaslandıraraq təqdim edin.




2. Ekoloji piramidanın birinci və sonuncu halqasında yerləşən canlılar yox olarsa, nə baş verər? Cavabınızı əsaslandıraraq təqdim edin.
3. Qida əlaqələrinin pozulmasının insan nəsində törədə biləcəyi fəsadlar nə ola bilər? Araşdırın və təqdimat hazırlayın.
4. Torpaqda mineral duzların miqdarının zamandan asılı olaraq daima dəyişdiyi məlumdur. Bu hansı canlıların fəaliyyəti əsasında mümkündür? Cavabınızı əsaslandırın.

Havanın çirklənməsi qlobal ekoloji problem kimi


M Atmosfer havasında həcmcə 78% azot, 21% oksigen, 0,03% karbon qazı və az miqdarda təsirsiz qazlar var. Bu qazların miqdarının və tərkibinin dəyişməsi havanın çirklənməsinə səbəb olur.

- Bəs havada bu dəyişikliklər nəyin nəticəsində baş verir?
- Hava çirkliliyi canlılara necə təsir göstərir?
- Antropogen amil hava çirklənməsində nə kimi rol oynayır?
- Hava çirkliliyinin baş verməməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir?

f Sxemləri nəzərdən keçirin. Turş yağışların və qlobal istiləşmənin səbəblərini araşdırın. Hava çirkliliyinin qarşısının alınma yolları haqqında təqdimat hazırlayın.



Turş yağışların yaranması



Qlobal istiləşmə


Hava canlıların həyatında çox mühüm rol oynayır. İnsan su və qida qəbul etmədən bir neçə gün yaşaya bilər. Ancaq havasız 5-10 dəqiqədən çox yaşamaq mümkün deyil.

Havanın kimyəvi tərkibinin çirklənməsi və zəhərlənməsi ilə mübarizə tədbirləri sisteminə *havanın qorunması* deyilir. Bu tədbirlər ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyətindən tutmuş beynəlxalq tədbirlərə qədər genişdir.


Havanı çirkləndirən amillər, əsasən, müxtəlif qazlardır. Sənaye inkişaf etdikcə havanın çirklənməsi daha da sürətlənir.

Turş yağışlar

Antropogen amillərin təsiri nəticəsində havada CO_2 , SO_2 və NO_2 -in miqdarı artır. Bu qazlar uyğun şərait olduqda su buxarı ilə əlaqəyə girərək müvafiq turşular əmələ gətirir.



Turş yağışlar



Atmosferdə əmələ gələn turşular yağışa qarışır və turş yağışlar əmələ gətirir. Bunlar hətta qar şəklində də ola bilər. Turş yağışlar yağdıqları ərazilərə müxtəlif zərərlər verir. Torpaqda turşular natrium, kalium, kalsium, maqnezium kimi elementlərlə reaksiyaya girir. Nəticədə bitkilərin istifadə etdiyi bu elementlərin miqdarı azalır. Eyni zamanda, alüminium və civə birləşmələri yağışla su mənbələrinə qarışır. Bu da qida zənciri ilə su canlılarına, oradan da insan orqanizminə keçərək zəhərlənmə və xərçəng xəstəliyi törədir. Turş yağışlar meşələrin məhvində və su canlılarının azalmasına da səbəb olur.

Qlobal istiləşmə

Atmosferdə karbon qazı

vulkan püskürməsi	minerallaşma	yanma hadisələri	saprofitlərin qidalanması	canlıların tənəffüsü
----------------------	--------------	---------------------	------------------------------	-------------------------

Sxemdən göründüyü kimi, atmosfer havasının tərkibində karbon qazı müxtəlif səbəblərdən artır. Fotosintezedicilər canlılar isə (əsasən bitkilər) karbon qazının azalması prosesini həyata keçirir. Uzun illər atmosferdə bu qazların miqdarı, əsasən, dəyişməz qalmışdır.

- 7 : Son zamanlar havada karbon qazının miqdarının artması bir çox problemlər yaradır. Sizcə, bu problemlər hansılardır və səbəbləri nədir? Cavablarınızı əsaslandıraraq təqdim edin.

Atmosfer havasında karbon qazının miqdarının artması qlobal istiləşmə təhlükəsi yaradır. Havanın tərkibində artan karbon qazı yer üzündən günəş şüalarının əks olunaraq kosmik fəzaya qayıtmasına maneçilik törədir. Bu səbəbdən dünyada istilik artır. İstiliyin artması qütb buzlaqlarının əriməsinə və iqlim dəyişikliklərinə səbəb ola bilər. Ekosistemlərin davamlılığı pozular, yer üzərində yaşayan bitki və heyvanların sayı azalar.

Atmosferdə Yer səthindən 15–35 km hündürlükdə sərbəst oksigen günəş şüasının təsiri ilə ozona ($3O_2 \rightarrow 2O_3$) çevrilir. Bu isə ozon ekranı əmələ gətirir. Ozon təbəqəsi canlı orqanizmlərə məhvəedicə təsir göstərən kosmik şüaları, günəşin ultrabənövşəyi şüalarını qismən dəf edir. Havanın çirklənməsi ozon ekranının nazıqləşməsi və dəşilməsinə səbəb olur. Nəticədə bütün canlıların həyatı üçün ciddi təhlükə yaranır.



Bütün bu dəyişikliklər insan sağlamlığına təsirsiz qalmır. Rentgen şüaları, ionlaşdırıcı şüalar, radioaktiv çirklənmə, kimyəvi zəhərli maddələr, kəskin temperatur dəyişiklikləri insanın genotipinə təsir göstərir. Genlərdə baş verən dəyişikliklər xəstəliklərə səbəb olur. Bu xəstəliklər dəyişilmiş genlərlə nəsilədən nəslə ötürülür.

Havanın çirklənməsinin qarşısının alınması üçün vacibdir:

- dünyada sülhün bərqərar olması, müharibələrin aparılmaması;
- kimyəvi silahların sınaqdan keçirilməməsi;
- atmosfer havasının qorunması üçün qəbul olunmuş qanunlara əməl edilməsi;
- ətraf mühitə, o cümlədən havaya mənfi təsir edən fiziki, kimyəvi və bioloji amillərə qarşı mübarizə tədbirlərinə əməl olunması;
- istehsal proseslərinin, xüsusən təmizləyici qurğuların təkmilləşdirilməsi;
- təkrar istehsal texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi;
- tullantısız işləyən istehsal proseslərinin artırılması;
- yaşıllıqların artırılması.

7

1. Araşdırmalar apararaq ozon qatında yaranan dəliklərin canlıların həyatında yarada biləcəyi təhlükələr haqqında təqdimat hazırlayın.
2. Qrafiklərdə dörd müxtəlif canlının atmosfer çirklənməsindən əvvəl və sonra sayları göstərilmişdir.



Havanın çirklənməsi səbəb olmuşdur:

- I. Z və T növlərinin tərəqqisinə;
- II. Y və T növlərinin areallarının genişlənməsinə;
- III. X və Z növlərində fərdlərin sayının azalmasına.

Verilənlərdən hansı doğrudur?

- A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III D) I və II E) II və III

3. Diaqramda bir sənaye şəhərində havanı çirkləndirən amillər göstərilmişdir. Hava çirklənmələrinin qarşısını almaq üçün əhəmiyyətli deyil:

- a) Avtomobillərdən atmosfərə buraxılan zərərli qazları tutan filtrlərin istifadəsi;
- b) Evlərin, fabriklər və zavodların bacalarında qoruyucu filtrlərin qoyulması;
- c) Bacalardan çıxan tüstülərin təkrar istehsal müəssisələrinə yönəldilməsi;
- d) Müxtəlif növ toz əmələ gətirən mənbələrin təmizlənməsi;
- e) Fabrik və zavodların sayının artırılması.




M Yer üzərində canlı və cansız varlıqlar arasında qarşılıqlı təsirlər vardır. Hər bir canlı varlıq yaşadığı ekosistemdən bəzi maddələri alır, bəzi maddələri isə xaric edir. Bu isə ekosistemin mövcudluğuna və orada tarazlığın qorunmasına səbəb olur.

Ekosistemdə bəzi maddələr qida zənciri vasitəsilə yerlərini dəyişir. Bütün bunlar təbiətdə baş verən maddələr dövrəsinin əsasını təşkil edir.

- Maddələr dövrəsinin hansı növləri vardır?
- *Prosudent*, *konsument* və *redusentlər* maddələr dövrəsinin həyata keçirilməsində nə kimi rol oynayır?
- Maddələr dövrəsinin pozulma səbəbləri hansılardır?
- Təbii dövrənin intensiv getməsi üçün nə etmək lazımdır?



f Təbiətdə azotun dövrəni sxeminə uyğun karbon, oksigen və su dövrəsinin sxemlərini tərtib edin.



Təbiətdə maddələrin bioloji dövrəni planetin biokütləsinin həyat fəaliyyəti ilə bağlıdır. İstənilən biogeosenozda müxtəlif növlərin populyasiyaları arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur. Canlılar bir-biri ilə və cansız təbiətlə əlaqəli şəkildə maddələr dövrəsinə qoşulur. Beləliklə, canlı orqanizmlərin tərkibinə daxil olan su və bütün elementlərin dövrəni baş verir. Bunlardan bir neçəsini nəzərdən keçirək.

Oksigenin dövrəni. Canlıların orqanizmində olan kimyəvi maddələrin tərkibində olan əsas kimyəvi elementlərdən biri də oksigendir. Təbiətdə oksigen dövrəsinin əsas mənbəyi havada rast gəlinən oksigen qazıdır. Oksigen dövrəsinin


həyata keçirilməsində canlıların həyat fəaliyyəti və üzvi qalıqlar mühüm rol oynayır. Canlıların qəbul etdikləri qida maddələrinin oksidləşməsi və yanma üçün oksigen sərf olunur. Beləliklə, havada oksigen qazının miqdarı azalır.




Təbiətdəki əksər produsentlərin həyata keçirdikləri fotosintez nəticəsində atmosferdə oksigenin miqdarı artır.

f • Oksigen dövrünün pozulmasının qarşısını almaq üçün nə təklif edərdiniz?

Karbonun dövrü. Karbonun dövrü oksigen dövrü ilə sıx əlaqəlidir. Təbiətdə baş verən yanma və oksidləşmə prosesləri nəticəsində əmələ gələn karbon qazı produsentlər tərəfindən həyata keçirilən üzvi maddə sintezinə sərf olunur.






Atmosferdə karbon qazının miqdarı gecə və gündüz fərqli olur. Bütün canlıların tənəffüs etməsi sayəsində gecələr karbon qazı çoxalır. Gündüzlər isə xlorofil pigmentinə malik canlıların həyata keçirdiyi fotosintez sayəsində ətrafda karbon qazı azalır, oksigen artır.

Havada karbon qazının miqdarının artması nəticəsində bu qazdan ibarət nazik təbəqə yaranır. Məlumdur ki, bu, günəşdən gələn və yerdən əks olunan istiliyin tənzimini pozaraq istixana effekti yaradır. Uzun sürən istixana effekti səhrələşməyə gətirib çıxarır.

Fosforun dövrəsi. Həyat üçün vacib kimyəvi elementlərdən biri də fosfordur. Fosfor nuklein turşularının, adenosin trifosfat turşusunun (ATF), fosfat duzlarının tərkibinə daxildir. Hüceyrə membranının, dərinin və skeletin tərkibində də fosforlu birləşmələrə rast gəlinir.



Fosfor dövrəsi

Təbiətdə fosfor dövrəsinin əsasını onun qurudan dənizlərə və əksinə daşınması təşkil edir. Torpaqda olan fosforlu maddələr mikroorqanizmlər tərəfindən suda həll olmuş hala gətirilir. Belə qeyri-üzvi birləşmələr bitkilər tərəfindən üzvi birləşmələrə çevrilir. Daha sonra qida zənciri ilə otlayan və ətlayan heyvanlara ötürülür. Bitki və heyvanlar məhv olduqdan sonra mikroorqanizmlər

tərəfindən yenidən qeyri-üzvi birləşmələrə çevrilir. Proses yenidən tarazlanır. Torpağa verilən fosforlu gübrələrin də fosfor dövrənində mühüm rolu var. Bu gübrələr yağış suları ilə dənizlərə qarışır. Qida zənciri vasitəsilə yenidən quruya qaydır və orada gedən təbii dövrəyə qoşulur.

Dünyada müəyyən miqdarda müxtəlif maddələr vardır. Ekosistemdə bir maddə miqdarının artıb digərinin azalması oradakı tarazlığı pozur. Maddələr dövrəsinin pozulması ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olur.

Maddələrin təbii dövrəsinin pozulmasında antropogen faktorlar mühüm rol oynayır.




1. Ekosistemdə canlıların iştirakı ilə həyata keçən:

- a) oksigen;
 - b) azot;
 - c) karbon qazı dövrələri necə gedir?
- Cavabınızı əsaslandıraraq təqdim edin.

2. Atmosferdə karbon qazının miqdarının artması səbəb ola bilməz:

- a) Həddən artıq istiləşmə
- b) Turş yağışların yağması
- c) Torpağın məhsuldarlığının artması
- ç) İqlim dəyişiklikləri

3. Bir ərazidə gecə oksigen və karbon qazının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikdə səhvi müəyyənləşdirin. Fikrinizi əsaslandırın.



Təqdimat mövzuları

1. Radioaktiv çirklənmə və onun canlılara təsiri
2. Qlobal istiləşmə və canlı təbiət
3. Turş yağışların ekoloji tarazlığa təsiri
4. Qlobal ekoloji problemlər və onların həlli yolları

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. A.F.Əfəndiyev. İnsan biokimyasının əsasları. II cild, "Müəllim", 2008.
2. C.Ə.Nəcəfov, R.Ə.Əliyev, Ə.P.Əzizov. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları. I, II cild. "Müəllim" nəşriyyatı, 2010.
3. Çingiz İsmayılov. Xəzər dənizinin və sahilələri ərazilərin ekologiyası. "Ayna Mətbu evi", Bakı, 2005.
4. D.O.Hacıyev, Y.X.Hidayətov. Tibbi biologiyadan seminar məşğələləri. I cild, 2000.
5. Ekoloji siyasət. "Bakı", 2008.
6. Ə.B.Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 2003.
4. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. I hissə. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2007.
8. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. II hissə. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2008.
9. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2010.
10. Ə.H.Əliyev, Ş.A.Məhərrəmov, F.Ə.Əliyeva. İnsan anatomiyası, "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2007.
11. İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.S.Tağıyeva. Epidemiologiya, 2012.
12. Qida və sizin sağlamlığınız. Məktəblilər üçün tədris proqramı. Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Bakı, 1999.
13. Maqşud Qasımov. Sağlam həyat tərzini uğrunda, Bakı, 2005.
14. M.A.Axundov, A.S.İsmayılov. Genetika, 1981.
15. N.M.Məmmədov, İ.T.Suraveqina. Ekologiya. Bakı, "Maarif", 2000.
16. R.Əliyeva, Q.Mustafayev, S.Hacıyeva. Ümumi ekologiya. Bakı, 2004.
17. R.Ə.Əliyev, C.Ə.Nəcəfov, S.D.Əliyev, Ə.P.Əzizov, Y.V.Səfəraliyev. Tibbi biologiya və genetika, 2008.
18. R.Əliyeva, Q.Mustafayev. Ekologiya, Bakı, "Elm", 2011.
19. S.C.Əliyev, H.M.Hacıyeva, N.C.Mikayılzadə. Tibbi biliklərin əsasları, Bakı, 2004.
20. V.B.Şadlinski, M.Q.Allahverdiyev, A.B.İsayev. İnsanın anatomiyası, Bakı, "Ülvi-Həyat" nəşriyyatı, 2011.
21. Z.Veysova. Fəal təlim metodları. "Bakı". 2007.
22. Грин Н., Стаут У. Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. Под ред. Сопера. Перевод с англ. М.: – Мир, 1990. I том, 368 с. II том, 327. III том, 374 с.
23. Иорданский Н.Н. Развитие жизни на Земле. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 191 с.
24. Красная книга Азербайджанской ССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Б.: Ишыг, 1989. 543 с.
25. Монин А.С. Популярная история Земли. – М., Наука, 1980. 224 с.
26. Монин А.С. История Земли. – Л.: Наука, Ленингр. Отд., 1977. 128 с.